



60 JAHRE

Eingegangen:

18. SEP. 1950

CONRAD MAASS

Baum- und Rosenschulen

RELLINGEN IN HOLSTEIN

Fernsprecher: Pinneberg 3157

PREIS-VERZEICHNIS

FÜR WIEDERVERKÄUFER

HERBST 1950 - FRÜHJAHR 1951

CONRAD MAASS

BAUM- UND ROSENSCHULEN

RELLINGEN IN HOLSTEIN

Fernsprecher: Amt Pinneberg 3157

Telegr.-Adresse: Rosenmaass, Rellingen, Bez. Kiel

Bank-Konto: Pinneberger Bank. Abteilung der
Schleswig-Holsteinisch. und Westbank Pinneberg

Postscheck-Konto: Hamburg 56685

Spezialkulturen in niedrigen und Hochstamm-Rosen


Obst, Beerenobst, Zier- und Treibsträucher, Koniferen, Forst- u. Heckenpflanzen, Wildlinge aller Art

Bahnstation: Pinneberg

Berechtigt zur Führung des Markenetiketts für Baumschulerzeugnisse

MITGLIED

des Bundes deutscher Baumschulen,
des Vereins deutscher Rosenfreunde,
der Deutschen dendrologischen Gesellschaft,
der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und
Landschaftsgestaltung,
der Deutschen Rhododendron-Gesellschaft



Rellingen, Herbst 1950

An unsere verehrten Geschäftsfreunde!

Hiermit überreichen wir Ihnen unser neues Preisverzeichnis Herbst 1950 / Frühjahr 1951 und bitten Sie, es einer recht eingehenden Durchsicht unterziehen zu wollen und uns Ihre werten Aufträge auch in diesem Jahr wieder zuzusenden.

Auch im vergangenen Jahr haben wir uns weiterhin bemüht, etwaige aus der Nachkriegszeit noch bestehende Mängel besonders hinsichtlich des Sortiments in vollem Umfange auszugleichen, so daß wir heute sowohl hinsichtlich der Menge der vorrätigen Pflanzen, wie auch hinsichtlich der Sortimente den Friedensstand von 1939 wieder voll erreicht und zum Teil bereits übertroffen haben. Wir dürfen also wohl hoffen, in der Lage zu sein, die Wünsche unserer Kunden in diesem Jahr in vollem Umfange wieder befriedigen zu können.

Wir danken unseren werten Kunden für das uns bisher erwiesene Vertrauen und bitten, es uns auch weiter erhalten zu wollen. Es wird unser Bestreben sein, durch gewissenhafte Ausführung der Aufträge und durch weitgehende Berücksichtigung aller Wünsche dieses Vertrauen zu rechtfertigen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Gelegenheit nehmen würden, sich persönlich von dem Stand unserer Kulturen zu überzeugen. Unsere Baumschulen liegen an der Chaussee Hamburg — Pinneberg und sind vom Bahnhof Pinneberg in reichlich 20 Minuten zu erreichen.

Hochachtend!

Conrad Maass

Obstbäume und Fruchtsträucher

Unsere Obstbäume sind auf mildem Lehmboden herangezogen und werden in gesunder, wüchsiger Ware geliefert.

Mittlere Wahl 20 %, II. Wahl 40 % billiger.

	1. Obstbäume	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Äpfel (siehe Sortenverzeichnis Seite 7)				
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang		3,—	27,—	240,—
8—10 cm Umfang		3,75	34,—	300,—
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt				
7—8 cm Umfang		3,40	30,—	270,—
8—10 cm Umfang		4,20	37,50	340,—
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe, 6—8 cm Umfang		2,25	20,—	180,—
8—10 cm Umfang		3,—	27,—	240,—
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt				
6—8 cm Umfang		2,65	23,50	210,—
8—10 cm Umfang		3,40	30,—	270,—
Viertelstämme, 80—100 cm Stammhöhe, 5—7 cm Umfang		2,25	20,—	180,—
7—8 cm Umfang		2,65	23,50	210,—
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt				
5—7 cm Umfang		2,65	23,50	210,—
7—8 cm Umfang		3,—	27,—	240,—
Buschbäume, 60 cm Stammhöhe, 2jährig		2,—	18,50	170,—
3—4jährig		2,65	23,50	210,—
Spindelbüsche, 2jährig		1,90	17,—	150,—
3jährig		2,25	20,—	180,—
Schnurbäume, senkrecht, 2jährig		1,90	17,—	150,—
3—4jährig		2,25	20,—	180,—
Birnen (siehe Sortenverzeichnis Seite 8)				
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang		3,40		
8—10 cm Umfang		4,15		
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt				
7—8 cm Umfang		3,75		
8—10 cm Umfang		4,50		
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe, 6—8 cm Umfang		2,65		
8—10 cm Umfang		3,40		
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt				
6—8 cm Umfang		3,—		
8—10 cm Umfang		3,75		
Buschbäume, 60 cm Stammhöhe, 2jährig		2,65	23,50	
3—4jährig		3,—	27,—	
auf Zwischenveredlung, 2jährig		3,—	27,—	
3—4jährig		3,40	30,—	
Spindelbüsche, 2jährig		2,25	20,—	
3—4jährig		2,65	23,50	
auf Zwischenveredlung, 2jährig		3,—	27,—	
3—4jährig		2,25	20,—	
Schnurbäume, senkrecht, 2jährig		2,65	23,50	
3—4jährig		2,65	23,50	
Pflaumen und Zwetschen (siehe Sortenverzeichnis Seite 8)				
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang		3,40	30,—	270,—
8—10 cm Umfang		4,20	37,50	340,—
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt				
7—8 cm Umfang		3,75	34,—	300,—
8—10 cm Umfang		4,50	40,—	360,—
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe, 6—8 cm Umfang		2,65	23,50	210,—
8—10 cm Umfang		3,—	27,—	240,—
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt				
6—8 cm Umfang		3,—	27,—	240,—
8—10 cm Umfang		3,40	30,—	270,—
Buschbäume, 2jährig		2,25	20,—	180,—
Kirschen (siehe Sortenverzeichnis Seite 8)				
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe, 7—8 cm Umfang		3,40	30,—	270,—
8—10 cm Umfang		4,20	37,50	340,—
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe, 6—8 cm Umfang		2,65	23,50	210,—
8—10 cm Umfang		3,—	27,—	240,—
Süßkirschen-Büschel, 2jährig		3,—	27,—	
Schattenmorellen-Büschel, 1jährig		1,90	17,—	150,—
mehrfährig		2,65	23,50	210,—
Fächer, 1jährig		2,65	23,50	
mehrfährig		3,75	34,—	

	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Pfirsiche (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)			
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	4,90		
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe	3,75		
Büsche, 1jährig, auf Pflaumen veredelt	3,—	27,—	
Fächer, 1jährig, auf Pflaumen veredelt	4,20		
mehrfährig, auf Pflaumen veredelt	4,90		
Aprikosen (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)			
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	4,90		
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe	3,75		
Büsche, 1jährig	3,—	27,—	
mehrfährig	3,40	30,—	
Fächer, 1jährig	4,20		
Quitten (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)			
Halbstämme, 120—150 cm Stammhöhe	3,—	27,—	
Büsche, 1jährig	1,90	17,—	150,—
2—3jährig	2,65	23,50	210,—

2. Schalenobst

Eßbare Kastanien (*Castanea sativa*)

Hochstämme, 8—10 cm Stammumfang	6,—
10—12 cm Stammumfang	7,50

Walnüsse (*Juglans regia*)

Hochstämme, 8—10 cm Stammumfang	6,—	54,—
10—12 cm Stammumfang	7,50	67,50
Heister, 150—200 cm hoch	3,75	34,—

Haselnüsse (Sorten siehe Sortenverzeichnis Seite 9)

Büsche, aus Samen gezogen, 80—100 cm	0,90	8,—	75,—
in großfrüchtigen Sorten, verpfl. Ableger	1,50	13,50	120,—

3. Beerenobst und Sonstiges

Stachelbeeren (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)

Halbstämme, 4—6 Triebe	0,90	8,25	75,—
6 und mehr Triebe	1,05	9,40	84,—
Hochstämme, 4—6 Triebe	0,97	9,—	78,—
6 und mehr Triebe	1,20	10,50	96,—
Büsche, 3—5 Triebe	0,56	5,10	
5—8 Triebe	0,75	6,75	
8—12 Triebe	0,90	8,25	

Johannisbeeren (siehe Sortenverzeichnis Seite 9)

Halbstämme, 3—4 Triebe	0,90	8,25	75,—
4 und mehr Triebe	1,05	9,40	84,—
Hochstämme, 3—4 Triebe	0,97	9,—	78,—
4 und mehr Triebe	1,20	10,50	96,—

	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
Büsche, 3—5 Triebe	0,22	2,—	18,—	162,—
5—8 Triebe	0,30	2,70	24,—	210,—
8—12 Triebe	0,38	3,40	30,—	270,—
Für die Sorten:				
Heros, Fays fruchtbare, Weiße aus Jüterbog				
Büsche, 3—5 Triebe	0,30	2,70	24,—	210,—
5—8 Triebe	0,38	3,40	30,—	270,—
8—12 Triebe	0,45	4,—	36,—	

Brombeeren

1jährig verpfl. Stecklinge oder 1jäh. Ableger	0,38	3,40	30,—	270,—
2jährige verschulte Eüsche	0,57	5,10	45,—	400,—
Sorten, aufrechtwachsende:				
Wilsons Frühe				
Kittatiny				
rankende:				
Theodor Reimers, 1jährig verpflanzte Stecklinge				

Himbeeren

In den Sorten: Preußen, Deutschland, Superlatv	0,30	2,85	27,—	240,—
--	------	------	------	-------

Hagebutten (*Rosa rugosa*)

v. Büsche, 40—60 cm	0,45	4,—	36,—	
---------------------------	------	-----	------	--

Weinreben	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
mit Topfballen, 1jährig, 40/60 cm hoch	1,90	17,—	150,—	
mit Topfballen, 2jährig, 60/100 cm hoch	2,65	23,50	210,—	
In den Sorten: Elbing grüngelb, frühe Sorte, mit großen grüngelblichen Beeren				
Roter Gutedel, ziemlich früh, mit großen, rötlichen Beeren				
Weißer Gutedel, mittelfrüh, großtraubig, Beere gelbgrün				
Blauer Burgunder, früh, schwarzblau				
Rhabarber				
Elmsfeuer, vollkommen dunkelrote Stiele, wächst schwer an, doch sehr ertragreich	0,45	4,—	36,—	
Elmsjubiläum, vollkommen dunkelrote Stiele	0,45	4,—	36,—	
Holsteiner Blut (Vierländer), rotfleischig und starktriebzig	0,38	3,40	30,—	
Loher Blut, Verbesserung von Holsteiner Blut	0,38	3,40	30,—	
Verbesselter Viktoria, ausgezeichnet durch sehr starke Stiele	0,30	2,70	24,—	
Erdbeeren:				
Gruppe I: Oberschlesien, Deutsch Evern, Mad. Moutot, Sieger, Schwarze Ananas, Königin Luise und ähnliche Sorten			3,75	33,75
Gruppe II: Hansa, Prinz J. C. Braunschweig, Eva Macherauch, Georg Soltwedel, Mieke Schindler			4,15	37,50
Gruppe III: Dithmarschen und neuere Sorten			4,90	45,—
Monatserdbeeren:				
Rügen, rankenlose Monatserdbeere, ununterbrochen tragend, dunkelrote Frucht 1jähr. verpflanzt			4,15	37,50
Spargel				
Ruhm von Braunschweig	1jähr. Sämlinge		3,—	27,—
	2jähr. Sämlinge		3,75	33,75

Verzeichnis der Obstsorten

Da nicht alle Sorten in allen Formen vorrätig sind, empfehlen wir, soweit es sich nicht um einzelne Sorten für den Massenanbau handelt, uns die Sortenwahl zu überlassen, in diesem Fall bitten wir um Angabe der Bodenverhältnisse, des Klimas, der Lage und um Auskunft darüber, ob Tafel- oder Wirtschaftsfrucht, frühe oder späte Sorte gewünscht wird. Wir werden dann die geeigneten Sorten aussuchen und sind dabei in der Lage, durchweg starke Bäume zu liefern.

Äpfelsorten

Charlamowsky, August-September, sehr früh und reichtragend für rauhe Lagen, mittelgroße, karminrot-gestreifte Frucht, von säuerlichem Geschmack.
Troncels, September-Oktober, große hellgelbe Frucht, von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist starkwachsend und gegen Kälte unempfindlich.

Sommeräpfel:

Weißer Klarapfel, Ende Juli-Mitte August, mittelgroße bis große, grünlichweiße Frucht von angenehmem, säuerlichem Geschmack, geeignet für den Großanbau.

Herbstäpfel:

Cellini, Oktober-Dezember, mittel- bis große Frucht, grüngelb, dunkelrot gestreift Baum aufrecht wachsend. Früher und reicher Träger.

Cox Pomona, Oktober-November, sehr große, gelbe, rot gestreifte Frucht.

Gelber Richard, Oktober-Januar, große, zitronengelbe Frucht von edelstem Wohlgeschmack. Baum trägt spät, nicht überreich, gedeiht am besten im nördlichen Küstenklima.

Großherzog Friedrich, Oktober-Dezember, große, hellgelbe Frucht, gesunder, früher und regelmäßiger Träger.

Gravensteiner, September-Dezember, edle, sehr saftreiche Sorte von herrlichem Ananasduft und Geschmack, verlangt tiefgründigen, feuchten Boden und geschützte Lage. Liebt Seeklima.

James Grieve, September-Oktober, mittelgroße Frucht, hellgelb mit roten Streifen, von angenehm würzigem, süßweinigem Geschmack, sehr saftig. Vorzüglicher Tafelapfel.

Lord Grosvenor, August-September, große hellgelbe, gerippte Frucht. Geeignet als Wirtschaftsapfel. Stellt keine Ansprüche an Boden und Lage.

Lord Suffield, August-Oktober, große hellgrün-gelbe Frucht von säuerlichem Geschmack, früher und reicher Träger, Wirtschafts- und Marktapfel.

Prinzenapfel, Oktober-Dezember, bekannte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Signe Tillisch, November-Januar, große, hellgelbe Frucht von gutem Geschmack, gesunde und reichtragende Sorte.

Winteräpfel:

Adersleber Kavill, Dezember-März, große, kantige, grüngelb-gelbe Frucht von angenehmem Geschmack. Sehr gute Tafelfrucht.

Altengländers Pfannkuchnapfel, Februar-April, mittelgroße Frucht von platter Form, außerordentlich reichtragend. Baum kräftig wachsend und gesund.

Baumanns Rtte., Dezember-April, mittelgroß, lebhaft gerötete Frucht, früher und reicher Träger, guter Straßenbaum.

Boikenapfel, Januar-April, große, hellgelbe Frucht mit roter Backe. Baum sehr guter Träger und gesund. Straßenanbau.

Cox's Orange Rtte., November-April, mittelgroße, goldgelbe, rot gestreifte Frucht, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Früher und regelmäßiger Träger.

Danziger Kantapfel, Oktober-Januar, mittelgroße, gerippte Frucht von angenehmem Geschmack. Sorte für den Haus- und Kleingarten.

Dithmarscher Paradies, Ende September-Dezember, mittelgroß, rot, Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Filippa-Apfel, November-Januar, mittelgroß, gelb, leicht gerötet. Tafel- und Wirtschaftsapfel.

Goldrenette von Blenheim, November-März, groß, goldgelbe, rot gestreifte Frucht, wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht für geschützte Lagen.

Grahms Jubiläumsapfel, November-März, große, gelbe, leicht gerötete Frucht, früher und regelmäßiger Träger.

Großer Bohnapfel (großer rheinischer Bohnapfel), Januar-Sommer, mittelgroße, gelblich-grüne Frucht, eine der besten Wirtschaftsarten, später, aber dann reicher und regelmäßiger Träger. Für Massenanbau und als Straßenbaum.

Horneburger Pfannkuchnapfel, Dezemb.-Januar. Sehr große, grünlich-gelbe Frucht. Sehr reichtragend. Lokalsorte aus dem Alten Lande. Sehr gute Wirtschaftsfrucht.

Jacob Leibel, November-Januar, sehr große Frucht, gelblich-grün, vorzügliche Wirtschafts- und Marktfucht. Für Massenanbau.

Landsberger Rtte., November-Januar, Frucht groß, goldgelb, leicht gerötet, von angenehmem Geschmack, Tafel- und Wirtschaftsfrucht für Feld- und Straßenanbau.

Martini Apfel, November-Februar, mittelgroße, gelblich-grüne Frucht, hochfeiner Tafelapfel, gesunder und reicher Träger, in den holsteinischen Marschen viel angebaut.

Ontario, Januar-Juni, große, flachrunde, kantige Frucht von gelber Farbe, angenehmem Geschmack, Wirtschaftsfrucht, sehr geeignet für den Erwerbsobstbau.

Potts Sämling, September-Oktober, große, hellgrünlich-gelbe Frucht, guter Küchenapfel, wertvoll auch für den Erwerbsanbau.

Purpurroter Cousinot, Nov.-Sommer, mittelgroß, vorzügliche Wirtschaftsfrucht, keine Ansprüche an Boden, auch für rauhe Lagen.

Roter Eiserapfel, Januar-Mai, ziemlich große, dunkelrote Frucht, ausgezeichnete Wirtschafts- und Marktfucht, Straßenbaum für rauhe Lagen.

Schöner aus Boskoop, Dezember-April, große, grünlich-gelbe, gerötete Frucht, sehr gute Tafel-, Wirtschafts- und Marktsorte.

Wintergoldparmäne, Nov.-Februar, ziemlich große, goldgelbe, lebhaft gerötete Frucht, sehr angenehmer Geschmack, Tafel- und Wirtschaftsfrucht, früher und reicher Träger.

Birnenarten

Sommerbirnen:

Andenken an den Kongreß, September, Frucht groß, gelb, gerötete Sonnenseite, schöne Schauf Frucht.

Clapps Liebling, Mitte August-Anfang Okt. Frucht groß, gelb, gerötete Sonnenseite. Ausgezeichnete Frühbirne.

Esperens Herrenbirne, Mitte September-Anfang Oktober, mittelgroße, grünlich-gelbe Frucht. Edle Tafelfrucht, früher und reicher Träger für geschützten Standort.

Gute Graue, Ende August-Anfang September, mittelgroße, gelblich-grüne Frucht, zimtfarbig berostet, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Für Straßenanbau.

Juli Dechantbirne, Ende Juli-Anfang August, klein, gelb mit roter Backe, Tafel- und Markfrucht.

Williams Christbirne, September, große, beulige Frucht, hellgelb, leicht gerötet, eine der wertvollsten früh- und reichtragenden Birnen. Für Kleingarten und Massenanbau.

Herbstbirnen:

Blumenbachs Butterbirne, Oktober-November, mittelgroße Frucht, gelb, zimtbraun berostet, Tafelfrucht.

Boscs Flaschenbirne, Oktober-Mitte November, mittelgroße Frucht, hellgelb, mit zimtfarb. Rost, gute Tafel- und Markfrucht.

Gellerts Butterbirne, September-Oktober, groß, grünlich-gelbe, bronzefarben berostete Frucht. Sehr feine Herbstbirne für geschützte Lagen.

Graf Molke, Oktober, große, zimtfarbig berostete Frucht, Tafelsorte.

Gute Luise, Mitte September-Ende Oktober, mittelgroße bis große Frucht, grünlich-gelb, sonnenwärts lebhaft rot verwaschen.

Köstliche aus Charneu, Anfang Oktober-Mitte November, mittelgroße, grünlich-gelbe Frucht. Gute Tafel- und Handelsfrucht, auch für rauhere Lagen und als Straßenbaum.

Napoleons Butterbirne, Mitte Oktober-Ende November, mittelgroße, gelblich-grüne, braun punktierte Frucht. Ausgezeichnete Tafelbirne und Marktsorte. Für geschützte Lage.

Neue Poiteau, Anfang Oktober-Mitte November, große bis sehr große Frucht, grün, grau punktiert. Gute Tafelsorte, geeignet auch als Straßenbaum.

Speckbirne, Oktober, mittelgroße Frucht, Baum unempfindlich. Eine der besten Wirtschaftssorten.

Winterbirnen:

Diels Butterbirne, November-Dezember, große bis sehr große Frucht, gelb, leicht berostet, gute Tafel- und Handelsorte. Braucht gute Lage.

Gräfin von Paris, Dezember-Januar, ziemlich große Frucht, grünlich-gelb, dicht punktiert. Fleisch saftreich und süß.

Liegels Butterbirne, November-Dezember, mittelgroße, grüngelbe Tafelfrucht.

Pastorenbirne, November-Anfang Januar, Frucht groß bis sehr groß, hellgelb, Sonnenseite gerötet, gute Kochfrucht, unempfindliche Erwerbsorte.

Pflaumen- und Zwetschensorten

Anna Späth, Ende September-Anfang Oktober, Frucht ziemlich groß, braunrot, bläulich bereift, Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Früher und außerordentlich reicher Träger, für warme, sonnige Lage.

Blaue Catharinenpflaume, September, große dunkelblaue Frucht, reichtragend, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Bühler Frühzwetsche, Ende August, mittelgroße, dunkelblaue Frucht, stark bereift, Tafel- und Versandfrucht, reicher Träger in warmen Böden.

Emma Leppermann, August, sehr große gelbe Frucht, Sonnenseite hellrot.

Esperens Goldpflaume, Anfang September, große, goldgelbe Tafelfrucht.

Gelbe Eierpflaume, Anfang-Mitte September, große bis sehr große, gelbe Frucht, dankbare Liebhaberorte.

Große grüne Reneklode, Anfang-Mitte September, Frucht groß, gelblich-grün, beste aller Renekloten, für Massenanbau und Kleingarten.

Hauszwetsche, Ende September-Mitte Oktober, mittelgroße Frucht, dunkelblau, die beste Pflaume für alle Zwecke, guter Straßenbaum.

Königin Viktoria, Ende August-Anfang September, sehr große, hellviolett-rote Frucht, früher und sehr reicher Träger, für Kleingarten und Erwerbsanbau.

Lützelsacher Frühzwetsche, Ende Juli, die große, dunkelblaue Frucht ist sehr wohlschmeckend, Baum gesund und sehr reichtragend.

Nancymirabelle, Anfang-Mitte August, Frucht mittelgroß, gelb, rot gepunktet, ertragreiche Sorte.

Ontariopflaume, Anfang bis Mitte August, sehr große Frucht, grünlich-gelb, sehr reichtragend. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Oullins Reneklode, Mitte-Ende August, gelbe, große Frucht, rot punktiert, gute Tafel-, Wirtschafts- und Markfrucht.

Schöne aus Löwen, Mitte-Ende August, sehr große, purpurviolette Frucht, Wirtschaftssorte.

Die Czar, August. Große, rundliche Frucht, dunkelblau, wohlschmeckend. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Wangenheims Frühzwetsche, Mitte August-Anf. September, mittelgroße, schwarz-blaue Frucht, für die Tafel und alle Wirtschaftszwecke. Reicher Träger für Groß- und Kleinganbau.

Zimmers Frühzwetsche, Mitte August, außerordentlich reich- und frühtragend.

Süßkirschen

Fromms Herzkirsche, Anfang-Mitte Juli, große, tief-schwarze Frucht, gute Tafelsorte.

Frühe schwarze Altenländer, Frucht schwarz-rot, früh und reichtragend.

Früheste der Mark, Anfang-Mitte Juni, mittelgroße, braun-rote Frucht, früheste aller Kirschen.

Große schwarze Knorpel, Ende Juli, große Frucht, glänzend schwarz. Sehr reich tragend.

Hedelfinger Riesen, Mitte-Ende Juli, sehr große, schwarz-rote Frucht, beliebte Tafel- und Einmachsorte.

Kassin, frühe, Ende Juni, ziemlich große, braunrote Frucht, sehr gute Tafelfrucht.

Schwarze Adler, Anfang Juli, große, tiefschwarze Frucht, gute Tafelsorte.

Winklers weiße Herz, Anfang Juli, sehr große Frucht, auf gelbem Grund rot getuscht, gute Tafelsorte, früher und reicher Träger.

Schattenmorellen und andere Sauerkirschen

Ostheimer Weichsel, Ende Juli, Frucht mittelgroß, dunkelrot, sehr reichtragend.

Schattenmorellen (große, lange Lotkirsche), Ende Juli-August/September, große, rundliche, dunkelbraun-rote Frucht, wertvollste Sorte zum Einmachen und zum Versand. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Königin Hortense, Anfang-Mitte Juli, sehr große, hellrote Frucht, edle Tafelfrucht, mäßiger Träger, für Haus- und Kleingarten.

Pfirsiche

Amsden, Ende Juli-Anfang August, mittel- bis ziemlich große Frucht, rot auf gelbem Grund, durch frühe Reife gesuchte Marktsorte.

Alexander, Juli-Anfang August, mittelgroße Frucht, gelblich-weiß, korminrot überfärbt, früher und ergiebiger Träger.

Proskauer, Anfang-Mitte September, mittelgroße bis große Frucht, hellgelb mit rot marmoriert, dünnhäutig, gute Einmachfrucht, wächst und trägt auch in rauheren Lagen.

Waterloo, Ende Juli-Anfang August, mittelgroße Frucht, auf grünlich-gelbem Grund rot überzogen, Sonnenseite tiefrot gefärbt, gute Frühpfirsich, widerstandsfähig und kräftig.

Aprikosen

Ambrosia, Ende Juli-Anfang August, große, feinwollige, dunkelgelbe Frucht, eine der besten Tafelsorten, fruchtbarer, früher Träger.

Nancyaprikose, Ende Juli-Anfang August, große orangegelbe mit rot überlaufene Frucht, vorzügliche Tafelsorte, harter und reicher Träger.

Luizetsaprikose, Ende Juli, große bis sehr große, orangegelbe Frucht, wertvolle Versand- und Handelsfrucht, harte und starkwüchsige Sorte.

Quitten

Champion, birnenförmig, grünlich-gelbe Frucht, graufilzig, reift spät, reicher und regelmäßiger Träger.

Portugiesische Birnquitte, mittelgroße, grünliche, birnenförmige Frucht.

Haselnüsse

Lange Landsberger, Gunslebener Zellernuß, Lambertsnuß, Hallesche Riesennuß, Neue Riesennuß, Wunder aus Bollweiler.

Stachelbeeren

Rot: Amerikanische Gebirgsstachelbeere, Maurers Sämling, Rote Deutsche, Rote Triumph (Winhams Industry).
Weiß: Blanca, weiße Triumph (White Smith).

Grün: Früheste aus Neuwied, grüne Flaschenbeere, grüne Deutsche, grüne Hansa.

Gelb: Gelbe Riesen, Golden Ball, Golden Yellow, Hönings Früheste.

Johannisbeeren

Schwarz: Bank up, Goliath, Lee's schwarze.

Weiß: große weiße Holländer, weiße Werdersche.

Rot: Fays fruchtbare, rote Holländer, rot Kirsch, Heros, Erstling von Vierlanden.

I. Niedrige Rosen

Bei Frühjahrslieferung erhöhen sich die Preise für niedrige Rosen um einen Überwinterungszuschlag von 10%

	I. Wahl			Mittelwahl		
	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.
Preisgruppe 1 und in Sorten unserer Wahl	—,60	5,40	48,75	—,48	4,30	39,—
Preisgruppe 2	—,68	6,10	54,—	—,54	4,90	43,—
Preisgruppe 3	—,80	6,75	60,—	—,60	5,40	48,—
Preisgruppe 4	—,98	8,80	80,—	—,79	7,—	64,—
Preisgruppe 5	1 20	11 —	97,—	—,95	8,50	77,50

Niedrige Rosen zur Topfkultur auf *rosa multiflora* oder *rosa rugosa* hollandica veredelt:

Aneke Koster, karminrot

Dick Koster, hell lachsrosa bis orange

Dick Koster Fulgens, hell lachsrosa bis orange, große Blüten

Greet Koster, lachsfarbig rot

Greta Kluis Superior, dunkel karminrot

Margo Koster, sehr schön lachsfarbig orange rosa

Marianne Kluis Superior, dunkelrot, nicht verblauend

Die einzelnen Qualitäten werden besonders stark als Treibqualität sortiert.

I. Wahl			Mittelwahl		
1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.
—,80	6,75	60,—	—,60	5,40	48,—

II. Hochstämmige Rosen

	I. Wahl		Mittelwahl	
	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
Trauerstämme 160—200 cm hoch				
140—160 cm hoch	6 —	54,—	4,80	33,—
Hochstämme 100—140 cm hoch	5,25	47,50	4,20	37,50
Mittelstämme 75—100 cm hoch	3,75	33,75	3,—	27,—
Halbstämme 50—75 cm hoch	3,—	27,—	2,40	22,—
Fußstämme 30—50 cm hoch	1,85	17,—	1,50	13,50

Rosensorten

Abkürzungen: Verwendungszweck: Gr. — Gruppenrose, Schn. — Schnittröse, Tr. — Treibrose

Gattung: R — Remontantröse, T — Teerose, P — Pernetiana, TH — Teehybride

Remontant-, Tee-, Teehybriden-, Pernetiana-, (lutea) Rosen

gruppe
Preis-

- 3 Apricot Queen, edle aprikosenfarbige Blüte. Tr. Schn. Gr.
- 3 Better Times, große gefüllte Blume von edlem Bau, Farbe rein dunkelrosa, auf langem Stiel. Tr. Schn. Gr. TH.
- 3 Briarcliff, ein Sport von Columbia, in allen Eigenschaften schöner als diese, rosa, edelgeformte Blumen. Tr. Schn. TH.
- 3 Captain Hayward, leuchtendrot
- 3 Chamberlain, eine sehr schöne orange Farbe.
- 2 Condesa di Sasago, Blume groß, genügend gefüllt, duftend, braunrot, Außenseite der Petalen kupfrig-gelb, Wuchs stark, vollkommen aufrecht. Gr. Schn. TH.
- 2 Crimson Glory, Blume sehr groß, von hervorragendem Bau, voll gefüllt, Farbe karminrot, sammetartig, dunkel schattiert. Tr. Schn. Gr. TH.
- 2 Dame Edith Helen, rein rosa, sehr große, stark gefüllte, herrlich duftende Blume. Tr. Schn. Gr. TH.
- 2 Edith Krause, resedaweiß, ähnlich Kaiserin, große edelgeformte Blume. Schn. Gr. TH.
- 1 Etoile de Hollande, dunkelblutrot, Blume groß, duftend. Tr. Schn. Gr. TH.

Preis-
gruppe

- 1 Fisher et Holmes, leuchtend scharlachrot, mittelgroß, gefüllt, ungemein reichblühend. Schn. Tr. R.
- 1 Frau Karl Druschki, blendend reinweiß, groß gefüllt, Knospe länglich, von edlem Bau. Tr. Schn. Gr. R.
- 2 Freiburg II, pfirsichrosa Außenseite und weiß-rosa Innenseite der Blumenblätter, edel geformt, langstielig. Schn. Gr. TH.
- 3 Geheimrat Duisberg, Farbe rein gelb, Blume groß, hochedel gebaut, haltbar bis zum vollständigen Verblühen. Tr. Schn. Gr. TH.
- 1 Generalsuperior Arnold — Jahsen, karmin-orange-rot mit rosa, große edelgeformte Blume auf langem Stiel. Tr. Schn. Gr. TH.
- 3 Gloria Dei, Blume sehr groß, von hochedlem Bau, sehr haltbar. Rein goldgelb mit karminrotem Rand, der sich beim Öffnen verliert, duftend. Die Pflanze ist von extra starkem, robustem Wuchs, mit herrlicher, glänzender, vollkommen krankheitsfreier Belaubung, winterhart. Blüte auf langen Stielen stehend. Schn. Gr.
- 3 Gloria di Roma, sehr große, voll gefüllte, stark blühende Blume. Farbe hellrot. Schn. Gr.

Preis-
gruppe

- 3 **Granat**, Farbe schwärzlich-rot.
- 3 **Greif Greul**, orangerot, später orangerosa werdend, Blumen groß, edel gebaut auf kräftigen Stielen. Sehr willig wachsend und blühend.
- 2 **Hadley**, dunkelblutrot, schwärzlich schattiert, Blume sehr groß, edel gebaut. Tr. Schn. Gr. TH.
- 4 **Henriette Pechold**, leicht ziegelrot, mit orange, sehr reich blühend.
- 4 **Hens Verschuren**, langstielige, blutrote, edel gebaute Blume. Eine erstklassige Treibrose. Schn. Gr. Tr.
- 3 **Kaiserin Auguste Viktoria**, blendend weiß auf grünlich-gelbem Grund, stark duftend. Tr. Schn. Gr. TH.
- Kathrine Mock**, Sport v. Hoover, in allen Eigenarten dieser ebenbürtig. Farbe gelb mit roten Spitzen.
- 3 **Katharine Pechold**, Blume sehr groß, voll gefüllt, stark duftend, Farbe kupfrig-orange mit goldgelb schattiert. Wuchs auf. Gr. Schn. TH.
- 2 **Luna**, reingelb. Gr. TH.
- 1 **Mad. G. Forest Colcombet**, glänzend dunkelkaumin mit scharlachrot durchleuchtet, auf langem aufrechten Stiel. Tr. Schn. Gr. TH.
- 1 **Mad. Caroline Testout**, Blume seidenartig rosa, groß, gefüllt. Tr. Schn. Gr. TH.
- 1 **Mad. Eduard Herriot**, Blume von korallenroter bis dunkelroter Farbe. Gr. P.
- 2 **Mad. Jules Bouche**, zuweilen blendend reinweiß, zuweilen rosig schattiert. Blumen mittelgroß, gut gefüllt. Tr. Schn. Gr. TH.
- 3 **Mad. Charles Mallerin**, große, edle Blume, Farbe samtig-dunkelrot, stark duftend.
- 3 **Mad. Henry Guillot**, reine kupferfarbige, edle Rose.
- 2 **Mary Hart**, Blume samtig, blutrot mit schönem ambrageiben Widerschein, edle Form, außerordentlich reichblühend. Tr. Schn. Gr. P.
- Mc. Gredy's Scarlet**, scharlachrote, starkblühende Rose.
- 2 **Margaret Mc Gredy**, geranienlackrot, mit scharlachorange. Großblumig und gefüllt. Gr. TH.
- 1 **Mevr. G. A. van Rossem**, Blume dunkelorange-geilb, aprikosen- und broncefarbig schattiert und gefleckt auf goldgelbem Grund. Rückseite der Petalen bräunlich rot mit kirschrot geädert. Tr. Schn. Gr. P.
- 1 **Mrs. Henry Winnet**, leuchtend scharlachrot, stark duftend. Tr. Schn. TH.
- 2 **Mrs. Sam Mc Gredy**, Blume ganz vorzüglich gefüllt, edel geformt, auf langen, festen Stielen, duftend, Farbe scharlach-kupfer-orange mit roß schattiert. Schn. Gr. TH.

Preis-
gruppe

- 2 **Narzisse**, besonders groß in der Blüte, voll gefüllt, reingelb. Schn. Gr. TH.
- 2 **Ophelia**, Blume zart fleischfarben, oft goldgelb und rot angehaucht. Tr. Schn. Gr. TH.
- 2 **Oswald Sieper** reinweiße Blume.
- 3 **Perle von Aalsmeer**, große, gefüllte Blume, von edlem Bau, stark duftend, auf langen Stielen stehend, Farbe leuchtend karminrot. Gr. Schn. TH.
- 3 **Poinsettia**, rein scharlachrot, leuchtende Farbe, groß, genügend gefüllt. Tr. Schn. Gr.
- 1 **President Herbert Hoover**, orange-rosa bis kupferrot, Farbenschönheit, hervorragend für Treiberei. Tr. Schn. Gr. TH.
- 3 **Phyllis Gold**, Blume auf sehr langen, kräftigen Stielen, groß, gut gefüllt, von edler Form, Farbe hellgoldgelb, Wuchs kräftig. Gr. Schn. P.
- 2 **Pink Pearl**, hellrot auf gelblich-lachsfarbigem Grund, angenehmer Duft. Tr. Schn. TH.
- 3 **Quebec**, sehr reich blühend, gut gefüllt, Farbe gelb, außen rötlich schattiert. Gr. Schn. TH.
- 3 **R. M. S. Queen Mary**, lachsorange, beste Treibsorte, gut gefüllt, straffer Wuchs.
- 3 **Rapture**, Sport von Mme. Butterfly, aprikosen-korallenfarbig mit rosa-goldig vermischt, stark duftend. Tr. Schn. Gr. TH.
- 3 **Red Better Times**, blutroter Sport von Better Times, eine der besten roten Treibrosen.
- 3 **Rochefort**, eine vollblühende, orange-rosa Rose.
- 3 **Roslyn**, sonnengelb.
- 3 **Roselandia**, Sport von Golden Ophelia, Blume von schönster, goldgelber Färbung. Tr. Schn. Gr. TH.
- 3 **Rote Rapture**, Sport von Rapture mit den Blüten und Wuchseigenschaften der Stammsorte, die Belaubung ist dunkler als die Stammsorte, Farbe hell-kirschrot, im Herbst leuchtend kirschrot. Tr. Schn. Gr. TH.
- 4 **Spek's Yellow**, reingelbe Treib- und Schnittrose. Stark wachsend, die beste holländische Treibsorte.
- 2 **Souvenir de George Pernet**, Blume von türkisch-roter Farbe. Schn. Gr. P.
- 2 **Sterling**, Blume am Rande der Petalen hellrot bis zum Grunde in zartrosa übergehend, von edler Form, groß, gut gefüllt, auf langen Stielen stehend. Tr. Schn. Gr. TH.
- 1 **Ulrich Brunner fils.**, kirschrot, ziemlich groß. Tr. Schn. R.
- 2 **Vierlanden**, orangerosa, sehr starkwüchsig, mit herrlichen, gut geformten und gefüllten Blüten. Tr. Schn. Gr. TH.

Polyantha-Rosen

Preis-
gruppe

- 2 **Anne-Mette Poulsen**, Blume groß, feurig-hellrot, halb gefüllt, die Pflanze buschig und vollblühend.
- 2 **Dagmar Späth**, Sport von J. Guy, in Wuchs und Blühwilligkeit dieser völlig gleich. Farbe blendendes Alabasterweiß.
- 2 **Dick Koster**, ziemlich große, in Büscheln stehende Blumen, hell-lachsfarbig bis orange, gleichmäßig wachsend. Vorzügliche Sorte für die Treiberei.
- 2 **Donald Prior**, sehr reichblühende, wüchsige Pflanze, die Blüten stehen in Büscheln. Ungefüllt sehr haltbar. Farbe feurigrot.
- 2 **D. T. Poulsen**, rein leuchtend blutrot, in Dolden reichblühend, sehr gesund.
- 2 **Else Poulsen**, Blume zartrosa, sehr groß, halbefüllt, sehr haltbar.

Preis-
gruppe

- 3 **Erna Grotendoorst**, leuchtend karminrot.
- 2 **Eva Teschendorff**, Blume reinweiß, blühen in großen Dolden, kräftiger Wuchs.
- 2 **Feuerschein**, ein blutroter Sport von J. Guy, Farbe sehr leuchtend, Wuchs und Blütenreichtum wie bei der Stammsorte.
- 2 **Fortschritt**, hellgelb mit orangerosa, enorm reichblühend. Blüten in Dolden.
- 2 **Frau Astrid Späth**, Sport v. J. Guy, leuchtend korallenrosa.
- 2 **Gabriele Privat**, Blumen vollgefüllt, in riesigen Dolden stehend. Farbe seidenartig rosa. Sehr reich blühend, gleichmäßig im Wuchs.
- 2 **Gloria mundi**, feurig orange, ohne jeden Nebenton, ganz seltene Farbe.

Preis-
gruppe

- 2 **Gruppenkönigin**, Blume sehr groß, vollkommen gefüllt, karminrosa, die Innenseite der Petalen hellrosa, sehr reich blühend.
- 2 **Gruß an Aachen**, herrlich dunkelgelb, mit blutrot scattiert, Blumen riesig groß, eine ganz ausgezeichnete Sorte für Gruppen, Töpfe und Rabatten.
- 2 **Heidezauber**, Blume für die Art sehr groß und vollkommen gefüllt, Farbe dunkelrot, Wuchs kräftig, breitbuschig.
- 2 **Heidegruß**, stark gefüllte haltbare Blume, mit gelblich-lachsrosa Farbe, die einzelnen Blüten sehr groß.
- 2 **Heidekind**, gut gefüllt, bis zu 5 cm groß, in großen Dolden, korallenrosa, Wuchs gedrun-gen, unermüdlich blühend.
- 2 **Helgoland**, Polyantha-Hybride, sehr große halb-gefüllte Blumen, in großen Büscheln stehend. Farbe rein leuchtend blutrot. Wuchs aufrecht und gedrun-gen.
- 3 **Holstein**, Blume in großen Büscheln, dicht zu-sammenstehend, einfach, sehr groß. Farbe feurig blutrot, Wuchs breitbuschig.
- 2 **J. F. Müller**, Sport von Rödhütte, feurig blut-rot. Gesund belaubt, Dauerblüher.
- 2 **Joseph Guy**, Blumen leuchtend scharlachrot, beste aller Polyanthen.

Preis-
gruppe

- 2 **Karl Kempkes**, Blüten auffallend groß, Farbe leuchtend dunkelrot, in großen Büscheln blühend.
- 2 **Kirsten Poulsen**, Blumen feurig orange-purpur-rot, einfach.
- 2 **Koralie**, eine leuchtend blutrote Eles Poulsen.
- 2 **Orange Triumph**, Blume orange scharlachrot, gut gefüllt, in sehr großen Dolden blühend. Wuchs stark buschig.
- 3 **Poulsens Pink**, sehr große, halb gefüllte Blu-men. Farbe lachsrosa, Wuchs buschig, auf-recht.
- 2 **Rosa Gruß an Aachen**, Sport von Gruß an Aachen, dieser ebenbürtig, Farbe rosa.
- 2 **Rödhütte**, leuchtend rot, in großen Dolden blühend, kräftig, gesund.
- 2 **Roseneife**, **Polyantha-Hybride**. Die ziemlich großen Blumen von edlem Bau stehen meistens in großen Büscheln. Farbe an der Außenseite der Petalen silbrig-rosa, von der Innenseite rosig-weiß. Wuchs mittelhoch.
- 2 **Rouge**, Blumen leuchtend rein scharlachrot, in großen Dolden blühend.
- 3 **Ruby**, Farbe leuchtend rubinrot, Blumen ge-füllt, haltbar, in großen Dolden blühend, reichblühend. Wuchs buschig, stark wachsend.
- 3 **Silberlachs**, Polyantha-Hybride, Farbe silbrig-rosa, Blumen groß, fast einfach, stark wach-send, sehr winterhart.
- 1 **Verdun**, lebhaft purpurkarmin.

Kletter- und Rankrosen

Preis-
gruppe

- 3 **American-Pillar**, rein rosenschot m. weißer Mitte, Blüten einfach, in riesigen Dolden.
- 3 **Bonfire**, dunkelscharlachrot, mehltaufreie Rambler
- 3 **Dorothy Perkins**, kirschrot, Blumen in riesigen Dolden, sehr dankbar blühend.
- 3 **Eva**, blutrote, immerblühende Rankrose mit riesigen Blumen in gewaltigen Dolden. Die Pflanze rankt stark und blüht unaufhörlich an jedem Trieb. Sie hat völlig krankheitsfreies Laub.
- 3 **Exelsa**, leuchtend dunkelrot, Blume gebaut wie bei D. Perkins. Stark wachsend.
- 3 **Golden Climber**, Farbe goldgelb.
- 3 **Golden Gloew**, rein goldgelb, Blume edel-rosenähnlich.
- 3 **Hamburg**, Einzelblüten von bedeutender Größe in großen Dolden stehend. Feurig-scharlachrot.
- 3 **Hiawatha**, Blumen einfach in großen Dolden, blutrot mit weißer Mitte.
- 3 **Elegance**, reingelb, gefüllt, edelrosenähnlich, Pflanze starkwüchsig.

Preis-
gruppe

- 3 **Le Reve**, rankende Lutea Hybride, Farbe rein goldgelb.
- 3 **Schloß Friedenstein**, dunkellila
- 3 **New Dawn**, zartrosa, Edelrosen ähnlich, duftende Blumen, stark rankend, ungeheuer reich blühend.
- 3 **Pauls scarlet Climber**, leuchtend scharlachrot, Pflanze sehr rankend, mit großer krankheits-freier Belaubung, schönste aller Rankrosen.
- 3 **Frl. Octavia Hesse**, rahmweiß
- 3 **Fragezeichen**, rosa, großblumig
- 3 **Tausendschön**, zartrosa, Blumen in großen Dol-den, stark rankend, stachelose Pflanzen.
- 3 **Gloire de Dijon**, lachsgelb, Blume sehr groß, starkwüchsig und widerstandsfähig.
- 3 **White Dorothy**, weißblühender Sport von Do-rothy Perkins, Blüte milchweiß, zuweilen rosig angehaucht.
- 3 **Wilhelm**, blutrote, gefüllte Blumen in enorm großen Riesendolden, die Pflanze wächst stark aufrecht, überhängend und blüht den ganzen Sommer ununterbrochen.

Park- und Wildrosen

Preis-
gruppe

- Rosa alba
 - 3 **Mad. Plantier**, rein weiß, mittelgroß, starkwüchsig.
 - 3 **Maidens Blush**, blaß fleischfarbig rosa.
- 3 **Rosa californica flore pleno** (Theano), Blüten rosarot.
- 1 **Rosa canina**, die bekannte Hundsrose.
- Rosa centifolia muscosa
 - 3 **Blanche Morreau**, rein weiß
 - 3 **Capitain John Ingram**, schwärzlichrot.
 - 3 **Centifolia muscosa**, kräftig rosa.
 - 3 **Christata**, Blume rosa.
- 1 **Rosa gallica** (L) Essigrose, bis 1,50 m hoch werdend, dicht, stachelig und borstig. Blätter rau, dunkel-grün, Blüten rosa bis rot, 5–6 cm breit, Frucht rundlich, ziegelrot, treibt starke Aus-läufer. Deshalb besonders geeignet für Befestigung von Böschungen.
splendens (chapeau de Napoleon), Blumen sehr groß, halb gefüllt, leuchtend feurig rot, die ganze Pflanze bedeckend.
versicolor, karminrosa, weiß gestreift, halb gefüllt, sehr reichblühend.

Preis-
gruppe

- 3 *Rosa Hugonis*, Blume einfach groß, leuchtend goldgelb. Sehr reichblühend.
 3 *Rosa hybrida befera Hermann Löns*. Blume sehr groß, einfach, leuchtend brennend rot.
Rosa lutea
 3 *Harrisoni*, leuchtend gelb, gefüllt.
 3 *bicolor*, außen gelb, innen kapuzinerrot.
 3 *bicolor atropurpurea*, Blumen außen gelb, innen kapuzinerrot, leuchtender als bei der *lutea bicolor*.
 3 *Parkfeuer*, Blume feurig rot.
 3 *Persian Yellow*, rein gelb.
 3 *Rosa macrophylla Amalata*, Blüte rosa, sehr stachelig, reicher Fruchtbehang von längl. roten Früchten.
 3 *Rosa moschata alba hybrid grandiflora* (v. Freundiana) (Graeb.), rein weiß.
 1 *multiflora*, in weißen Rispen blühend, Wuchs überhängend.
 3 *nutkana* (Presl), bis 3 m hoch werdend, mit breiten Stacheln. Blätter dunkelgrün, unterseits leicht drüsig behaart, Blüten einfach lila-rosa bis 7 cm groß, Früchte kugelig, lebhaft rot.
 3 *omeiensis pteracantha* (Rend. u. Wils), bis 3 m hoch werdend. Dornen stark verbreitend zu roten Flügeln umgebildet. Blüten meist mit 4 Petalen, weiß, Früchte birnenförmig, hochrot.
 1 *Rosa pimpinellifolia*, siehe *spinosissima*.
 1 *Rosa rubiginosa*, hellrosa, kleine Blumen.
 3 *Fritz Nobis*, *Rubiginosa*hybride. Blüte in Rispen bis zu 6 zusammenstehend, gefüllt, gelblich-rosa, später weißlichgelb.
 3 *Rosa rubiginosa*
hybrida Rosenwunder, hellrot, vollkommen gefüllt, edelrosenähnliche Blüten, starkwüchsig, vollkommen winterharte Pflanzen.
 3 *Josef Rothmund*, *Rubiginosa*hybride. Blüten in Rispen bis zu 6 zusammenstehend, gefüllt, stark duftend. Farbe lachsrosa mit gelblichrosa.
 3 *magnifica*, Blumen groß, halb gefüllt.
 1 *Rosa rubrifolia*, hellrot, rötliches Laub.
Rosa rugosa
 1 *alba* (Ware) Abart der *rosa rugosa* mit weißen Blüten.
 3 *A parfum de l'Hay*, Blumen groß, gefüllt, karminkirschrot.
 3 *Conrad Ferd. Meyer*, Blumen groß, gefüllt, rein centifolienrosa.
 3 *Dr. Eckener*, sattgelb durchzogen, große Blume, erscheint schon im Frühjahr, starkwüchsig, reichblühend und winterhart.
 3 *Fr. J. Grotendorst*, Blüten in Dolden stehend, mittelgroß, orangerot.
 3 *Goldener Traum*, langtriebig, früh blühend mit großen, gefüllten, wohlriechenden Blumen.
 1 *hollandica* (hort.), stark wachsender, mittelhoher Strauch mit roten Blüten.
 3 *Nova Zembla*, rein weiß, duftend.
 1 *Regelliana*, weiß und rot blühende Form der wilden *rugosa*.
 3 *Ruskin*, Blume groß bis sehr groß, voll gefüllt, stark duftend, dunkelkarmesinrot.
 3 *Sanguinaire*, Blumen leuchtend blutrot in purpur übergehend auf gelbem Grund.
 3 *Stern von Prag*, sammeltartig schwarzrot, reichblühend, duftend.
 1 *Rosa spinosissima* (*pimpinellifolia*), Blüte einfach weiß. Busch dicht verzweigt wachsend.
 3 *grandiflora hybrida Karl Foerster*, Blüte sehr groß, gefüllt blühend, reinweiß, außerordentlich reich blühend.
 3 *hispida hybr.* *Frühlingsgold*, Blüte einfach sehr groß, rein goldgelb, Außenseite der Blumenblätter bei den Knospen braunrot gestreift, sehr früh und überreich blühend. Wuchs stark überhängend.
 1 *virginiana (lucida)*, Blüte rosa, Blätter glänzend dunkelgrün, Früchte scharlachrot.

Zur Verwendung als Parkrosen

empfehlen wir, außer den oben angeführten Park- und Wildrosen, aus der Gruppe der unter Kletter- und Rankrosen aufgeführten Rosen noch folgende Sorten:

Blaze
Eva

Hamburg
Pauls Sc. Climber

Reveil Dijonais
Wilhelm

Laubhölzer

Ziergehölze für Garten und Park in 3—5jähriger, kräftiger Ware, mehrmals verpflanzt aus weitem Stand.

Allee-, Solitär- und Zierbäume:

Die als „verpflanzt“ bezeichneten Bäume sind in fertigem Zustande in besonders weitem Stande verschult. Ein gutes Anwachsen ist dadurch sichergestellt. Der Stammumfang wird 1 Meter über dem Erdboden gemessen.

Heckenpflanzen:

Alle durch ein „H“ bezeichneten Pflanzen sind Heckenpflanzen. Wir kultivieren unsere Heckenpflanzen auf mildem Lehm Boden.

Durch sachgemäßen Rückschnitt erzielen wir eine dichtverzweigte, gut garnierte Heckenware. Pflanzen von *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Cornus mas.* und *Fagus sylvatica* werden, soweit es notwendig ist, um einen starken Mitteltrieb zu erzielen, an Stäben gezogen. Ein reichlich gemessener Reihenabstand (70 cm) bietet jeder Pflanze die Möglichkeit zu freiem, üppigem Wachstum.

Zeichenerklärung:

- B = Bienenweide.
 H = Heckenpflanze.
 J = Immergrünes Gehölz.
 R = Rauchhartes Gehölz, besonders geeignet für Industriegegenden.
 Sch = Gehölz für Schatten- und Unterholzpflanzung.
 St = Steingartenpflanze.
 Tr = Trauerbäume.

a) In Sorten nach unserer Wahl:

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
1. Vorsträucher, Zier- und Decksträucher bis zur Preislage von 45,— DM per 100 Stück				37,50
2. Vorsträucher, Zier- und Decksträucher bis zur Preislage von 60,— DM per 100 Stück				52,50
3. Baumartige Gehölze 200—300 cm hoch aus allen Preislagen				100,—

b) In Sorten nach Wahl des Bestellers:

Acer (L.) Ahorn (Aceraceae)

H.R.Sch. *campestre* (L.) Feldahorn, sehr gute Heckenpflanze für kalkhaltige Böden, auch als Straßenbaum zu empfehlen. Mehrmals verpflanzte, regelmäßig geschnittene Büsche aus weitem Stande.

Auf Wunsch liefern wir eine mittlere Qualität, deren Preise liegen 20% niedriger.

2X verpflanzte Heister mit unregelmäßiger Verzweigung

80—100	0,80	6,75	60,—
110—125	1,05	9,40	82,50
125—150	1,25	11,—	97,50
150—175	1,50	13,10	120,—
175—200	1,90	16,50	150,—
200—225	2,40	20,50	187,50
80—100	0,80	6,75	60,—
100—125	0,95	8,50	75,—
125—150	1,10	10,—	94,—

Alleebäume, Stammumfang

7—8	3,75	33,75	
8—10	4,70	41,—	
10—12	5,60	49,50	
8—10	6,—		
10—12	7,10		

in extra weitem Stand verpflanzt

	<i>dasycarpum</i> (Ehrh.) siehe <i>Acer sacharinum</i> (L.)			
H.R.	<i>ginnala</i> (Maxim.) Strauch oder Baum bis zu 7 m, Zweige dünn, Blätter dreilappig, glänzend dunkelgrün mit leuchtendroter Herbstfärbung	80—120	0,80	6,75
St.	<i>japonicum aureum</i> (Hort) (<i>A. circinatum aureum</i>) (Schwer) schwachwachsender Strauch, Blätter 7—11lappig, 8—14 cm breit und lang mit gelber Farbe, mit Ballen	30—40	4,—	
		40—60	9,—	
	<i>laetum rubrum</i> (Rupr.) (<i>A. colicum rubrum</i>) (Booth) (<i>A. cappadocium</i> var. <i>rubrum</i>) (Nesh) bis 20 m hoch werdend. Baum mit rötlicher Rinde, Blätter im Austrieb dunkelrot, später grün werdend	100—125	1,10	

Acer (L.) Ahorn (Aceraceae)

negundo (L.) Eschen-Ahorn, bis 25 m hoch, oft mehrstämmiger Baum mit überhängender Verzweigung mit hellgrünen, drei- bis fünfflappigen Blättern, verpfl. Heister

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
150—200	0,95	8,25	80,—
200—250	1,10	10,—	94,—

arg. variegatum (Bonamy) (Blätter breit, weißrandig

100—125	1,90	17,—	
---------	------	------	--

curea variegatum (Booth) mit gelbgerandeten Blättern

100—125	1,90	17,—	
---------	------	------	--

odessanum (Hort.) Austriebe bronze, Blätter fettgelb

70—100	1,90	17,—	
--------	------	------	--

palmatum (Thunb.) (A. polymorphum) (Sieb u. Zucc.) Fächerahorn, seine roten Zweige tragen zierlich tiefgelappte, frischgrüne Blätter, die sich im Herbst prächtig karminrot färben.

Mit Erdballen

60—80	1,10		
80—100	1,50		

St. **atripurpureum** (Nichols) Blätter dunkelpurpurrot, mit Erdballen

40—60	5,60		
60—80	6,—		
80—100	9,—		

St. **var. dissectum** (K. Koch) Blätter mit bis zum Grunde gefiederten Lappen, mit Ballen

30—40	7,50		
40—60	12,—		
60—80	18,—		

St. **var. dissect atripurpureum** (Hort.), Laub tiefgeschlitzt, dunkelrot, mit Ballen

30—40	7,50		
40—60	12,—		
60—80	18,—		

platanoïdes (L.) Spitzahorn. Bekanntster heimischer Straßen- und Parkbaum mit spitzlappigen Blättern

125—150	0,95	8,25	80,—
150—200	1,10	10,—	94,—
200—250	1,45	12,75	112,50
250—300	1,80	15,75	142,50

Alleebäume. Stammumfang

8—10	2,80	24,75	225,—
10—12	3,75	33,75	300,—
12—14	4,70	41,20	375,—
14—16	6,—	54,—	490,—

in extra weitem Stand verpflanzt {

12—14	6,75		
14—16	8,25		
16—18	9,40		

globosum (Nichols) Kugelahorn, bildet eine schöne, regelmäßige Kugelkrone.

Alleebäume. Stammumfang

8—12	3,75	33,75	
10—12	4,70	41,20	

in extra weitem Stand verpflanzt {

10—12	6,40		
12—14	7,50		
14—16	9,75		

Reitenbachi (Nichols). Austrieb rötlich-braun, Laub im Spätsommer schwärzlich-rot

150—200	2,25	20,25	
---------	------	-------	--

Alleebäume. Stammumfang

8—10	5,25		
10—12	6,40		
12—14	7,50		

in extra weitem Stand verpflanzt {

10—12	6,40		
12—14	7,50		
14—16	9,75		

Schwedleri (K. Koch). Austrieb blutrot, Laub später dunkelrot-grün, Blattstiele und Nerven rot bleibend

150—200	2,25	20,25	
---------	------	-------	--

Alleebäume. Stammumfang

8—10	3,75	33,75	
10—12	4,70	41,20	
12—14	5,60	49,50	

in extra weitem Stand verpflanzt {

10—12	6,40		
12—14	7,50		
14—16	9,75		
16—18	11,25		

pseudoplatanus (L.) Bergahorn. Schöner heimischer Straßenbaum mit derben, rundlichen, fünfflappigen Blättern

125—150	0,95	8,25	80,—
150—200	1,10	10,—	94,—
200—250	1,45	12,75	112,50
250—300	1,80	15,75	142,50

Alleebäume. Stammumfang

8—10	2,80	24,75	225,—
10—12	3,75	33,75	300,—
12—14	4,70	41,20	375,—
14—16	6,—	54,—	487,50

in extra weitem Stand verpflanzt {

12—14	6,75		
14—16	8,25		
16—18	9,40		

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Acer (L.) Ahorn (Aceraceae)				
<i>sacharinum</i> (L.) (A. dasycarpum) (Ehrh.) (A. eriocarpum) (Michx.) Silberahorn. Hoher Baum mit mälerisch überhängenden Zweigen und spitz gelappten, unterseits silbergrauen Blättern	125—150 150—200	0,95 1,10	8,25 10,—	80,— 94,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	2,80 3,75 4,70	24,75 33,75 41,25	225,— 300,— 375,—
in extra weitem Stand verpflanzt {	12—14 14—16 16—18	6,75 8,25 9,40		
<i>lutescens</i> (Pax) mit leuchtendgelbem Blattaustrieb und ebensolcher Herbstfärbung	150—200	2,25	20,—	
<i>Wieri</i> (Pax) Zweige hängend, Blätter tief gespalten, Lappen fein schmal zerschnitten. Die schönsten der Formen	150—200	2,25	20,—	
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12	4,70 5,60		
Aesculus (L.) Roßkastanie (Hippocastanaceae)				
B. <i>carnea</i> (Hayne) (A. rubicunda) (Loisl.)-A. hippocastanum x pavia. Rotblühende Roßkastanie, bildet rundliche Kronen	8—10 10—12 12—14 14—16	5,65 7,10 9,40 11,60	50,— 62,— 82,50 105,—	
Alleebäume mit ein- bis zweijährigen Kronen, Stammumfang				
Alleebäume mit mehrjährigen Kronen, Stammumfang	12—14 14—16 16—18	11,25 13,50 17,—		
in extra weitem Stand verpflanzt				
B. <i>hippocastanum</i> (L.) gem. Roßkastanie. Bekanntster schöner Park- und Alleebaum	125—150 150—200 200—250 250—300	1,10 1,45 1,80 2,25	10,— 12,75 15,75 20,—	94,— 112,50 142,50 190,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16 16—18	2,80 3,75 4,70 6,— 6,95	24,75 33,75 41,25 54,— 61,50	225,— 300,— 375,— 490,— 560,—
in extra weitem Stand verpflanzt {	14—16 16—18 18—20 20—24	8,25 9,40 11,25 16,50		
<i>plena</i> (Lenn) (Baumanii) S. Schn.). Blüten weiß gefüllt, die Krone bildet regelmäßige Pyramiden	150—200	2,25		
Alleebäume, Stammumfang	14—16 16—18	12,— 13,10		
Sch. <i>parviflora</i> (Walt) (A. macrostachya) (Mchx.). Breiter, bis 4 m hoher Strauch, Blüten weißlich-rosa, in schmalen, 20—30 cm langen Rispen über den Blättern stehend, Blütezeit Juli-August	40—60 60—100	2,25 3,40		
<i>rubicunda</i> (Loisl.) siehe unter <i>carnea</i> (Hayne)				
Ailanthus (Desf.) Götterb. (Simarubaceae)				
B.R. <i>glandulosa</i> (Desf.) (A. japonica) (hort) (A. procera) (Salid). Baum bis 25 m, Rinden glatt mit weißlichen Rissen, fein gewimperte Fliederblätter, 40—60 cm lang, sehr zierend die hellbräunlichen Fruchstände	100—125 125—150 150—200	0,75 1,10 1,35	6,75	
Alnus (Gaertn.) Erle (Betulaceae)				
B.Sch. <i>glutinosa</i> (Gaertn.) A. vulgaris (Hill.) Schwarzerle. Heimischer Baum, der auch auf feuchtem Boden wächst	100—150 150—200 200—250 250—300	0,75 0,95 1,10 1,45	6,75 8,25 10,— 12,75	60,— 80,— 94,— 112,50
B.Sch. <i>incana</i> (Willd). Weißerle. Heimischer Baum, wächst auf trockenem Boden	100—150 150—200 200—250 250—300	0,75 0,95 1,10 1,45	6,75 8,25 10,— 12,75	60,— 80,— 94,— 112,50

Amelanchier (Med.) Felsenbirne (Rosaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
J.Sch. <i>botryapium</i> (de Cand.), wird 4—6 m hoch. Blüten weiß, in aufrechten Trauben	60—80 80—125	0,95 1,10	8,25 10,—	
<i>canadensis</i> (Med.). Blätter verkehrt eiförmig zugespitzt, bis 8 cm lang, scharf gesägt, unterseits graugrün, Herbstfärbung orange-scharlach. Blüten weiß in dichten, nickenden Trauben	60—80 80—125	0,95 1,10	8,25 10,—	
<i>oblongifolia</i> (Torr u. Gray) (Am. can. obovalis) (Sarg) aufrechter Strauch, Blätter länglich, fein gesägt. Blüten weiß, in kurzen, aufrechten Trauben	60—80 80—125	0,95 1,10	8,25 10,—	

Amorpha (L.) Bastardindigo (Leguminosae)

B. <i>fruticosa</i> (L.) bis 4 m hoch werdender Strauch, bis 30 cm lange gefiederte Blätter, Blüten violett-blau, in 15 cm langen aufrechten Trauben	125—175	0,55	5,—	45,—
--	---------	------	-----	------

Amygdalus (L.) siehe unter Prunus**Andromeda (L.) Lavendelheide (Ericaceae)**

J.Sch. <i>floribunda</i> (Pursh) (Pieris floribunda) (Benth u. Hook). Bis 2 m hoher, aufrecht wachsender Strauch, Blätter ei-elliptisch, 3—8 cm lang, kerbig gesägt, weiße Blüten in dichten, 5—10 cm langen Blütenrispen. Blütezeit April bis Mai	30—40 40—60 60—80	2,— 3,10 5,20	16,50 24,75 41,50	
J.R.Sch. <i>japonica</i> (Thunb) (Pieris japonica) (D. Don). Breit wachsender Strauch, Blätter verkehrt eiförmig bis lanzettlich, kerbig gesägt, oben dunkelgrün glänzend, Blüten weiß in hängenden 6-12 cm langen Rispen. Blütezeit April bis Mai	30—40 40—60 60—80	2,— 3,10 5,20	16,50 24,75 41,50	

Artemisia (L.) Beifuß (Compositae)

<i>abrotanum</i> (L.) Eberraute, Halbstrauch bis 1 m hoch, Blätter doppelt fiederspaltig, unten grauhaarig, Blütenköpfe gelb, zahlreich in reihenständigen Trauben	60—80 80—125	0,56 0,75	5,— 6,75	
--	-----------------	--------------	-------------	--

Aucuba (Thunb.) Aukube (Cornaceae)

J.Sch. <i>japonica</i> (Thunb) immergrüner bis 5 m hoher Strauch, Blätter lederartig, ei-elliptisch, bis 20 cm lang, beiders. glänzendgrün	40—60	4,50		
J.Sch. <i>variegata</i> (Dombrain). Ähnlich der vorigen Art, jedoch mit gelbgefleckten Blättern	40—60	4,50		

Azalea (L.) Azalee (Ericaceae)

St. <i>japonica</i> (Gray) (Rhododendron jap.) (Suring). Japanische Azalee, winterhart, niedrig bleibend, in den Farben orange, orangerot, lila, rosa, mit Ballen	20—25 25—30 30—40	2,80 3,75 4,70	24,75 33,75 41,25	225,— 300,— 375,—
<i>mollis</i> (Bl.) (Rhododendron molle) (G. Don) (Rh. sinense) (Sweet), blüht reich im Mai-Juni in gelben, orangen und roten Tönen, mit Ballen	20—30 30—40 40—50 50—60 60—70	2,— 2,45 2,80 3,35 4,70	18,— 21,— 24,75 31,— 41,25	150,— 187,50 225,— 280,— 375,—
Hybriden in veredelten Sorten u. schönsten Farben, mit Ballen	30—40 40—50 50—60	3,40 4,— 5,60	30,— 36,75 50,—	270,— 330,— 450,—
<i>pontica</i> (L.) (Rhododendron lutescens) (Sweet) (Rh. flavum) (G. Don). Pontisch. Azalee. Blüten trichterförmig, gelb bis orange-goldgelb in großen, lockeren Dolden, stark duftend, mit Ballen	20—30 30—40 40—50 50—60	1,90 2,20 2,50 3,—	16,50 19,— 22,50 27,50	142,50 169,— 200,— 250,—
Hybriden in veredelten Sorten, alle Farben, mit Ballen	30—40 40—50 50—60	3,35 4,— 5,60	30,— 36,75 50,—	270,— 330,— 450,—
<i>Vuykiana</i> (Hort.) Kreuzung von A. japonica und A. mollis, sehr reichblühend, großblumig, mit Ballen	25—30 30—40 40—50 50—60	2,80 3,75 4,70 6,20	24,75 33,75 41,25 56,—	225,— 300,— 375,— 510,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B. Berberis (L.) Berberitze, Sauerdorn (Berberidaceae)					
H.J. St.	buxifolia nana (C. Schn.) (B. dulcis nana) (Hort), Blätter verkehrt ei-elliptisch, Blüten orangegelb, Wuchs niedrig dicht, rundlich, viel zu Einfassungen verwendet	15—30 20—30	0,42 0,56	3,40 4,70	30,— 42,—
J.St.	candidula (C. Schn.) immergrüner Strauch, klein bleibend, Blätter elliptisch, mit wenigen dornigen Zähnen, oben dunkelgrün, unterseits weiß, Blüten goldgelb, einzeln, mit Ballen	20—25 25—30 30—40	2,— 2,25 3,40	16,50 20,— 27,—	135,— 180,— 240,—
J.St.	Gagnepainii (C. Schn.). Bis 1,5 m hoch werdender immergrüner Strauch, Zweige leicht warzig, gelbgrau, Blätter schmal lanzettlich, leicht gewellt, leicht dornig gesägt, Rand etwas umgerollt, oben matt dunkelgrün, unten heller, Blüten goldgelb zu 3—10 gebüschelt, Frucht eiförmig bis 1 cm lang, blauschwarz bereift, mit Ballen	25—30 30—40 40—50	2,— 2,50 3,35	16,50 20,— 27,—	
J.St.	hybrido-Gagnepainii-Terra Nova (Hort.), eine Kreuzung von Gagnepainii und verruculosa in der Form in der Mitte zwischen den Eltern stehend, mit Ballen	25—30 30—40	2,— 2,50	16,50 20,—	
St.	giraldi (Hesse), Strauch mit Bronzeton, früh austreibend, ziemlich großes Blatt, stachelzählig, meist rotbraun, Herbstfärbung rötlich, Blüten grünlich gelb in bis 12 cm langen dichten Trauben, Frucht länglich, schwarzrot, mit Ballen	30—40	2,25		
J.St.	Hookeri (Lem.) (B. Jamesonii) (Hort). Immergrüner Strauch. Blätter elliptisch lanzettlich, 3—7 cm lang, buchtig dornig gesägt, oben dunkelgrün, unten weiß, Nerven hervortretend, Blüten gelb, 3—6 gebüschelt. Frucht länglich 1 cm lang, schwarzrot, mit Ballen	25—30 30—40 40—50	2,— 2,50 3,40	16,50 20,— 27,—	150,—
B. J.St.	Julianae (Schneid), immergrüner Strauch, bis 2 m hoch. Graugelbe Zweige, etwas kantig. Stacheln dreiteilig, 1—3 cm lang. Blätter 3—6 cm lang, lanzettlich, dornig, gesägt, oberseits dunkelgrün, lederartig. Blüten bis zu 15 Stück in Büscheln, gelb, außen rötlich. Frucht bis 8 mm lang, bläulich-schwarz bereift, mit Ballen	25—30 30—40 40—50	2,— 2,50 3,40	16,50 20,— 27,—	
J.St.	linearifolia (Phil.). Immergrüner Strauch, 1—2 m hoch werdend. Stacheln dreiteilig, 1—1½ cm lang. Blätter 3—5 cm, linearisch, dornig zugespitzt, Rand eingerollt, oben dunkelgrün, unten bläulich. Blüten fast 2 cm, innen tief orange, außen mehr gerötet. Frucht 1,5 cm lang, schwarz bereift, mit Ballen	30—40	4,—		
J.St.	lologensis (Sandw.). (B. Darwinii × linearifolia) immergrüner Strauch mit etwas breiteren Blättern als linearifolia. Blüten orange, mit Ballen	30—40	4,—		
J.St.	stenophylla (Ldl.) (B. Darwinii × empetrifolia) immergrüner bis 3 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, Blätter schmal lanzettlich bis 3 cm lang, stachelspitz, Rand umgerollt, oben dunkelgrün, unten weißlich. Blüten goldgelb, Frucht erbsengroß, blauschwarz bereift, mit Ballen	30—40 40—50	2,50 3,40	20,— 27,—	
H.	Thunbergi (DC), bis 1,5 m hoch werdender, dichtzweigiger Strauch, Blätter verkehrt ei-förmig, spatelig bis länglich, von frischgrüner, unten bläulicher Farbe, im Herbst sich scharlachrot färbend. Blüten gelb in kleinen Doldenbüscheln, Frucht ca. 1 cm lang, glänzend hochrot	30—40 40—60 60—80 30—40 40—60	0,45 0,56 0,64 0,35 0,42	4,10 5,— 5,60 3,— 3,40	37,50 45,— 52,50 24,— 30,—
	leichte Büsche aus halbweitem Stand				
H.	atropurpurea (Hort), Blätter tief karminrot, sehr wertvolle Heckenpflanze	30—40 40—60 30—40 40—60	0,45 0,56 0,35 0,42	4,10 5,— 3,— 3,40	37,50 45,— 24,— 30,—
	leichte Büsche aus halbweitem Stand				
J.St.	verruculosa (Hemsl. et. Wils.), klein bleibender immergrüner Strauch, Zweige dicht mit kleinen Warzen besetzt, Blätter ei-elliptisch, bis 2,5 cm lang, dornig gezähnt, Rand umgerollt, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits blaugrün, Blüten goldgelb, Frucht länglich, blauschwarz bereift, mit Ballen	20—25 25—30 30—40	2,— 2,50 3,40	16,50 20,— 27,—	
H.St.	Wilsonae (Hemsl.) halbbimmergrüner, dichtbuschiger, niedriger Strauch, Blätter lanzettlich bis 3 cm lang, stachelspitz, graugrün, bis in den Winter haftend, zuletzt prächtig rot. Blüten klein, hellgelb, Frucht tief karmin, leicht bereift, mit Ballen	30—40 40—60	1,15 1,45	10,50 12,75	

Betula (L.) Birke (Betulaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
pubescens (Ehrh.) (B. alba) (L.) heimische, gemeine Moorbirke	125—150	0,95	8,25	80,—
Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung mit	150—200	1,10	10,—	94,—
feuchtem Moos verpackt geliefert.	200—250	1,45	12,75	112,50
Bei Lieferung mit Erdballen erfolgt ein Preisauflschlag	250—300	1,80	15,75	142,50
von 25%.	300—350	2,25	20,—	190,—
	350—400	2,80	25,—	225,—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2,25	20,—	190,—
mit Ballen 25 % Aufschlag	8—10	2,80	25,—	225,—
	10—12	3,75	34,—	300,—
R atripurpurea (hort.), Blutbirk, Blätter dunkelrot, mit Ballen	150—200	4,50		
	200—250	6,—		
	250—300	7,50		
verrucosa (Ehrh.) (B. pendula) (Rth.), bekannte heimische Weiß-	125—150	0,95	8,25	80,—
oder Maibirke	150—200	1,10	10,—	94,—
Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung mit	200—250	1,45	12,75	112,50
feuchtem Moos verpackt geliefert.	250—300	1,80	15,75	142,50
Bei Lieferung mit Erdballen erfolgt ein Preisauflschlag	300—350	2,25	20,—	190,—
von 25%.	350—400	2,80	25,—	225,—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2,25	20,—	190,—
mit Ballen 25 % Aufschlag	8—10	2,80	25,—	225,—
	10—12	3,75	34,—	300,—
laciniata (Wahlb.) (B. alba laciniata) (Späth.), Blätter tief ge-	150—200	4,50		
lappt mit unregelmäßig gesägten Zähnen, mit Ballen	200—250	6,—		
Tr. tristis (Hort), Trauerbirke, feinzweigige Hängeform mit aufrecht	125—150	3,40		
wachsendem Spitzentrieb, mit Ballen	150—200	4,50		
	200—250	6,—		
	250—300	7,50		
	300—350	9,—		
Alleebäume, Stammumfang {	7—8	7,50		
mit Ballen {	8—10	9,50		
	10—12	11,25		
Tr. Youngii (C. Schn.) (B. per.d. eleg.) (Winkel) (B. alba pend	125—150	3,40		
Youngii) (Th. Moore), bekannte Trauerbirke, Zweige senkrecht	150—200	4,50		
herabhängend, mit Ballen	200—250	6,—		
	250—300	7,50		
	300—350	9,—		
Alleebäume, Stammumfang {	7—8	7,50		
mit Ballen {	8—10	9,—		
	10—12	11,25		

Bruckenthalia (Reichenb.) Ährenheide (Ericaceae)

J.St. spiculifolia (Reichenb.) (Erica spiculifolia), niedriger, immer-				
grüner Strauch, Zweige dünn, sehr dicht beblättert, Blätter				
gegenständig, 3—5 mm lang, schwach behaart. Blüten hell-				
rosa in dichten 2—3 cm langen Ähren im Juni-Juli	8—12 ø	0,55	5,10	45,—

Buddlea (L.) Sommerflieder (Loganiaceae)

R.B. Davidii (Franch.) (B. variabilis) (Hemst.), Blätter ei-lanzettlich,				
bis 25 cm lang, zugespitzt, dicht gesägt, oben dunkelgrün,				
unten weißfilzig, Blüten lila in aufrechten bis 25 cm langen				
Ähren	100—150	0,75	6,75	60,—
R.B. Ile de France (Hort.), Blüten purpurviolett. Bis 40 cm lange				
Ähren, die schönste aller Formen	80—125	1,50	13,50	120,—

Buxus (L.) Buchsbaum (Buxaceae)

H. Buchsbaum für Einfassungen, (L.), wird in Normalbunden von				
5 lfd. Metern geliefert, deren jedes ca. 30 cm oberen Durch-				
messer hat.				

1 lfd. m	0,40 DM
100 lfd. m	30,— DM
1000 lfd. m	270,— DM
verpflanzt 1 lfd. m	0,60 DM
100 lfd. m	56,— DM
1000 lfd. m	525,— DM

Buxus (L.) Buchsbaum (Buxaceae)H.Sch. *sempervirens arborescens* (Mill.) mehrmalig verschulte Heckenpflanzen, ohne Ballen

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
8—12 cm breit	15—20	0,40	3,40	30,—
10—15 cm breit	20—25	0,49	4,20	37,50
12—16 cm breit	25—30	0,60	5,10	45,—
13—18 cm breit	30—40	0,75	6,75	60,—
	40—50	0,85	7,50	67,50

Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung in Moos verpackt geliefert.

Heckenpflanzen mit Ballen, geschnitten

12—16 cm breit	20—25	0,70	6,35	52,50
13—18 cm breit	25—35	0,75	6,75	60,—
15—20 cm breit	30—40	1,05	8,25	75,—
20—25 cm breit	40—50	1,30	10,—	90,—
	50—60	1,50	12,50	110,—
	60—70	2,50	20,—	180,—

Pyramiden

40—50	2,70	22,—	195,—
50—60	3,40	27,—	240,—
60—70	4,10	34,—	300,—
70—80	5,20	41,—	375,—
80—90			
90—100	6,10	50,—	
100—120	7,90	62,—	

Kugeln und Halbkugeln

20—25	2,05	16,50	150,—
25—30	2,50	20,—	180,—
30—35	3,75	30,—	
35—40	4,90	40,—	
40—50	6,75	56,—	
50—60	9,—	75,—	

Büsche, breite, natürlich gewachsene Pflanzen, teilweise breiter als hoch

40—60	3,10	25,—	225,—
60—80	3,95	31,50	280,—
80—100	6,40	54,—	
100—125	9,25	82,50	

japonica aurea (hort.) Blätter goldgelb, wird 2 m hoch, liebt Halbschatten, Höhe oder Breite

25—30	2,10		
30—40	2,70		
40—50	3,75		

Calluna (Salisb.) Besenheide (Ericaceae)B. J. St. *vulgaris* (Hull) (*Erica vulgaris* (L.)), gemeine Besenheide, Blüten rosa

1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
0,26	2,25	18,75	150,—

Durchm.

B. J. St. *alba* (Sweet), weißblühend

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *Alportii* (Hort.) stärker wachsend, Blüten karmin

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *aurea* (Forbes), Blüte rosa, Blätter goldgelb

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *C. W. Nix* (Hort.) leuchtend dunkelrot, früh blühend

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *elegantissima* (Hort.) niedrigbleibend, rotblühend

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *flore pleno* (Hort.) (*C. multiplex*) (Sweet), niedrigbleibend, Blüte gefüllt, rosa

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *flore pleno* H. E. Beale (Hort.), besonders lange Blütenrispen mit dicht gefüllten rosaroten Blüten, spätblühend

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *Hammondii* (Bean), stärker wachsend, Blüte weiß, spätblühend

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

B. J. St. *stricta alba*, straff aufrecht wachsend, Blüte reinweiß

8—12	0,52	4,10	37,50	335,—
über 12	0,60	4,90	45,—	400,—

Calycanthus (L.) Gewürzstrauch (Calycanthaceae)R. *floridus* (L.) bis 2 m hoch werdender Strauch, Blätter ei-elliptisch bis 10 cm lang, spitz, oben lebhaft grün, unten graugrün, dicht behaart, Blüten dunkelrot-braun, stark erdbeer-artig duftend, mit Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
40—60	3,—		
60—80	3,75		

Caragana (Lam.) Erbsenstrauch (Leguminosae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H. aborescens (Lam.), baumartiger bis 6 m hoher Strauch, gefiederte Blätter, Blüten gelb, geeignet für hohe Hecken und als Vogelschutzgehölz	80—100	0,55	5,10	45,—

Carpinus (L.) Hainbuche, Weißbuche (Betulaceae)

H.R.Sch. betulus (L.), gemeine Hainbuche, mehrmals verpflanzt, regelmäßig geschnittene Pyramiden an Stäben gezogen, la Qual.	60—80	0,67	5,60	49,—
Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung in feuchtem Moos verpackt.	80—100	0,75	6,75	60,—
	100—125	1,—	9,35	82,50
Bei Lieferung mit Erdballen erfolgt ein Preisauflschlag von 25%.	125—150	1,40	12,75	112,50
	150—175	1,90	16,50	150,—
Auf Wunsch kann eine mittlere Qualität geliefert werden.	175—200	2,25	20,—	187,50
Die Preise derselben liegen 20% niedriger.	200—225	2,90	26,50	230,—
	225—250	3,50	30,—	280,—
3mal verschulte Ballenware aus extra weitem Stand mit besonders vollkommener Garnierung.	150—175	2,25	20,—	187,50
	175—200	2,90	26,50	230,—
	200—225	3,65	33,—	295,—
	225—250	4,85	39,—	350,—
	250—300	5,80	52,50	470,—
Alleebäume, Stammumfang in extra weitem Stand verpflanzt, mit Ballen	8—10	7,10		
	10—12	8,60		
	12—14	11,25		
pyramidalis (Dipp.), straff aufrechtwachsende Säulenform, bildet geschlossene Pyramide, mit Ballen	250—300	7,50		
	200—250	9,—		
	250—300	11,25		

Castanea (Milt.) Edelkastanie (Fragaceae)

B.R. sativa (Mill) (C. vesca) (Gärtn.), eßbare Edelkastanie, Blätter länglich lanzettlich bis 20 cm lang, Oberseite sattgrün, glänzend, Frucht dunkelbraun, wohlschmeckend.....	8—12	6,—		
Hochstämme, Stammumfang	10—12	7,50		

Ceanothus (L.) Säckelblume (Rhamnaceae)

americanus (L.), bis 1 m hoher schlank aufrechtwachsender Strauch, Blätter ei-länglich, bis 10 cm lang, spitz, fein gesägt, oben lichtgrün, unten etwas behaart, Blüten weiß in großen zusammengesetzten Rispen	40—60	1,20		
Hybriden in Sorten, mit Ballen	40—60	3,75		

Chaenomeles (Ldl) Scheinquitte (Rosaceae)

B.H.R. japonica (Ldl) (C. Maulei) (C. Schn.) (Cydonia Maulei) (T. Moore), bis 1 m hoher Strauch. Zweige dornig, Blätter breit-eiförmig stumpf, bis 5 cm lang, grob kernig gesägt, Blüten ziegelrot, 2—4 zusammenstehend, Frucht rundlich, 3—4 cm dick, gelblich-grün	40—60	0,55	5,10	45,—
B.H.R. lagenaria (Koidz) (Cydonia japonica) (Pers.)- bis 2 m hoher Strauch, Zweige dornig. Blätter eilänglich spitz, scharf gesägt. Blüten scharlachrot, 3—4 cm breit in kleinen Büscheln	40—70	0,55	5,10	45,—
B.H.R. Sanguinea , Hybriden in Sorten	40—70	1,50	13,50	

Clethra (L.) Scheineller (Clethraceae)

R.Sch. alnifolia (L.), Strauch bis 3 m hoch, Blätter verkehrt eilänglich, kurz zugespitzt, scharf gesägt, Blüten weiß, duftend, in aufrechten Traubenrispen	40—60	1,85		
	60—80	2,25		

Colutea (L.) Blasenstrauch (Leguminosae)

B. arborescens (L.), bis 4 m hoher Strauch, Fiederblätter, oben frischgrün, unten heller, Blüten gelb zu 6—8 in Trauben	100—125	0,55	5,10	45,—
--	---------	------	------	------

Cornus (L.) Hartriegel (Cornaceae)

R.Sch. alba (L.) (C. tatarica) (Mill), bis zu 3 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. Zweige braunrot, Blätter ei-elliptisch, spitz, oben lebhaft grün, unten bläulich. Blüten gelblich-weiß in Trugdolden. Frucht schmutzig weiß bis blau	80—100	0,55	5,10	45,—
leichte Büsche aus halbwildem Stand		0,40	3,40	30,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Cornus (L.) Hartriegel (Cornaceae)					
	argentei marginata (Rehd.) (C. alba elegantissima var.) (Hort.) Blätter weißrandig, sich im Herbst karminrot färbend	60—80	0,95	8,25	75,—
	flaviramea (Späth), Zweige mit hellgelber Rinde	60—80	0,75	6,75	60,—
	Gouchaultii (Rehd.), stark wachsend, Blätter gelb gerandet	60—80	0,75	6,75	60,—
Sch.	Kesselringii (Rehd.) (C. Kesselringii) (E. Wolff). Zweige tief schwarz-braun, Blätter im Austrieb dunkelbraun, später bräun- lich-grün	60—80	0,75	6,75	60,—
R.	sibirica (Lodd) (C. sibirica) (Lodd) (C. tatarica sibirica) (Koehne). Zweige leuchtend korallenrot	60—80	0,75	6,75	60,—
	Späthii (Wittm), Blätter im Austrieb bronze, später breit gold- gelb gerandet, teils ganz goldgelb	60—80	0,95	8,25	75,—
mas. (L.) Kornelkirsche					
H.B.R.	Junge Triebe grünlich behaart, Blätter ei-elliptisch, spitz, bis 10 cm lang. Blüten bereits im Februar, goldgelb in klei- nen Dolden, Frucht rot, etwa 1,5 cm lang. Eßbar. Regel- mäßig geschnittene, mehrmals verpflanzte, an Stäben ge- zogene Büsche.....	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0,57 0,80 1,05 1,10 1,50	5,— 7,— 9,50 10,— 13,—	45,— 64,— 75,— 97,— 120,—
H.R.Sch.	sanguinea (L.), Strauch bis 4 m hoch. Zweige bräunlich-grün, sonnenseitig gerötet, Blätter breit elliptisch, zugespitzt, bis 8 cm lang, unten heller, Blüten weißlich in behaarten dichten Trugdolden, Frucht schwarz	60—80	0,57 0,30	5,— 2,60	45,— 22,50
Corylus (L.) Haselnuß (Betulaceae)					
H.Sch.	avellana (L.), bekannter heimischer Waldhasel, guter Schatten- strauch	60—80 80—100 100—125	0,75 0,95 1,10	6,75 8,25 10,—	60,— 80,— 94,—
Sch.	atrorepurea (Hort.). Blutnuß. Mittelhoher Strauch, Blätter dunkelpurpur, Frucht rot, auch für Halbschatten geeignet	80—125	1,50	13,—	120,—
Cotinus (Adans) Perückenstrauch (Anacardiaceae)					
	cogggyria (Scoop) (C. voccygea) (C. Koch) (Rhus cotinus) (L.), buschiger bis 5 m hoher, sehr schöner Strauch. Blätter wech- selständig, verkehrt eiförmig bis 8 cm lang. Blüten klein in 15—20 cm langen perückenähnlichen Rispen mit rötlich oder grünlich behaarten Fruchtsielen	40—60	1,50	13,50	
Cotoneaster (Med.) Zwergmispel (Rosaceae)					
H.R.Sch	acutifolia (Tnrcz) (C. pekinensis) (Zbl), bis 3 m hoher, breit wachsender Strauch, Blätter elliptisch, ei-länglich, spitz, 2—5 cm lang, oben stumpfgrün, unten heller, Blüten rötlich in kurzen Trugdolden. Frucht schwarz, elliptisch, ca 1 cm lang	40—60 60—80	0,65 0,75	5,80 6,75	53,— 60,—
St.	adpressa (Bois), niederliegender Strauch, Zweige kriechend, Blätter breit-eiförmig, stachelspitz, ca. 1 cm lang, Rand wellig, oben stumpfgrün, Blüten zu 1—2 festsitzend, rötlich, Frucht ei-rundlich, hellrot, mit Ballen	15—20 20—30 30—40	1,10 1,50 1,90	10,— 13,50 17,—	90,— 120,— 150,—
H.	bullata (Bois), bis 2 m hoher Strauch. Blätter ei-länglich, spitz, 3—7 cm lang, oben dunkelgrün, runzelig, unten grau-grün. Blüten rötlich, zu 3—7 in Trugdolden. Frucht lebhaft rot, erbsengroß	60—100	0,57	5,—	45,—
J.St.	Dammeri (C. Schn.) (C. humifusa) (Duthie), kleinbleibend, Zweige dem Boden aufliegend und wurzelnd. Blätter ellip- tisch-länglich, 1,5—3 cm lang, dunkelgrün glänzend, unten bläulich. Blüten einzeln, weiß, ca. 1 cm groß. Frucht schar- lachrot, kugelig, mit Ballen	20—30 30—40	1,50 1,90	12,40 16,90	110,— 150,—
H.	Dielsiana (Pritz) (C. applanata) (Duthie). Bis 2 m hoher Strauch. Zweige bogig abstehend, Blätter ei-rundlich, derb, 2—3 cm lang, oben dunkelgrün, etwas behaart, unten graugelb filzig. Blüten rötlich in kurzen 3—7-blütigen, behaarten Dolden- trauben. Frucht scharlachrot, bis in den Winter hinein haftend	60—100	0,57	5,—	45,—

Cotoneaster (Med.) Zwergmispel (Rosaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H. <i>divaricata</i> (Rehd. et Wils.). Bis 2 m hoher aufrechtwachsender Strauch, Zweige breit abstehend, Blätter spitz elliptisch bis 2 cm lang, oben glänzend dunkelgrün, unten heller. Blüten rcsa, kurzstielig, Frucht rot, lang-oval, ca. 8 mm lang	60—100	0,65	5,80	53,—
H. <i>Franchetti</i> (Bois), fast immergrüner aufrechter bis zu 3 m hoher Strauch. Zweige schön überhängend. Blätter elliptisch, derb, spitz, bis 3 cm lang, oben lebhaft grün, leicht glänzend, unten gelb oder grau-weiß filzig. Blüten rötlich zu 5—10 in behaarten Trugdolden. Frucht länglich, orange-scharlach, sehr lange haftend mit Ballen	40—70	1,90	17,—	150,—
R.St. <i>horizontalis</i> (Dcne), niedriger Strauch, Zweige waagrecht gestellt. Seitenzweige zweizeilig. Blätter fast kreisrund, 5—10 mm lang, oben dunkelgrün, unten heller, im Herbst orange und scharlach. Blüten fest sitzend, rötlich. Frucht hellrot, mit Ballen	20—30 30—40 40—60 60—80	0,90 1,10 1,50 1,90	8,25 10,— 13,50 17,—	75,— 94,— 120,— 150,—
J.St.R. <i>microphylla</i> (Wall), immergrüner, dichtverzweigter, schwachwachsender Strauch, Blätter verkehrt ei-länglich, 5—8 mm lang, oben dunkelgrün glänzend, unten dicht graufilzig. Blüten meist einzeln, weiß, Frucht scharlachrot, kaum erbsengroß mit Ballen	20—30 30—40	1,50 1,90	13,50 17,—	120,— 150,—
J.St.R. <i>thymifolia</i> (Koehne) schwach wachsend, in der Belaubung noch bedeutend kleinblättriger als die Stammform mit Ballen	15—20	1,50		
H. <i>moupinensis</i> (Franch) bis 5 m hoher, sparrig wachsender Strauch. Blätter elliptisch länglich 5—10 cm lang. Oben glänzend grün, etwas runzelig, unten hellgrau-grün, filzig. Herbstfärbung dunkelbraun. Blüten rötlich in kleinen Doldenrispen. Frucht schwarz, stark erbsengroß	60—100	0,57	5,—	45,—
H. <i>multiflora</i> (Bunge), Strauch bis 3 m hoch werdend, Zweige bogig überhängend, zuerst behaart, dann kahl. Blätter breit eiförmig bis elliptisch 2—5 cm lang, lebhaft grün, unten hell graugrün. Blüten weiß, Frucht scharlachrot, erbsengroß, reich fruchtend	60—100	0,90	8,25	
R.Sch.St. <i>praecox</i> (Vilm) (C. nanshuanica) (Regel) (C. Nan-Shan) (Hort) niedrig bleibend, weit kriechender Strauch. Blätter oval, 2—2,5 cm lang, Rand wellig und behaart. Oben oft metallglänzend, nach Herbst sich rot verfärbend und abfallend. Blüten zu 1—3 sitzend, dunkelrosa, Frucht kugelig 8—12 mm dick, rot mit Ballen	20—30 30—40 40—60	0,90 1,10 1,50	8,25 10,— 13,50	75,— 94,— 120,—
R.Sch.St. <i>praecox</i> Hessel (Hort) in allen Teilen kleiner als die Stammform, von dichterem, langsamerem Wuchs mit Ballen	20—30 30—40	1,50 1,80		
J.St. <i>salicifolia floccosa</i> (Rhed et Wilms), immergrüner Strauch, Zweige überhäng., Blätter länglich lanzettlich, oben dunkelgrün glänzend, unten flockig, wollig. Blüten klein, weiß, in dichten Doldentrauben. Frucht lebhaft rot, erbsengroß mit Ballen	30—40 40—60 60—80	1,90 2,50 3,75	17,— 20,— 30,—	150,— 180,— 270,—
H. <i>Simonsii</i> (Bak). Oft halb-immergrüner bis 3 m hoher Strauch, Blätter ei-rundlich, spitz, bis 3 cm lang, oben glänzend dunkelgrün, unten blaßgrün, Blüten zu 2—4 hellrosa, Frucht erbsengroß, scharlachrot	60—80 80—100	0,57 0,75	5,— 6,75	45,— 60,—

Crataegus (L.) Dorn (Rosaceae)

R. <i>Carrieri</i> (Vauvel), Cr. crus galli x pubescens (Stend), bis 7 m hoch werdender Baum. Dornen bis 5 cm lang, Blätter elliptisch länglich, spitz, 5—10 cm lang. Oben dunkelgrün glänzend, unten behaart, Blüten weiß, Früchte elliptisch bis 18 mm dick, orangerot, lange haftend. Kleinkroniger Straßenbaum. Besonders geeignet für Industriegebiet	125—150 150—200	1,90 2,50	17,— 20,—	150,— 180,—
Alleeabäume, Stammumfang	7—8 8—10 10—12	3,30 3,80 4,65	30,— 34,— 41,—	

Crataegus (L.) Dorn (Rosaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
R. coccinea (L. Scharlachdorn (<i>C. imbricata</i>) (Lgl.) kleiner Baum oder Strauch 5—6 m hoch werdend. Blätter ei-elliptisch, kurz- und spitzlappig, doppelt gesägt, oben lebhaft grün, Blüte weiß in Dolden. Frucht kugelig braun-rot	60—80 80—125	0,75 0,95	6,75 8,25	
H. monogyna (Jacq.), gemein. Weißdorn. bekannte, heimische zu Hecken viel verwandte Pflanze	40—60 60—80 100—125	0,40 0,50 0,70	3,50 4,50 6,—	30,— 37,50 52,50
kermesina plena (hort.) (<i>C. oxyacantha</i> var. <i>Paulei</i>) (Rhed.) Blüten leuchtend karmesin, der bekannte Rotdorn	100—125 125—150	1,90 2,25	17,— 20,—	
Halbstämme	125—150 150—175	2,85 3,40	24,75 30,—	
Alleebäume, Stammumfang	7—8 8—10	3,40 3,75	30,— 34,—	
R. prunifolia (Pers.) Strauch oder kleiner Baum. Blätter breit elliptisch bis 8 cm lang, scharf gesägt, glänzend dunkelgrün, unten heller, im Herbst gelb und rot. Blüten weiß in dichten Doldenrispen. Frucht erbsengroß, scharlachrot	60—100 100—125	0,75 0,95	6,75 8,25	60,— 75,—
pyracantha (Brokh) siehe <i>Pyracantha coccinea</i> (Roem)				

Cydonia (Mill) Quitte (Rasaceae)

Japonica (Pers.) siehe *Chaenomeles*.

Cytisus (L.) Geissklee (Leguminosae)

St. Ardoninii (Fournier), niederliegend bis 20 cm hoch. Blätter verkehrt ei-länglich. Blüten goldgelb	30—40	1,85		
St. hirsutus (L) (<i>C. elongatus</i>) (Hort), bis 60 cm hoch, Zweige zottig behaart, Blättchen verkehrt ei-förmig. Blüten gelb, Fahne gelb mit braun	15—30	0,90		
laburnum (L) siehe <i>Laburnum vulgare</i> (Bercht, et Prsl).				
St. praecox (Bean) (<i>C. multiflorus</i> x <i>purgans</i>), bis 3 m hoch. Zweige überhängend, Blätter meist einfach lanzettlich bis 2 cm lang. Blüten lichtgelb, sehr reichblühend	30—40 40—60	0,95 1,10	8,25 10,—	75,— 94,—
St. praecox albus (Smith), etwas schwächer wachsend und mehr hängend, Blüte weiß, häufig verwendeter Treibstrauch mit Topfballen	30—40	0,95	8,25	75,—
St. purpureus (Scop), bis 50 cm hoch, niederliegend, aufstrebende Blättchen verkehrt ei-elliptisch, bis 2,5 cm lang, dunkelgrün, Blüten purpurrot	25—40	1,50		
incarnatus (Hort), Blüten violett-rosa	25—40	1,50		
B.St. scoparius (Lk) (<i>Spartium scoparium</i> (L.) (<i>Sarothamnus scoparius</i>) (Wimm) (<i>Genista scoparia</i>) (Lam), Besenpfriemen, aufrechter bis ausladender Strauch, dunkelgrün, Blätter dreizählig, Blüten goldgelb	20—40 40—70 40—70	0,57 0,75 2,—	5,— 6,75 16,50	45,— 60,—
St. versicolor (Dipp) (<i>C. purpureus</i> x <i>hirsutus</i>). Bis 50 cm hoch, niedrigliegend, aufstrebend, Blüten mehrfarbig, meist Fahnen weißlich, Flügel gelblich. Kiel purpur-lila mit Topfballen	30—40	1,50		

Daboecia (D. Don) Kriechheide (Ericaceae)

J.St. polifolia (D. Don) (<i>D. cantabrica</i>) (Koch) (<i>Boretta cantabrica</i>) (Khe) (<i>Menziesia polifolia</i>) (Juss), immergrüner, niedrigbleibender Strauch, Blätter oben dunkelgrün, glänzend, unten weißfilzig, Blüten krugförmig, 1 cm lang, purpur in endständigen Trauben	20—25	0,90		
--	-------	------	--	--

Daphne (L.) Seidelbast (Thymelaeaceae)

J.St. cneorum (L.) Rosmarinseidelbast, niederhängender, kleiner, immergrüner Strauch, Blätter lanzettlich 1—2 cm lang, oben dunkelgrün glänzend, unten blaugrün, Blüten karmesin-rosa, duftend	15—20 20—30	3,— 3,45		
R.St.Sch mezereum (L.) bis 1 m hoher Strauch, Blätter wechselständig lanzettlich 3—8 cm lang, oben lebhaft grün, unten grau-grün, Blüten blaßkarmesin, stark duftend, sehr früh im Frühjahr blühend, Frucht scharlachrot	40—60	4,—	33,75	
R.St.Sch alba (Ait), Blüte weiß	40—60	4,—	33,75	

Deutzia (Thbg.) Deutzia (Saxifragaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
<i>crenata</i> siehe <i>D. scabra</i>				
<i>gracilis</i> (S. et. Z.), niedrigbleibender, kaum 1 m hoch werdender Strauch, Blätter lanzettlich 3–6 cm lang, ungleich gesägt. Blüten in aufrechten Rispen oder Trauben, weiß. Beliebter Treibstrauch	30–50	0,75	6,75	60,—
<i>Lemoinei</i> (Hort.) <i>D. porviflora</i> x <i>gracilis</i> , schwach wachsender Strauch, bis 1 m hoch werdend. Blätter lanzettlich bis 6 cm lang, scharf gesägt. Blüten weiß in 3–8 cm hohen Rispen. Sehr viel für Treiberei verwendet	40–70	0,90	8,25	75,—
<i>Avalanche</i> (Hort), reinweiß	50–70	0,75	6,75	60,—
<i>Boule de neige</i> (Hort), Blüte reinweiß, etwas größer als die Stammform	40–60	0,75	6,75	60,—
<i>magnifica</i> (Rehd.) (<i>D. crenata magnifica</i>) (Lemoine), stark aufrecht wachsender Strauch. Blätter länglich lanzettlich bis 6 cm lang, feinkerbig gesägt. Blüten 2½ cm breit, reinweiß, rosettenartig gefüllt in 4–6 cm langen runden Rispen	80–100	0,57	5,—	45,—
<i>rosea</i> (Rehd.) <i>D. gracilis rosea</i> (Lem.), klein bleibender Strauch, ei-lanzettlich scharf gesägt. Blüten außen gerötet, innen weiß, glockenförmig in kurzen Rispen	40–60	0,75	6,75	60,—
<i>multiflora</i> (Rehd.) (<i>D. gracilis multifl.</i>) (Lemoine), Blüten weiß	40–60	0,75	6,75	60,—
<i>venusta</i> (Rehd.) (<i>D. gracilis venusta</i>) (Lemoine), Blüten groß weiß	40–60	0,75	6,75	60,—
<i>scabra</i> (Thunbg.) (<i>D. crenata</i>) (S. et. Z.) bis 3 m hoher Strauch, Blätter eiförmig lanzettlich, 10–14 cm lang gezähnt, Blüten reinweiß in schmalen 8–12 cm aufrechten Rispen	80–100	0,57	5,—	45,—
<i>candidissima</i> (Rehd.) (<i>D. crenata candidissima plena</i>) (Carr) (<i>D. Welsii</i>) (Hort) (Froeb), Blüten dicht gefüllt, reinweiß, rosettenartige Knospen rötlich überlaufen	80–100	0,57	5,—	45,—
<i>plena</i> (Rehd.) (<i>D. crenata plena</i>) (Hort) (<i>D. crenata purpur-plena</i>) (Späth), Blüten dicht gefüllt weiß, außen rosa	80–100	0,57	5,—	45,—
<i>Pride of Rochester</i> (Ellw. et Barry), Wuchs aufrecht, leicht überhängend. Blüten weiß, dicht gefüllt, außen scharlachrot gestreift	80–100	0,57	5,—	45,—

R. Diervillea (Adams) Weigelia (Caprifoliaceae)

<i>amabilis</i> (Hort) siehe <i>D. florida</i> (S. et Z.)				
<i>Eva Rathke</i> (Rathke), schwach wachsend, Blüte dunkelbraun-rot, sehr reichblühend	40–60 60–120	0,90 1,10	8,25 10,—	75,— 94,—
<i>florida</i> (S. et Z.) (<i>D. rosea</i>) (Walpers) (<i>Weig. rosea</i>) (Ldl.) (<i>W. amabilis</i>) (Hort). Bis 3 m hoher Strauch. Blätter fast sitzend ei-länglich 5–10 cm lang. Blüten rosa 3 cm lang, aus engem Grunde plötzlich stark erweitert	80–120	0,75	6,75	60,—
<i>Verschaffelti</i> (Hort), Blüten purpurrosa mit weißem Saum	80–120	0,75	6,75	60,—

Dimorphantus (siehe Aralia)**Eleagnus (L.) Oelweide (Eleagnaceae)**

R. angustifolia (L.) schmalblättrig Oelweide, bis 7 m hoher Strauch, oft dornig. Blätter länglich-lanzettlich, 4–8 cm lang, weißfilzig. Blüten glockig, innen gelb, 1 cm lang, duftend, Frucht länglich gelb. Wertvoll für trockene Böden	100–125	0,90	8,25	
--	---------	------	------	--

Enkianthus (Lour.) Prachtglocke (Ericaceae)

<i>campanulatus</i> (Nichols) hochwuchs. Strauch, Blätter elliptisch 3–7 cm lang, gesägt, im Herbst lebhaft rot. Blüten etwa 1 cm lang, gelblich mit rötlicher Zeichnung in hängenden Doldentrauben im zeitigen Frühjahr	80–100	4,50		
--	--------	------	--	--

St.J.B.	Erica (L.) echte Heide (Ericaceae)	Durchm. in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
	carnea (L.) (E. herbacea) (Auct.). Schneeheide, kleiner Strauch. Blätter lebhaft grün. Blüten fleischrot an den Zweigenden in einseitigen Trauben. Staubblätter dunkelrot. Blütezeit März-April	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	alba (Zbl.), Blätter gelblich grün, Blüten weiß	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	King George (Hort.) niedrig bleibend, sehr reich blühend, mit rosa Blüten	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	James Beackhouse (Hort.) frühblühend, starkwachsend, mit großen Rispenblüten, lichtrosa	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	rubra (Hort.), Blüten leuchtend scharlachrot	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	Schneekönigin (Hort.), Blüte reinweiß	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	Springwood (Hort.), weiß blühend in langen Rispen	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	Vivellii (hort.), Blätter bräunlich, Blüten leuchtend karmin	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	Winter Beauty (hort.), Wuchs niedrig u. gedrunken. Blüte dunkelpurpur, blüht etwa 14 Tage früher als die anderen Sorten	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	mediterranea (L.), Blüte lila-rosa, ähnl. der E. carnea ..	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	hybr. Silberschmelze (Hort) weißblühend	8—12 über 12	0,38 0,50	3,40 4,50	30,— 40,—
St.J.B.	tetralix (L.) Glackenheide. Zweige und Blätter grau, weichhaarig, Blüten nickend, rosa, zu 5—12 in Dolden	8—12	0,25	2,25	18,75
	mollis (Bean) weißblühend, Laub weißfilzig	8—12	0,38	3,40	30,—

Evonymus (L.) Spindelbaum (Celastraceae)

		Höhe in cm			
R.Sch.	europaea (L.), Paffenhütchen, bis 7 m hoher Strauch, Blätter ei-elliptisch 3—8 cm lang, gesägt. Blüten gelblich-grün, besonders durch seine rosa bis roten Früchtezierend	60—100 100—125	0,57 0,75	5,— 6,75	45,— 60,—
J.R. St.Sch.	nana (Bieb.), niederliegender etwa 30 cm hoch werdender Strauch. Blätter wechselständig lanzettlich, bis in das Frühjahr hartend, zuletzt braun-rot gefärbt. Blüten bräunlich, Frucht rosa	30—40	0,75	6,75	60,—
J.St.R.	Koormanni (Beißner) (Turcestanica) (Dieck), bis 60 cm hoher Strauch. Blätter breiter als die Stammform, sehr schöne Herbstfärbung	40—60	0,75	6,75	60,—
Sch.J.St.	radicans (Sieb.) (E. japonica radicans) (Regel), niederliegender oder an Gegenständen emporkletternder Strauch. Zweige leicht wurzelnd. Blätter elliptisch bis 3 cm lang, gesägt, stumpf grün mit helleren Nerven. Blüten unbedeutend	20—30 30—40	0,57 0,75	5,— 6,75	45,— 60,—
J.St.Sch.	rad. arg. varg. (hort.) (E. picta) (Jakob—Makoy), weißbunte Form der vorigen	20—30 30—40	0,75 0,90	6,75 8,25	60,— 75,—
J.St.Sch.	minima (Sim.-Louis) (E. rad. kewensis) (hort.), Zwergform mit sich eng an den Boden schmiegender Blättern, klein oval grün mit heller Aderung	10—15 15—20	0,57 0,75	5,— 6,75	45,— 60,—
J.St.Sch.	radicans vegata (Rehd.) breitbuschig wachsend, großblauig mit runden dunkelgrünen Blättern. Wahrscheinlich Altersform von E. radicans	30—40 40—60	1,85 2,45	15,— 21,—	

Exochorda (Ldl.) Prunkspire (Rosaceae)

Albertii (Regel) (E. korolkowii) (Lav.) Bis 4 m hoher Strauch. Blätter ei-länglich frischgrün. Blüten 3—4 cm breit, fast sitz. zu 5—8 Trauben	60—80 80—100	2,60 3,—
grandiflora (Lindl.) E. racemosa (Rehd.), bis 4 m hoher Strauch. Blätter elliptisch länglich, 3—8 cm lang, hellgrün. Blüten weiß. April-Mai erscheinend an etwa 1 m langem Stiel, 4 cm breit in 6—10blütigen Trauben	60—80 80—100	2,60 3,—

H	Fagus (L.) Buche (Fagaceae)	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
	<i>sylvatica</i> (L.), bekannte heimische Rotbuche, mehrmals ver- pflanzte, regelmäßig geschnittene Pyramiden an Stäben gezogen aus weitem Stand 1a Qualität	60—80	0,70	6,35	56,—
	Auf Wunsch werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.	80—100	0,80	7,50	67,50
	Auf Wunsch kann eine mittlere Qualität geliefert werden, deren Preise um 20 % niedriger liegen	100—125	1,20	10,50	100,—
		125—150	1,60	14,—	130,—
		150—175	1,85	16,50	150,—
		175—200	2,60	23,—	200,—
	3mal verschulte Ballenpflanzen aus extra weitem Stand, mit besonders vollkommener Garnierung	150—175	2,80	27,—	210,—
		175—200	3,45	28,50	260,—
		200—225	4,50	37,50	340,—
		225—250	5,40	45,—	410,—
		250—275	6,40	54,—	490,—
		275—300	8,25	67,50	600,—
	Alleebäume mit Ballen				
	Stammumfang	8—10	7,10	66,—	
	in extra weitem Stand verpflanzt	10—12	9,35	82,50	
		12—14	11,25		
		14—16	13,50		
	atropurpurea macrophylla (hort.) u. Swat Margret (Frahm) veredelte Blutbuchen mit schwärzlich-roter Belaubung. Pyramiden mit Ballen	125—150	7,50		
		150—200	12,—		
		200—250	16,50		
		250—300	22,50		
	Hochstämme mit Ballen				
	Stammumfang	8—10	18,75		
		10—12	22,50		
		12—14	25,—		
		14—16	30,—		
Tr.	atropurpurea pendula (hort.), Trauerblutbuche mit Ballen	125—150	7,50		
		150—200	12,—		
		200—250	16,50		
	Hochstämme mit Ballen				
	Stammumfang	8—10	22,50		
		10—12	30,—		
Tr.	pendula (Lodd.) grüne Trauerbuche mit Ballen	125—150	7,50		
		150—200	12,—		
		20—225	16,50		
	Hochstämme mit Ballen				
	Stammumfang	8—10	22,50		
		10—12	30,—		
	Forsythia (Vahl.) Goldglöckchen (Oleaceae)				
R.H.Sch	<i>intermedia</i> (Zbl.), wertvoller Frühlingsblüher. Blätter läng- lich-lanzettlich, am Rande gesägt. Blüten tiefgelb, meist zu 2—3 stehend	80—100	0,75	6,75	60,—
	Halbstämme	80—100	2,25	20,—	
		100—125	2,80	25,—	
R.H.	<i>spectabilis</i> (Späth) (F. spect.) (Koehe), Blüten dottergelb, kurz gestielt, sehr reich blühend	80—100	0,75	6,75	60,—
R.H.	<i>vitellina</i> (Koehe), Blüten dottergelb, sehr zahlreich	80—100	0,75	6,75	60,—
	<i>suspensa</i> (Vahl.) bis 1½ m hoch werdend, Strauch, Wuchs überhäng. dünntriebig. Blätter meistens dreizähnnig. Blüten gelb	80—120	0,75	6,75	60,—
	<i>Fortunei</i> (Rhd.) Blätter ei-länglich, meist dreilappig bis dreizähnnig. Blüten tiefgelb, kurz gestielt. Pflanze kräftig aufrechtwachsend. Zweige bogig überhängend	80—100	0,75	6,75	60,—
	<i>Sieboldi</i> (Zbl.) (F. sieboldii) Dipp.), Zweige sehr dünn, überhängend, oft auf dem Boden kriechend und wurzelnd. Blätter meist einfach, eiförmig. Blüten tiefgelb	80—100	0,75	6,75	60,—
Sch.	<i>viridissima</i> (Ldl.) Strauch aufrechtwachsend, Blätter ei- liptisch, länglich, fast ganzrandig dunkelgrün. Blüten bis zu 3 zusammenstehend, leuchtend gelb mit grünlichem Anflug	80—100	0,75	6,75	60,—
R.	Fraxinus (L.) Esche (Oleaceae)				
	<i>excelsior</i> (L.), gemeine Esche, bekannter heimischer Baum, liebt feuchte Lagen, gedeiht aber auch auf anderen Böden, Heister	125—150	0,90	8,25	75,—
		150—200	1,10	10,—	94,—
		200—250	1,40	12,75	112,50
		250—300	1,80	15,75	142,50
	Alleebäume, Stammumfang	8—10	2,80	25,—	225,—
		10—12	3,75	34,—	300,—
		12—14	4,70	41,—	375,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Genista (L.) Ginster (Leguminosae)					
	<i>praecox</i> siehe unter <i>Cytisus</i>				
	<i>scoparius</i> siehe unter <i>Cytisus</i>				
	<i>sagittalis</i> (L.), niederliegend, Zweige bis 20 cm ansteigend, 3kantig oder 2schneidig flügelkantig, Blätter eilanzettlich bis 2 cm lang. Blüten goldgelb in kurzen Trauben	20—30	1,80	15,—	
	<i>tinctoria</i> (L.) <i>G. sibirica</i> (hort.) Färbeginster bis 1 m hoch werdend, aufrechtwachsender Strauch. Blätter einfach elliptisch-länglich frischgrün, Blüten goldgelb in vielblütigen, bis 6 cm langen Trauben, für leichten Boden geeignet mit Topfballen	40—60	0,75	6,75	60,—
St.	<i>plena</i> (hort) Strauch niedrig bleibend, Blüten gefüllt goldgelb, mit Topfballen	20—30	2,—	17,—	
Hamamelis (L.) Zaubern. (Hamamelidaceae)					
	<i>japonica</i> (S. et Z.) breiter Strauch mit abstehenden Zweigen. Blätter ei-rundlich 5—10 cm lang, unten hellgrün. Blüten bereits im Jan.-März erscheinend. Petalen lebhaft gelb, Kelch purpurviolett, zurückgerollt, mit Ballen	60—80 80—100 100—125	6,— 7,50 9,—		
	<i>mollis</i> (Oliv) hoher Strauch. Junge Zweige dicht, weich behaart. Blätter ei-rundlich, 8—16 cm lang, gezähnt, oben behaart, unten graufilzig, Blüten bereits im Jan.-März erscheinend, bis 2 cm lang, tief goldgelb, am Grunde rötlich. Kelch außen braunfilzig, innen purpur mit Ballen	60—80 80—100 100—125	7,50 9,— 12,—		
	<i>virginiana</i> (L.) hoher Strauch bis Baum, breit und locker wachsend. Blätter spitz verkehrt ei-elliptisch, grob gezähnt, unten hellgrün, Blüten hellgelb, Kelch innen stumpf hellbraun	80—100	3,—		
Hedera (L.) Efeu (Araliaceae)					
J.St.	<i>helix conglomerata</i> (Nichols) Felsenefeu langsam wachsend. Blätter klein, ganz randig bis dreilappig, mit Topfballen	20—30	1,85		
J.St.	Helianthemum (Adans.) Sonnenröschen (Cistaceae) immergrüne oder halbimmergrüne zwergige Halbsträucher, blühen nur auf bei voller Sonne. Sorten: Fireflame, gelblich rosa Golden Queen, rein goldgelb Rose Queen, hellrosa Rubin, rot gefüllt sulfureum plenum, gelb gefüllt mit Topfballen		0,50	4,10	37,50
Hibiscus (L.) Eibisch (Malvaceae)					
	<i>syriacus</i> (L.), bis 3 m hoher Strauch, junge Zweige zottig behaart, zuletzt kahl, Blätter eirhombisch, 5—10 cm lang, 3lappig, grob gezähnt. Blüten achselständig, einzeln, breit glockig, bis 6 cm breit				
	Hybriden, in weißen, roten und violetten Farben mit Ballen	30—40 40—60	1,70 2,50	15,— 22,50	
Hippophae (L.) Sanddorn (Elaeagnaceae)					
	<i>rhamnoides</i> (L.) bis 6 m hoher sparrig wachsender, dorniger Strauch, wurzelläufertreibend, Triebe silbrig, Blätter linealisch-lanzettlich bis 7 cm lang, glänzend silbrig. Blüten unscheinbar gelblich, Früchte sehr zierend, ei-rundlich 2-8 mm lang, orange-gelb. Wächst auch auf sehr sandigen Böden	60—100	0,65	5,60	52,50
Holodiscus (Maxim) Scheinspiere (Rosaceae)					
B.	<i>discolor ariaefolius</i> (Aschers. et Graebn.) (<i>Spirea ariaefolia</i> (Sm.) bis 3 m hoher Strauch mit bogig überhängenden Zweigen, Blätter breit, eiförmig bis 8 cm lang, doppelt gezähnt, Blüten gelblich weiß in dichten zierlich überhängenden bis 25 cm langen Rispen	80—100	0,90	8,25	75,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hydrangea (L.) Hortensie (Saxifragaceae)					
Sch.	arborescens grdf. (Rehd.) meterhoher buschiger Strauch, Blätter ei-elliptisch bis 20 cm lang, gesägt, hellgrün. Blüten weißlich in flachen 10–15 cm breiten Doldenrispen. Für Halbschatten sehr geeignet	40–60	0,90	8,25	75,—
	opuloides acuminata (Dipp.) (H. acuminata) (Sieb u. Zucc) bis 1,50 m hoch werdender Strauch, Blätter elliptisch 5–10 cm lang, gezähnt. Doldenrispen 4–8 cm breit, ziemlich flach. Randblüten blau.....	30–60	1,10	10,—	
	otaksa (Schn.) (H. microphylla otaksa) (Wils.). Bis 2 m hoher Strauch, Blätter verkehrt eiförmig, grob gezähnt. Doldenrispen bis 20 cm breit. Blüten blau oder rosa. Randblüten sehr groß	30–60	1,10	10,—	
	japonica Belzoni imperialis (hort.) mit sehr großen, flachen Doldenrispen mit porzellanblauen Randblüten	40–60	1,10	10,—	
	xanthoneura Wilsonii , bis 2 m hoch werdender Strauch. Blätter länglich lanzettlich. Blüten in flachen Doldenrispen. Randblüten weiß, Mittelblüten gelblich-weiß	50–80	1,10	10,—	
	paniculata grdf. (Sieb) bis über 2 m hoher Strauch, Blätter ei-elliptisch, bis 12 cm lang, gesägt, Blüten weiß, im Verblühen rötlich, in 15–25 cm langen Rispen. Außerordentlich zierend	3–5 Triebe 5–8 Triebe 8–12 Triebe	0,75 0,90 1,10	6,75 8,25 10,—	60,— 75,— 94,—
	extra starke Büsche zum Treiben.....	70–90 80–100 100–120	1,10 2,70 3,35	10,— 24,— 30,—	
Hypericum (L.) Johanniskraut (Guttiferae)					
St.	Moeserianum (André) (H. patulum x calycinum) bis 40 cm hoher Strauch, Blätter eiförmig bis 5 cm lang, wintergrün. Blüten bis zu 5 in Trugdold. sitzend, goldgelb, 5–6 cm br.	30–50	1,10	10,—	
	patulum Henry (Veitsch), Blätter eilänglich, 5–7 cm lang. Blüten goldgelb, 5–6 cm breit		0,90	8,25	
Ilex (L.) Stechpalme (Aquifoliaceae)					
R.J.H. Sch.	aquifolium (L.), bekannte heimische Stechpalme oder Hülse, Blätter stachelig, Beeren korallenrot, mit Ballen	40–60 60–80 80–100 100–125	3,40 5,— 7,— 8,25	27,— 41,— 56,— 67,50	
R.J.H. Sch.	pyramidalis (hort.) mit ausgeglichenem, pyramid. Wuchs und leuchtend roten Früchten, mit Ballen	40–60 60–80 80–100 100–125 125–150	3,40 5,— 7,— 8,25 11,25	27,— 41,— 56,— 67,50 90,—	
R.J.H.	crenata (Thbg.) (I Fortunei) (hort) 2–3 m hochwachsender Strauch, Blätter kurz gestielt, elliptisch bis länglich lanzettlich, 2–3 cm lang, kerbig gesägt, dunkelgrün, Beeren schwarz, mit Ballen	40–60 60–80 80–100	3,40 4,50 6,75	26,75 36,— 54,—	
Jasminum (L.) echter Jasmin (Oleaceae)					
St.	nudiflorum (Ldl.) bis 5 m hoher Strauch mit schlanken überhängenden Zweigen, Blätter dreizählig ei-länglich, Blüten gelb, einzeln, achselständig. Bereits im Februar erscheinend, häufig als Spalierstrauch verwendet, ... mit Ballen	30–40 40–70	1,85 2,25		
Juglans (L.) Walnuß (Juglandaceae)					
	regia (L.) siehe Obstbäume				
Kalmia (L.) Lorbeerrose (Ericaceae)					
J.R.	angustifolia (L.) bis 1 m hoch werdend, Blätter kurz gestielt, länglich-lanzettlich, bis 6 cm lang werdend, oben frischgrün, Blüten purpur, 1 cm breit, in vielblütigen achselständigen Büscheln im Juni-Juli erscheinend, mit Ballen	20–30 30–40	2,25 3,—		
Kalmia (L.) Lorbeerrose (Ericaceae)					
R.J.	latifolia (L.) 1–1,5 m hoch werdender Strauch, Blätter elliptisch-lanzettlich, bis 10 cm lang werdend, oben dunkelgrün, Blüten 2–2,5 cm breit, karminrosa in großen Doldentrauben, Blütezeit Mai-Juni, mit Ballen	30–40 40–50 50–60	3,30 4,10 5,60	26,25 33,— 45,—	

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Kerria Ranunkelstrauch (Rosaceae)					
Sch.	<i>japonica</i> (D. C.), bis 2 m hoch werdender Strauch, grün-glänzend, Blätter ei-länglich bis 5 cm lang, doppelt gesägt, ob. frischgrün, Blüten orange-gelb, einzeln 3-4 cm br.	50—70	0,75	6,75	60,—
	<i>flore pleno</i> (hort.) (K. plenifolia) (Witte), mit gefüllten gelben Blüten, Mai-Juni erscheinend	40—60	0,90	8,25	75,—
Laburnum (Med.) Goldregen (Leguminosae)					
	<i>alpinum</i> (Grieseb) bis 10 m hoch werdend, Zweige grün oder gelb-grün, Blätter gelappt, elliptisch-länglich, 4—7 cm lang. Blüten bis 1,5 cm lang in 25—30 cm langen hängenden Trauben. Im Mai-Juni blühend	60—80 80—100 100—150	0,90 1,10 1,30	8,25 10,— 12,—	75,— 94,— 112,—
R.Sch.	<i>vulgare</i> (Grieseb) (L. anagryoides) (Med. (Cytisus laburnum) (L), gemeiner Goldregen, bis 7 m hoch werdend. Zweige grau-grün. Blättchen elliptisch-länglich, bis 8 cm lang. Blüten goldgelb in hängenden bis 30 cm langen Trauben. Mai-Juni blühend	100—125 125—175 125—150	0,90 1,10 2,60	8,75 10,—	75,— 94,—
	Halbstämme, Stammhöhe	7—9	3,75		
R.	<i>Vossi</i> (hort.) besonders reichblühend, Blüten kräftig goldgelb, 40—50 cm lange Trauben	100—150 125—140 150—175 175—200	2,60 3,75 4,50 5,60	24,— 34,— 40,— 51,—	
	Halbstämme, Stammhöhe				
	Hochstämme				
J.St. Lavendula (L.) Lavendel (Labiatae)					
	<i>officinalis</i> (Chaix) (L. vera) (D. C.) (L. angustifolia) (Ehrh.) echter Lavendel, immergrüner Zwergstrauch, Blätter linealisch bis 5 cm lang, graufilzig, sehr aromatisch. Blüten lavendelblau, klein, in 3—6 cm langen quirligen Ähren. Im Juli-August erscheinend	20—30	0,38	3,40	30,—
Ledum (L.) Sumpfporst (Ericaceae)					
	<i>palustre</i> (L.) Moosenkraut				
	1 m hoch werdender aufrechtwachsender Strauch, Blüte weiß in dichten Büscheln stehend, Blütezeit Mai-Juni, Blätter 1—4 cm lang	25—30 30—40	1,80 2,65		
Ligustrum (L.) Rainweide (Oleaceae)					
H.St.	<i>lodense</i> (hort.) Wuchs niedrig, dicht, Blätter schmal elliptisch, tiefgrün, sehr lange haftend, im Winter bronzebraun	20—30 30—40 40—50 50—60	0,30 0,37 0,45 0,56	2,50 3,40 4,10 5,10	22,50 30,— 37,50 45,—
J.H.Sch.	<i>ovalifolium</i> (Hassk.) (L. californic.) (hort.), wintergrüner Strauch, bis 5 m hoch werdend, straff aufrecht wachsend, Blätter elliptisch, oben glänzend dunkelgrün. Blüten in Rispen gelblich-weiß. Besonders wertvoll für Hecken, 3jähr. Büsche 5—8 Triebe	50—80 80—100 40—60 60—80 80—100 100—125 60—80 80—100 100—125 60—80 80—100 100—125	0,19 0,23 0,23 0,28 0,30 0,33 0,33 0,36 0,39 0,36 0,39 0,48	1,50 1,85 1,85 2,40 2,60 2,85 2,85 3,— 3,60 3,— 3,60 4,10	13,— 16,50 16,50 20,— 22,50 25,— 25,— 27,— 33,— 27,— 33,— 37,50
	verpfl. Büsche 5—8 Triebe				
	verpfl. Büsche 8—12 Triebe				
	verpfl. Büsche 12—20 Triebe				
	1- u. 2jähr. Pflanzen siehe unter Junggehölzen				
H.Sch.	<i>vulgare</i> (L.) bis 5 m hoch werdender, wertvoller Schatten- u. Heckenstrauch, Blätter ei-länglich bis lanzettlich. Blüten weiß in 4—6 cm langen Rispen. Frucht glänzend schwarz, 3jähr. Büsche 5—8 Triebe	50—80 80—100 40—60 60—80 80—100 100—125 60—80 80—100 100—125 60—80 80—100 100—125	0,19 0,23 0,23 0,28 0,30 0,33 0,33 0,36 0,39 0,36 0,39 0,48	1,50 1,85 1,85 2,40 2,60 2,85 2,85 3,— 3,60 3,— 3,60 4,10	13,— 16,50 16,50 20,— 22,50 25,— 25,— 27,— 33,— 27,— 33,— 37,50
	verpfl. Büsche 5—8 Triebe				
	verpfl. Büsche 8—12 Triebe				
	verpfl. Büsche 12—20 Triebe				
	1- u. 2jähr. Pflanzen siehe unter Junggehölzen				

Ligustrum (L.) Rainweide (Oleaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
H.R.Sch.	vulgare atrovirens (hort.) Wuchs sparrig, Blätter breit elliptisch, tief grün, im Winter tief purpurbraun und sehr lange haftend, fast immergrün					
	3jähr. Büsche 5—8 Triebe	30—50 50—80 80—100	0,19 0,23 0,28	1,50 1,85 2,40	13,— 16,50 20,—	120,— 150,— 180,—
	verpfl. Büsche 5—8 Triebe	40—60 60—80 80—100	0,28 0,30 0,33	2,40 2,60 2,85	20,— 22,50 24,50	180,— 200,— 225,—
	verpfl. Büsche 8—12 Triebe	40—60 60—80 80—100 100—125	0,33 0,36 0,39 0,48	2,85 3,— 3,60 4,10	24,50 27,50 33,— 37,50	225,— 248,— 300,— 337,—
	verpfl. Büsche 12—20 Triebe	40—60 60—80 80—100 100—125	0,36 0,39 0,48 0,52	3,— 3,60 4,10 4,85	27,50 33,— 37,50 41,—	248,— 300,— 337,— 375,—

l- u. 2jähr. Pflanzen siehe unter Junggehölzen

Liriodendron (L.) Tulpenbaum (Magnoliaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
R.	tulipifera (L.) Bis 60 m hoher Baum. Blätter lang gestielt, meist eckig gelappt, 7—20 cm lang, glänzend grün, im Herbst goldgelb, Blüten einzeln, tulpenartig, gelblichgrün, bis 6 cm breit. Blütezeit Mai-Juni, mit Ballen	100—125 125—150 150—200	3,— 3,75 5,25		

Lonicera (L.) Heckenkirsche (Caprifoliaceae)

	siehe auch unter Kletterpflanzen				
Sch.	amoena alba (Zabl.) bis 4 m hoch werdender Strauch mit weißen Blüten	80—100	0,57	5,—	45,—
Sch.	coerulea (L.) Bis 1,5 m hoher aufrecht wachsender Strauch. Zweige im Winter braunrot mit abblätternder Rinde. Winterknospen waagrecht, oft z 4 nebeneinander. Blätter ei-länglich bis länglich, frischgrün. Blüten gelblich-weiß, röhren-trichterförmig, 1,5 cm lang an kurz-, nickenden Stielen. Blütezeit April-Mai. Früchte rundlich, dunkelblau bereift	70—100	0,57	5,—	45,—
Sch.	Ledebouri (Esch) aufrecht wachsender bis 2 m hoher Strauch. Blätter länglich bis lanzettlich, 6—12 cm lang, oben dunkelgrün und etwas glänzend, Blüten tiefgelb, braunrot überlaufen, bis 2 cm lang, an aufrechten 2—4 cm langen Stielen. Früchte erbsengroß, schwarz-rot	80—120	0,75	6,75	60,—
Sch.	Morrowii (A. Gray), bis 2 m hoher breit wachsender Strauch. Blätter elliptisch bis verkehrt ei-länglich, 3—5 cm lang, Blüten weiß, später gelblich, bis 1,5 cm lang. Früchte blutrot	80—125	0,57	5,—	45,—
H.J.St.	pileata (Oliv.) immergrüner, stark verzweigter und breit wachsender Strauch bis 30 cm hoch werdend. Blätter eiförmig bis länglich-lanzettlich, bis 1 cm lang werdend, oben glänzend dunkelgrün, Blüten blaßgelb, röhrig-trichterförmig, duftend. Früchte rundl., purpurviolett, mit Ball	20—30 30—40 40—60	0,80 1,05 1,30	6,75 8,25 9,75	60,— 75,— 90,—
B.H.Sch.	tatarica (L.) aufrecht wachsender bis 3 m hoher Strauch. Blätter eiförmig bis lanzettlich, oben dunkelgrün, Blüten hellrosa bis weiß im Mai-Juni. Frucht rundlich rot	80—125	0,57	5,—	45,—
	xylosteum (L.) bis 3 m hoher Strauch, breit aufrechtwachsend. Blätter breit eiförmig, oben dunkelgrau-grün. Blüten gelblich-weiß, rötlich überlaufen. Früchte erbsengroß, dunkelrot	80—125	0,57	5,—	45,—
	leichte Büsche aus halbweisem Stand				
H.J.St.	yunnanensis (Franch) kleiner immergrüner Strauch. Wuchs ähnlich L. nitida, in der Blattfarbe und Winterhärte jedoch der L. pileata sehr ähnelnd, mit Ballen	20—30 30—40 40—60	0,80 1,05 1,30	6,75 8,25 9,75	60,— 75,— 90,—

Lycium (L.) Bocksborn (Solanaceae)

R.H.	halimifolium (Mill) (L. vulgare) (Dun) bis 3 m hoher Strauch. Zweige schlank, zuerst aufrecht, später bogenförmig überhängend, hellgrau, meist dornig. Blätter länglich-lanzettlich, grau-grün. Blüten bis zu 4 zusammenstehend, purpur-lila. Frucht ei-länglich bis zu 2 cm lang, korallenrot	100—150	0,57	5,—	45,—
------	---	---------	------	-----	------

Magnolia (L.) Magnolie (Magnoliaceae)

Soulangeana (Soul.) (M. denudata x liliflora) bis 6 m hoch werdender Baum oder Strauch. Blätter verkehrt eiförmig. Blüten glockig, bis 10 cm lang, purpur bis weißlich, im Mai blühend

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
60—80	6,—		
80—100	7,50		
100—125	9,—		
125—150	12,—		

amabilis (hort.) sehr großblumig, weiß

100—125 9,—

Lennei (Rehd.) (M. Mennei) (Topf) Blätter breit, eiförmig, Blüten außen purpurrosa, innen weiß

80—10 9,—
100—125 11,25

stellata (Maxim) (M. Halleana) (hort.) niedriger, bis 2 m hoch werdender reich verzweigter Strauch, Blätter schmal elliptisch, bis 10 cm lang, oben tiefgrün, Blüten schon an ganz jungen Pflanzen, schalenförmig, weiß, wohlriechend. Blütezeit März-April. Außerordentlich reichblühend

40—60 6,—
60—80 7,50
80—100 9,—

Mahonia (Nutt) Mahonie (Berberidaceae)

H. Sch.
R St.

aquifolium (Nutt.) (Berberis aquifolia) (Pursh) Bekannte, gemeine Mahonie, mit gelben Blüten und blau-schwarzen Früchten

20—30	0,40	3,75	33,75
30—40	0,48	4,50	41,—
40—50	0,60	5,25	49,—
leichte Büsche aus halbbeitem Stand	20—30 0,30	2,60	22,50
	30—40 0,35	3,—	27,—
Büsche mit Ballen	30—40 0,75	6,75	60,—
	40—50 0,80	7,50	67,50
	50—60 1,05	8,25	75,—

1mal verschulte Pflanzen siehe unter Junggehölzen

Malus (Mill) Apfel (Rosaceae)

baccata (Borkh.) *Pirus baccata* (L.) Baumartiger Strauch, Blätter eiförmig zugespitzt, fein gesägt, glänzend hellgrün, Blüten weiß, 3—3,5 cm breit in kleinen Doldentrauben. Wegen ihrer schön gefärbten Früchte sollten die Gartenformen von *Malus baccata* viel mehr angepflanzt werden

100—125 2,— 18,75

Fairy (hort.) Frucht scharlachrot

100—125 2,— 18,75

Halbstämme, Stammhöhe

125—150 3,40 30,—

fructu luteo (hort.) mit leuchtend roten Früchten

100—125 2,— 18,75

Halbstämme, Stammhöhe

125—150 3,40 30,—

Hyslop (hort.) Frucht gelblich mit karmesinrot überzogen und gestreift

100—125 2,— 18,75

John Downing (hort.) Frucht gelb und rot

100—125 2,— 18,75

communis (D. C.) (*Pirus malus*) (L) heimischer Wildapfel

100—150 0,57 5,— 45,—

floribunda (Sieb) (*Pirus fl.*) (Kirchn.) Strauch oder Baum mit dichter Krone, zierlich überhängenden Zweigen, Blätter eiförmig zugespitzt, scharf gesägt. Blüten tief karmin in der Knospe, im Aufblühen rosa, bald verbläsend. Frucht kugelig, erbsengroß, gelb, ungemein reichblühend

100—125 2,— 18,75

Halbstämme Stammhöhe ca.

125—150 3,40 30,—

Hochstämme, Stammhöhe ca.

175—200 4,50

Arnoldiana (Sarg) (*Malus floribunda* x *baccata*). Die Blüten größer, etwas heller, im übrigen der Stammsorte ähnelnd

100—125 2,— 18,75

atrisanguinea (F. r.) Blüte bleibt auch im Verblühen lebhafte rot

100—125 2,— 18,75

purpurea (Rehd.) Wuchs kräftig, Zweige sehr lang, schwarzrot. Blätter 8 cm lang, zuerst braun-rot, später dunkelgrün, glänzend, Blüten karmin. Frucht kirschgroß, dunkelrot, lang gestielt

100—125 2,— 18,75

purpurea Eleyi (Rehd.) Holz und Belaubung dunkelrot, Blüten weinrot, bis 3 cm breit, Frucht bis 2,5 cm groß, dunkelpurpur, an dünnen Stielen

100—125 2,— 18,75

Niedzwetzkiiana (C. Schn.) Rinde Holz, Zweige, Blätter, Blüten dunkelrot, Frucht rundlich, 5—6 cm dick, dunkelrot

100—125 2,— 18,75

Scheideckeri (Zabl.) (*Malus floribunda* x *prunifolia*) Wuchs straff aufrecht, Blätter eiförmig, scharf gesägt. Blüten hellrosa, Knospen dunkelrosa, halb gefüllt, Frucht kirschgroß, lang gestielt, vorzüglicher Treibstrauch

100—125 2,— 18,75

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Malus (Mill.) Apfel (Rosaceae)					
	<i>spectabilis</i> (Borkh.) bis 8 m hoch werdender Baum oder Strauch, aufrechter Wuchs, Blätter elliptisch, 5–8 cm lang, gesägt, oberseits dunkelgrün glänzend. Knospen karminrosa, Blüten hellrosa, halbgefüllt, Frucht kugelig, 2 cm dick, gelblich	100–125	2,—	18,75	
	<i>Magdeburgensis</i> (Schoch) (Malus Kaido) (Dipp) Blätter breiter als die Stammform, Blüten rosa, in der Knospe leuchtendrot, halb gefüllt	100–125	2,—	18,75	
Morus (L.) Maulbeere (Moraceae)					
H.R.	<i>alba</i> (L.) weiße Maulbeere, bis 15 m hoch werdend, Blätter breit, eiförmig zugespitzt, 6–12 cm lang, grob gezähnt, oben hellgrün, braucht warme, sonnige Lage. Das Laub dient als Futter der Seidenraupen	60–100	0,57	5,—	45,—
Nepeta (L.) (Lamiaceae)					
H.	<i>Mussini</i> (Spreng.) Laub blaugrau, violett-rote Blüten, außerordentlich reichblühend, gute Einfassungspflanze	20–30	0,37	3,40	30,—
Pachysandra (Mchx) (Buxaceae)					
J.St. Sch.	<i>terminalis</i> (Sieb. et. Zucc.) vorzügliche Schattenpflanze mit lederartiger grüner Belaubung, bis 30 cm hoch werdend	15–25	0,37	3,40	30,—
Philadelphus (L.) Pfeifenstrauch (Saxifragaceae)					
a) hochwachsende Sorten:					
H.Sch.	<i>coronarius</i> (L.) bis 3 m hoch werdender Strauch, Rinde dunkelbraun, abblätternd, Blätter ei-länglich, zugespitzt, Blüten bis 3 cm breit, rahmweiß, stark duftend, in 6–8 blütigen Trauben. Blütezeit Ende Mai-Juni	100–150	0,65	5,60	52,50
	<i>gordonianus</i> (Lindl.) Zweige leicht behaart, Rinde graugelb, nicht abblätternd, Blätter eiförmig, zugespitzt, grob gezähnt, Blüten weiß, 3–4,5 cm breit, etwas duftend in 7–9blütigen dichten Trauben	100–150	0,65	5,60	52,50
	<i>Inodorus grandiflorus</i> (Gray) (P. grandiflorus) (Wild.) Bis 3 m hoch werdender Strauch, Blätter elliptisch zugespitzt, oben stumpfgrün, Blüten 4–4,5 cm breit, duftlos	100–150	0,65	5,60	52,50
	<i>Lewisei</i> (Pursh) (P. columbianus) (Koehne) in allen Teilen kleiner als die Art	100–150	0,65	5,60	52,50
H.Sch	<i>pubescens</i> (Loisl.) (P. latifolius) (Schrad.) (P. grandiflorus floribundus) (Gray) 3–4 m hoch werdender Strauch, Zweige hellgrau berindet, Blätter ei-elliptisch, oben lebhafte grün, Blüten 3–4 cm breit, duftlos, in 5–9blütigen Trauben	100–150	0,65	5,60	52,50
b) mittelhoch wachsende Sorten:					
H.	<i>Lemoinei erectus</i> (Lem.) Zweige straff aufrecht, im Alter überhängend, Blätter ziemlich klein, dunkelgrün. Blüten reinweiß bis 3 cm breit	50–70	0,65	5,60	52,50
	<i>Girandole</i> (hort.) nicht ganz so hoch werdend wie <i>virginalis</i> . Blüten dichtgefüllt, 5 cm breit, milchweiß, in dichten 7–10 blütigen Trauben, sehr blühwillig schon als junge Pflanze	40–60	0,75	6,75	60,—
H.	<i>virginal</i> (hort.) (P. virginalis) (Rehd.) kräftig aufrecht-wachsend. Zweige lang überhängend. Rinde braun bis grau-braun, wenig abblätternd. Blätter spitz-oval, oben dunkelgrün. Blüten schalenförmig, gefüllt, reinweiß, duftend, 5–6 cm breit, in 5–7blütigen Trauben	80–100	0,75	6,75	60,—
c) niedrig bleibende Sorten:					
H.	<i>coronarius aureus</i> (Rehd) Blätter besonders im Austrieb gelb, später grünlich-gelb	40–60	0,75	6,75	60,—
	<i>Lemoinei Avalanche</i> (hort.) Zweige schlank, bogig überhängend, Blätter hellgrün, klein bis mittelgroß, Blüten milchweiß, sehr reichblühend	40–60	0,75	6,75	60,—
	<i>Bouquet blanc</i> (hort.) aufrecht wachsend, bis 1,5 m hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen, Blüten milchweiß, sehr reichblühend	50–80	0,75	6,75	60,—
H.	<i>Dame blanche</i> (Lem) Wuchs gedrungen, aufrecht, Blätter mittelgroß, hellgrün, Blüten milchweiß, leicht gefüllt	50–70	0,75	6,75	60,—
H.	<i>Manteau d'hermine</i> (Lem.) (Ochroleucus) Wuchs dicht, rundlich, Zweige schlank überhängend, Blätter klein, lebhafte grün. Blüten reinweiß, halb bis ganz gefüllt	40–60	0,75	6,75	60,—

Physocarpus (Maxim) Blasenspiere (Rosaceae)

Sch.		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
	opulifolia (Maxim) (Spirea opulifolia) (L.) bis 3 m hoher Strauch, Blätter ei-rundlich, meist fünfklappig, Blüten weiß bis rötlich in vielblütigen etwa 5 cm breiten Doldentraub.	80—125	0,57	5,—	45,—
	lutea (Zabl) (Spirea opulifolia lutea) (Kirchn.) , Blätter anfangs lebhaft gelb, schließlich gelb-grün	80—125	0,57	5,—	45,—

Pirus (L.) Birne (Rosaceae)

communis (L.) heimische Wildbirne	80—100	0,57	5,—	45,—
--	--------	------	-----	------

Platanus (L.) Platane (Platanaceae)

acerifolia (Willd.) (Pl. occidentalis x orientalis) , Zweige weitausladend, Borke in großen Platten ablösend, Blätter im Grunde abgestutzt bis herzförmig, 12—25 cm breit, 3—5lappig, Lappen 3eckig Alleebäume , Stammumfang	8—10 10—12 12—14 14—16	4,70 5,60 7,10 9,40	41,— 49,50 61,50 82,50	375,— 450,— 562,50 750,—
--	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Populus (L.) Pappel (Salicaceae)

alba nivea (Wesm.) Silberpappel. Mit gelappten, unt. dicht schneeweiß filzigen Blättern, bis 35 m hoch werdend

2x verpflanzte Heister aus weitem Stand	125—150	0,90	8,75	75,—
	150—200	1,10	10,—	94,—
	200—250	1,40	12,75	112,50
	250—300	1,80	15,75	140,—
Alleebäume , Stammumfang	8—10 10—12 12—14	2,80 3,75 4,70	24,75 33,75 41,—	225,— 300,—

pyramidalis (Bge) (P. alba Bolleana) (Lauche) Pyramiden-Silberpappel, Wuchs schmal pyramidal

125—150	1,85	17,—	
150—200	2,25	20,—	
200—250	3,—	27,—	
250—300	3,75	34,—	

angulata cordata robusta (hort.) (P. robusta) (C. Schneid.), sehr rasch wachsender Baum mit aufstrebenden stark kantigen Zweigen, Blätter spitz, dreieckig gekerbt
2x verpflanzte Heister aus weitem Stand

150—200	0,90	8,75	75,—
200—250	1,10	10,—	94,—
250—300	1,40	12,75	112,50

Alleebäume, Stammumfang

8—10	2,25	20,—	180,—
10—12	2,80	24,75	225,—
12—14	3,75	33,75	300,—
14—16	4,30	37,50	337,50

balsamifera (L.) (P. monilifera) (Ait) (P. deltoidea) (Bartr.)

Balsampappel. Bis 30 m hoher breitkroniger Baum. Blätter eiförmig dreieckig, 7—12 cm lang, oben lebhaft grün
2x verpflanzte Heister aus weitem Stand

150—200	0,90	8,75	75,—
200—250	1,10	10,—	94,—
250—300	1,40	12,75	112,50

Alleebäume, Stammumfang

8—10	2,25	20,—	180,—
10—12	2,80	24,75	225,—
12—14	3,75	33,75	300,—

berlinensis (Dipp.) (P. laurifolia x nigra italica), Berliner Lorbeerpappel. Bis 25 m hoch werdend, säulenförmig, Äste aufstrebend, etwas kantig, gelb-grau. Winterknospen grünlich, klebrig. Blätter spitz eiförmig, 8—12 cm lang, kerbig gesägt, oben dunkelgrün

Einzelpflanzen aus weitem Stand

125—150	0,90	8,75	75,—
150—200	1,10	10,—	94,—
200—250	1,40	12,75	112,50
250—300	1,80	15,75	140,—

Alleebäume, Stammumfang

150—200	1,50	13,50	120,—
200—250	1,85	17,90	150,—
250—300	2,60	22,50	210,—
300—350	3,75	33,75	300,—

canadensis (Mnch.) (P. balsamifera x nigra) schnellwüchsiger bis 45 m hoch werdender Baum mit aufstrebender Krone. Winterknospen klebrig. Blätter dreieckig 7—10 cm lang, kerbig gesägt, oben bläulich-grün

2x verpflanzte Heister aus weitem Stand

150—200	0,90	8,75	75,—
200—250	1,10	10,—	94,—
250—300	1,40	12,75	112,50

Alleebäume, Stammumfang

7—8	1,85	17,90	150,—
8—10	2,25	20,50	187,50
10—12	2,80	24,75	225,—
12—14	3,75	33,75	300,—
14—16	4,30	37,50	337,50

Populus (L.) Pappel (Salicaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
nigra (L.) bek. Schwarzpappel. Bis 30 m hoch werdend, Krone locker, breit ausladend, Winterknospen klebrig, Blätter ei-rhombisch, lang, zugespitzt, fein kerbig gesägt	125—150 150—200 200—250	0,90 1,10 1,40	8,75 10,— 12,75	75,— 94,— 112,50
nigra pyramidalis (Spach) (P. italica) (Dur) (P. nigra fastigiata) (Dest) (P. dilatata) (Ait), italien. Pyramidenpappel . Bekannter Zier- u. Straßenbaum, auch als hohe Einfriedigung und als Baumwand geeignet, Wuchs säulenförmig oder schmel pyramidal	125—150 150—200 200—250 250—300 300—350 350—400	0,90 1,10 1,40 1,85 2,60 3,75 4,90	8,75 10,— 12,75 17,90 24,75 33,75 45,—	75,— 94,— 112,50 150,— 210,— 300,— 420,—
2x verpflanzte Heister aus weitem Stand	125—150 150—200 200—250 250—300 300—350 350—400	0,90 1,10 1,40 1,85 2,60 3,75 4,90	8,75 10,— 12,75 17,90 24,75 33,75 45,—	75,— 94,— 112,50 150,— 210,— 300,— 420,—
Einzelpflanzen aus besonders weitem Stand	125—150 150—200 200—250 250—300 300—350 350—400	0,90 1,10 1,40 1,85 2,60 3,75 4,90	8,75 10,— 12,75 17,90 24,75 33,75 45,—	75,— 94,— 112,50 150,— 210,— 300,— 420,—
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	2,80 3,75 4,70	24,75 33,75 41,—	225,— 300,— 375,—
Simonii (Carr.) 12—15 m hoher schmalkroniger Baum. Sehr früh austreibend, Winterknospen spitz, klebrig, Blätter elliptisch, 6—12 cm lang, kerbig gesägt, oben frisch grün	125—150 150—200 200—250 250—300	0,90 1,10 1,40 1,80	8,75 10,— 12,75 15,75	75,— 94,— 112,50 142,50
Alleebäume, Stammumfang	8—10 10—12 12—14	2,80 3,75 4,70	24,75 33,75 41,—	225,— 300,— 375,—
tremula (L.) Zitterpappel, Baum bis 30 m hoch, Krone rundlich, Borke glatt, graugelb, später rissig u. schwarz-grau, Winterknospe klebrig, Blätter eirund, buchtig, kerbig gezähnt, 3—8 cm lang, Kätzchen 8—10 cm lang	125—150 150—200 200—250 250—300	1,10 1,40 1,80 2,25	10,— 12,75 15,75 20,50	94,— 112,50 142,50 187,50
trichocarpa (Torr. et. Gray). Westliche Balsampappel. Krone breit aufstrebend, junge Zweige leicht kontig, olivbraun. Blätter breit eiförmig 8—10 cm lang, fein kerbig gesägt, oben dunkelgrün	150—200 200—250 250—300	0,90 1,10 1,40	8,75 10,— 12,75	75,— 94,— 112,50

Potentilla (L.) Fingerkraut (Rosaceae)

St.	fruticosa (L.) bis 1 m hoch werdender aufrechtwachsender, feinblättriger Strauch, Blättchen elliptisch, 1—3 cm lang, Blüten leuchtendgelb, einzeln oder zu wenigen stehend, Blütezeit Mai-August	40—60	0,45	4,10	37,50
St.	Farreri (hort.) Bis 3 cm große goldgelbe Blüten	30—40	0,45	4,10	37,50
St.	Friedrichsenii (Rehd.) (P. Friedrichsenii) (Spaeth) (P. dahurica x fruticosa) Blätter ziemlich groß, hellgrün, Blüten hellgelb	40—60	0,45	4,10	37,50
St.	mandschurica (Maxim.), niederliegend, Blättchen klein, dicht seidig behaart. Blüten weiß		3,—		
St.	parvifolia (Wolf) schwachwachsend, Blätter schmal elliptisch, Blüten hellgelb	30—40	0,45	4,10	37,50
St.	Purdonii (Rehd.) aufrechtwachsend, Blättchen oben hellgrün, Blüten hellgelb, Rückseite weiß	30—40	0,45	4,10	37,50

Prunus (L.) Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Mandeln (Rosaceae)

	avium (L.) heimische Vogel- oder Wildkirsche	125—150 150—200 200—250	0,75 1,10 2,—	6,75 10,— 18,75	60,— 94,— 150,—
H.	cerasifera (Ehrh) (P. myrobalana) (Loisl) Kirschpflaume. Bis 8 m hoher Baum, Blätter elliptisch, fein stumpf gesägt, spitz hellgrün, Blüten weiß, meist einzeln, Frucht fast kugelig, rot, 2—3 cm lang	80—125	0,45	4,10	37,50
H.	Pissartii (Bayley) (P. Pissartii) (Carr). Blätter dunkelrot, Blüten rosa, Frucht dunkelrot	100—150 125—150 175—200	2,— 3,40 4,50	18,75 30,— 40,50	
	Halbstämme, Stammhöhe				
	Hochstämme				
H.	Pissartii blireana (Lem.) (Pr. blireana) (André) (P. cerasifera x mume). Blätter breiter eiförmig, als bei Pissartii. Blüten halb gefüllt, hübsch rosa	100—150	2,—	18,75	

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Prunus (L.) Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Mandeln (Rosaceae)					
H.	Pissartii nigra (Hort. Gall) (Pr. ceras. nigra) (Bayley). Laub tief dunkelpurpur, Verbesserung der Pissartii Halbstämme, Stammhöhe Hochstämme	100—150 125—150 175—200	2,— 3,40 4,50	18,75 30,— 40,50	
	glandulosa albi plena (Koehne) (P. jap. albo plena) (hort.) (P. sinensis albo plena) (hort.). Bis 1,5 m hoch werdender Strauch. Blätter eiförmig bis lanzettlich spitz, feinkerbig gesägt, Blüten zu 1—2 stehend, weiß gefüllt, Blütezeit Mai. für Treiberei sehr geeignet	40—60	1,50	13,50	
J.R.Sch.	laurocerasus caucasica (Jaeg.) Kirschlorbeer, Strauch oder Baum, bis 6 m hoch werdend, Blätter länglich bis ver- kehrt eiförmig, bis 15 cm lang, zugespitzt, oberseits glän- zend, dunkelgrün, trägt Schatten	30—40 40—60 60—80 80—100	2,45 3,— 4,80 8,25	20,— 24,— 40,— 67,50	180,— 215,— 360,— 600,—
	Reinwanii (Hort.) Wuchs kräftig straff aufrecht, grob- blättrig	30—40 40—60 60—80 80—100 100—150	1,85 2,30 3,90 6,60 8,25	15,75 18,75 31,50 52,50 67,50	142,50 172,50 285,— 480,— 600,—
J.St.Sch.	schipkaensis (Spaeth) Wuchs strauchig bis 2 m hoch wei- dend, Blätter bis 10 cm lang, länglich-elliptisch, ober- seits glänzend dunkelgrün, derb, besonders winterhart, trägt Schatten	30—40 40—60 60—80 80—100	2,45 3,— 4,80 8,25	20,— 24,— 40,— 67,50	180,— 215,— 360,— 600,—
	zabeliana (Späth.) Wuchs flach ausgebreitet, Blätter länglich lanzettlich	30—40 40—60 60—80 80—100	2,45 3,— 4,80 8,25	20,— 24,— 40,— 67,50	180,— 215,— 360,— 600,—
H.B.	mahaleb (L.) Steinweichsel, bis 10 m hoher Baum mit spar- rigen überhängenden Zweigen, Blätter breit eiförmig, stumpf zugespitzt, oberseits glänzend grün, Blüten weiß, wohlriechend, zu 6—10 in Doldentrauben, Frucht rund- lich, schwarz. Das Holz ist wohlriechend	60—80	0,45	4,10	37,50
	myrabolana , siehe Pr. cerasifera				
Sch.	padus (L.) (Pr. racemosa) (Lam) Faulbaum, Traubenkirsche. Bis 15 m hoher Baum, Krone dicht, etwas überhängend. Blätter elliptisch, plötzlich zugespitzt, scharf gesägt, ober- seits dunkelgrün, Blüten weiß, wohlriechend, zu 15 bis 20 in lockeren, hängenden Trauben. Blütezeit April-Mai. Frucht kugelig, erbsengroß, schwarz	60—80 80—100 100—150	0,65 0,75 0,90	5,60 6,75 8,75	52,50 60,— 75,—
	persica albi plena (Hort) (Amygdalus persica alba plena) (L.) Bis 4 m hoch werdender Zierpfirsich, Blätter lanzet- lich gesägt, Blüten meist einzeln fast sitzend, weiß ge- füllt. Blütezeit April-Mai	60—100	2,25	20,—	
	persica rosea plena Klara Mayer (Hort) (Amygdalus persica Klara Mayer) (Hort) Blüten rosarot, regelmäßig gefüllt rubra plena (hort.) (Amygdalus persica rubra plena) (hort.) Blüten leuchtend rot, gefüllt, von sehr großer Schönheit	60—100 60—100	2,25 2,25	20,— 20,—	
	Pissartii , Blutpflaume. Siehe Prunus cerasifera Pissartii.				
B.Sch.	serotina (Ehrh.), spät blühende Traubenkirsche, Baum bis 20 m hoch, Krone locker, schmal. Blätter länglich zu- gespitzt, feinkerbig gesägt, derb, oberseits glänzend dun- kelgrün, Blüten weiß in 10—14 cm langer walzenförmiger Traube. Blütezeit Mai-Juni, Frucht kugelig, schwarz	80—120 120—150	0,55 0,75	5,— 6,75	45,— 60,—
	serrulata Hisakura (Koehne) japanische Blütenkirsche. Mittel- hoher Baum, Blätter eiförmig zugespitzt, scharf gesägt, oberseits dunkelgrün. Blüten zu 3—5 zusammen, rosa rosettenförmig gefüllt, Blütenstiele sehr lang. Wohl die bekannteste japanische Kirsche. Sehr wertvoll	80—125 125—150 175—200	2,45 3,40 4,50	22,50 30,— 40,—	
	Halbstämme, Stammhöhe Hochstämme				
Tr.	shidare sakura (Koehne) (Pr. serr. rosea) (Wills) Aeste stark hängend, dünn, Blüten zartrosa, sehr dicht gefüllt in Büscheln zu 4—6. Blütezeit Mai. Die beste aller Hänge- kirschen	80—125 125—150 175—200	3,— 3,40 4,50	27,— 30,— 40,—	
	Halbstämme, Stammhöhe Hochstämme				

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Prunus (L.) Pflaume, Kirsche, Pfirsich, Mandeln				
(Rosaceae)				
<i>sinensis alba pleno</i> siehe <i>Pr. glandulosa alba plena</i>				
B.H. <i>spinosa</i> (L.) bekannte heimische Schlehe. Verzweigter dorniger Strauch. Blätter klein, eiförmig, fein gesägt. Blüten bereits im April erscheinend, weiß. Gutes Vogelschutzgehölz	60—80	0,45	4,10	37,50
<i>triloba plena</i> (Dipp.) Mandelbäumchen, Strauch oder kleiner Baum, Blätter breit elliptisch, doppelt gesägt, sattgrün. Blüten lebhaft rosa, dicht gefüllt, in den Gärten sehr häufig anzutreffen	Büsche 3—5 Triebe	1,10	10,—	94,—
	Büsche 5—8 Triebe	1,50	13,50	120,—
Treibsträucher extra stark	Büsche 8—12 Triebe	1,85	16,90	150,—
Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	60—80	2,85		
	80—100	3,40		
	100—120	3,75		
		4,50		
	140—160	5,65		
Pyracantha (Roem) Feuerdorn (Rosaceae)				
H.J.St. <i>coccinea</i> (Roem) (<i>Crataegus pyracantha</i> (barkh.) (Cotoneaster pyrac.) (Spach). Bis 3 m hoher dicht und sparrig wachsender Strauch. Blätter fast immergrün, elliptisch bis lanzettlich, 2—4 cm lang, oben dunkelgrün glänzend. Blüten in 3—4 cm breiten Doldentrauben. Blütezeit Mai-Juni, Frucht 5—6 mm dick, scharlachrot, sehr reich fruchtend, mit Topfballen	20—30	1,40	11,25	100,—
	30—40	1,70	13,50	120,—
	40—50	2,45	20,—	180,—
Quercus (L.) Eiche (Fagaceae)				
<i>pedunculata</i> (Ehrr.) (<i>Qu. robur</i>) (L.). Stieleiche, bekannte heimische Eiche, 2x verpflanzte Heister aus weitem Stand	100—125	1,10	10,—	94,—
	125—150	1,40	12,75	112,50
mit Ballen 25% Aufschlag	150—200	1,80	15,75	142,50
mindestens 0,25 DM je Stück	200—250	2,25	20,—	187,50
	250—300	2,80	24,75	225,—
	8—10	7,10	61,50	562,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	8,25	75,—	675,—
in extra weitem Stand verpflanzt	12—14	11,25	100,—	
mit Ballen 25% Aufschlag	14—16	13,50	124,—	
<i>fastigiata</i> (Schneid). Pyramiden-eiche. Wuchs straff, aufrecht säulenförmig mit im Winter haft. Laub, mit Ballen	125—150	5,40		
	150—175	6,75		
	175—200	9,—		
	200—250	13,50		
	250—300	18,—		
	300—350	24,75		
	350—400	36,—		
<i>rubra</i> (L.) (<i>Qu. borealis maxima</i>) (Sarg). Roteiche. Bis 25 m hoher Baum. Krone breit und abgerundet. Blätter länglich, tief ausgeschweift, spitz gelappt, oben stumpf dunkelgrün, im Herbst sich orange bis scharlach oder braunrot färbend. Wertvoller Park- und Straßenbaum				
2x verpflanzte Heister aus weitem Stand	100—125	0,90	8,75	75,—
	125—150	1,10	10,—	94,—
	150—200	1,40	12,75	112,50
	200—250	1,80	15,75	142,50
	250—300	2,25	20,—	187,50
	8—10	3,75	33,75	300,—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	4,70	41,—	375,—
	12—14	5,60	49,50	450,—
in extra weitem Stand verpflanzt	8—10	5,60		
	10—12	6,40		
	12—14	7,50		
mit Ballen 25 % Preisaufschlag	14—16	9,75		
Rhamnus (L.) Wegdorn, Faulbaum (Rhamnaceae)				
R.B.Sch. <i>cathartica</i> (L.) Kreuzdorn. Baumartiger Strauch mit sparrigem Wuchs bis 6 m hoch werdend. Blätter ei-elliptisch, kerbig gesägt, oben stumpf grün. Blüten gelblich-grün zu 2—5 gebüschelt. Blütezeit Mai-Juni, Frucht erbsengroß, schwarz	80—125	0,57	5,—	45,—
R.B.Sch. <i>frangula</i> (L.) Strauch oder kleiner Baum. Blätter ei-länglich, kurz zugespitzt, ganzrandig, oben mattglänzend dunkelgrün. Blüten klein, weiß zu 10—20 stehend. Beeren erbsengroß, zuerst rot, später tiefrot bis violett-schwarz	80—125	0,57	5,—	45,—

Rhododendron (L.) Alpenrose (Ericaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Hybriden in nachstehend veredelten Sorten in gut beknospeter Ware:	30—40	3,40	30,—	270,—
<i>Caractacus</i> , purpurrot	40—50	4,10	37,50	330,—
<i>Catalpiense grandiflorum</i> , lila	50—60	5,10	45,—	400,—
<i>Cunninghami white</i> , weiß	60—70	6,—	54,—	480,—
<i>fastuosum flore pleno</i> , blau-violett gefüllt	70—80	7,50	67,50	600,—
<i>John Walter</i> , karminrot	80—90	11,25	100,—	900,—
<i>Käte Waterer</i> , hellrosa	90—100	16,50	150,—	1350,—
<i>Henriette Sargent</i> , rosa				
<i>Mad. Carvalho</i> , reinweiß				
<i>Mad. Wagner</i> , weiß mit rotem Band				
<i>Maximum roseum</i> , rosa				
<i>Pink Pearl</i> , dunkelrosa				
<i>Prince Camille de Rohan</i> , weiß mit rosa				
Treibqualität zum Topfen 10 % Preisaufschlag				
St. <i>dahuricum</i> (L.) sibirische Alpenrose. Fast wintergrün, reich verzweigt, Blätter ei-elliptisch, oben dunkelgrün, Blüten meist einzeln, flach, tellerförmig, purpur-rosa, 3 cm breit, Blütezeit in milden Wintern schon ab Jan.-Febr., sonst März-April	30—40	2,80	24,75	225,—
St. <i>ferrugineum</i> (L.) die echte Alpenrose, 50—80 cm hoch werdend. Junge Zweige dicht bräunlich behaart, Blätter länglich-elliptisch, oben glänzend dunkelgrün, unten dicht bräunlich behaart. Blüten scharlach-rosa zu 6—12 zusammenstehend, trichterförmig, 1—2 cm breit, Blütezeit Juli-August	20—30	2,80	24,75	225,—
St. <i>hirsutum</i> (L.) Alpenrausch. In den Alpen häufig vorkommend. Bis 50 cm hoch werdend, junge Triebe haarig. Blätter elliptisch-länglich, oben frischgrün. Blüten scharlach-rosa. Blütezeit Juni	25—30 30—40	2,80 3,40	24,75 30,—	225,— 270,—
St. <i>minus</i> (Michx.) (R. punctatum) (Andr.). Blüten karmin-rosa, wild, breit, dicht, buschig	30—40 40—50	2,80 3,40	24,75 30,—	225,— 270,—
St. <i>praecox</i> (Carr.) (R. dahuricum x ciliatum) (hook.). Fast immergrün bis 1 m hoher Strauch, Blätter elliptisch, oben tiefgrün und glänzend. Blüten zu wenigen zusammenstehend, tief karmin-rosa, 4 cm breit, Blütezeit März-April	15—30 30—40 40—50	2,50 2,70 3,40	22,50 24,75 30,—	200,— 225,— 270,—
<i>punctatum</i> siehe R. minus.				

Rhodotypus (S. et Z.) Scheinkerrie (Rosaceae)

Sch. <i>kerrioides</i> (S. et Z.) (R. scandens) (Mak), breit aufrecht wachsender bis 2 m hoher Strauch, Zweige oliv-bräunlich, Blätter gegenständig, ei-länglich, doppelt gesägt, oben dunkelgrün. Blüten einzeln, vierzähnl., reinweiß, 4—5 cm breit. Blütezeit Mai-Juni, Frucht erbsengroß, glänzend schwarz	60—100	0,65	5,60	52,50
--	--------	------	------	-------

Rhus (L.) Sumach (Anacardiaceae)

<i>cotinus</i> (L.) siehe <i>Cotinus coggygria</i> .				
R. <i>typhina</i> (L. (R. hirta) (Sudw.) Essigbaum. Bis 12 m hoher Baum, ausläufertreibend, ziemlich dichte, samthaarige, sehr groß gefiederte Blätter, sattgrün, im Herbst sich orange bis scharlach färbend. Blüten grünlich in dichthaarigen bis 20 cm langen Rispen. Blütezeit Juni-Juli. Früchte kolbenartig karmesinrot, dichthaarig	80—100 100—150	1,10 1,50	10,— 13,50	
<i>dissecta</i> (Rehd.). Blättchen fiederschnittig, farnartig aussehend, sonst wie die Stammart	80—120	1,50	13,50	

Ribes (L.) Stachelbeere, Johannisb. (Saxifragaceae)

H.R.Sch. <i>alpinum</i> (L.) Alpenjohannisbeere. Bis 3 m hoher Strauch Blätter rundlich, 3—5lappig, sehr guter Schatten- und Heckenstrauch	30—40 40—60 30—40 40—60 60—80 40—60 60—80	0,30 0,40 0,45 0,55 0,65 0,65 0,75	2,50 3,75 4,10 5,10 5,65 5,65 6,75	22,50 33,75 37,50 45,— 52,50 52,50 60,—
1- und 2jährige Pflanzen siehe unten Junggehölzen.				
H. <i>aurum</i> (Pursh) (R. tenuiflorum) (Ldl.) Goldtraube. Bis 2 m hoher Strauch. Blätter rundlich, dreilappig, grob gezähnt, Blüten gelb in hängenden Trauben zu 5—15 sitzend. Blütezeit April-Mai. Frucht erbsengroß, purpur-braun bis schw.	80—120	0,45	4,10	37,50

Ribes (L.) Stachelbeere, Johannisbeere
(Saxifragaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.Sch. divaricatum (Dougl.) (R. arboreum) (hort). Bis 3 m hoher Strauch. Zweige stark bewehrt, Blätter rundlich-herzförm., meist fünfklappig, Blüten grünlich purpur zu 2—4 an dünnen Stielen, Frucht schwarz oder dunkelrot, gutes Vogelschutzgehölz	80—120	0,45	4,10	37,50
Sch. floridum (L'Her) (R. americanum) (Mill). Amerikanische Ahlbeere. Bis 1,5 m hoher Strauch. Blätter fast kreisrund, drei- bis fünfklappig, Herbstfärbung gelb- und braun-rot, Blüten gelblich-weiß, glockig, in vielblütigen 10 cm langen hängenden Trauben. Blütezeit April-Mai. Frucht schwarz	80—120	0,55	5,10	45,—
nigrum (L.) bekannte Ahlbeere. Bis 2 m hoher Strauch mit rundlichen 3—5klappigen Blättern. Blüten grünlich oder rötlich weiß, glockig in 4—10blütigen, hängenden Trauben. Blütezeit April-Mai. Beeren rundlich, schwarz, eßbar	80—120	0,45	4,10	37,50
sanguineum (Pursh.) Blutjohannisbeere, bis 4 m hoch werdender Strauch. Blätter nierenförmig, rundlich, oberseits dunkelgrün. Blüten karminrot in hängenden, vielblütigen Trauben	60—100	0,75	6,75	60,—
leichte Büsche aus halbweitem Stand				
atrisanguineum (Kirchn). Blüten dunkelkarmin, sonst wie die Stammform; einer der schönsten Blütensträucher für das Frühjahr	80—100	0,75	6,75	60,—
leichte Büsche aus halbweitem Stand				

R. Robinia (L.) Schotendorn (Leguminosae)

hispida (L.) rotblühende Akazie, kleiner Baum oder Strauch, Zweige mit dichten Borsten, Blätter gefiedert, oben tief grün, Blüten rosa bis hellpurpur, in lockeren Trauben, Blütezeit Mai-Juni.....

60—100	2,25
100—120	3,40
120—140	4,50

Halbstämme, Stammhöhe

B. pseudoacacia (L.) gemeine Akazie. Bis 25 m hoher, locker wachsender Baum. Blätter gefiedert, oben sattgrün. Blüten weiß, stark duftend, in dichten 10—20 cm langen Trauben. Blütezeit Ende Mai-Juni. Wertvolle Bienenweide und zur Bepflanzung auch schlechterster Böden
2x verpflanzte Heister aus weitem Stand

125—150	0,90	8,75	75,—
150—200	1,10	10,—	94,—
200—250	1,40	12,75	112,50
250—300	1,80	15,75	142,50

Alleebäume, Stammumfang

8—10	2,80	24,75	225,—
10—12	3,75	33,75	300,—
12—14	4,70	41,—	375,—

Alleebäume, Stammumfang
in extra weitem Stand verpflanzt {

8—10	4,10
10—12	5,60
12—14	6,75

Bessoniiana (Nichols), starkwachsende Kugelakazie, eine geschlossene, aber weniger dichte ovale Krone bildend

Alleebäume, Stammumfang

8—10	4,70	41,—
10—12	5,60	50,—
12—14	7,—	61,50

in extra weitem Stand verpflanzt {

8—10	6,—
10—12	7,10
12—14	9,—

Decaisneana (Carr.), starkwüchs. Baum mit hellrosa Blüten

8—12	4,70
10—12	5,60

monophylla (Carr.) mit meist nur einem, höchstens 2—3 gefiederten Blättern **Hochst., Stammumfang**

8—12	4,70
	5,60
12—14	6,95

Rosa (L.) Rose (Rosaceae)

siehe auch unter Rosen Seite 14

canina (L.) bekannte Hundsrose. Bis 3 m hoch werdend, mit einfachen rosa Blüten

60—100	0,45	4,10	37,50
--------	------	------	-------

multiflora (Thbg.) (R. polyantha) (Roessig), dünnzweigiger fast rankender Strauch, Blüten weiß in zahlreichen gr. pyramidalen Doldentrauben. Früchte erbsengr. braun-rot

60—100	0,45	4,10	37,50
--------	------	------	-------

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Rosa (L.) Rose (Rosaceae)					
H.	pimpinellifolia (L.) (R. spinosissima) (L.). Bibernelle-rose. Kaum 1 m hoher Strauch, stark ausläufertreibend, mit dünnen sparrigen Zweigen, dicht stachelig und borstig. Blüten weiß, zahlreich, einzeln an kurzen Seitenzweigen. Frucht braun-schwarz	60—100	0,55	5,10	45,—
H.	rubiginosa (L.) (R. eglanteria) (L.). Schottische Zaunrose, bis 3 m hoch werdend, aufrecht wachsend, stark be- stachelt, Blätter apfelartig duftend. Blüten frisch rosa Frucht scharlachrot	50—80 80—125	0,45 0,55	4,10 5,10	37,50 45,—
H.	rubrifolia (Vill.) (R. ferruginea) (Desègl.) (R. glauca) (Pourr.) Bis 3 m hoher schlanktriebiger Strauch, Zweige braun bereift, Blätter bräunlich-purpur und bläulich, Blüten karmesinrot. Frucht scharlachrot	40—60	0,55	5,10	45,—
H.	rugosa (Thunb.) (R. regelliana) (Andr. u. Lind), japanische Apfelrose. Bis 2 m hoher buschiger Strauch, Zweige sehr stark bestachelt, Blüten einzeln oder zu wenigen sitzend, rot-rosa. Vom Mai bis zum Herbst blühend, Frucht flach kugelig, leuchtendrot. Früchte im Haushalt verwendbar	30—40 40—60 60—80	0,40 0,50 0,55	3,75 4,50 5,10	33,75 41,25 45,—
	hollandica (hort.) stark wachsender mittelhoher Strauch mit roten Blüten	80—125	0,55	5,10	45,—
	virginiana (Mill) (R. lucida) (Ehrh.). Bis 1,5 m hoher dicht- zweigiger Strauch, stark ausläufertreibend, Blüten rosa, meist einzeln oder zu wenigen, reichblühend, Frucht scharlachrot	50—80	0,55	5,10	45,—
Rubus (L.) Brombeere, Himbeere (Rosaceae)					
	fruticosus (L.) (R. plicatus) (Weihe et Nees), die einhei- mische bekannte Brombeere	60—80	0,45	4,10	37,50
	idaeus (L.) bekannte heimische Himbeere	60—80	0,45	4,10	37,50
	odoratus (L.) (R. grandifolius) (Salisb.), aufrechtwachsender bis 3 m hoher Strauch, ausläufertreibend, Blätter herz- förmig, fünfklappig, fein gesägt, sattgrün. Blüte karminrot, duftend in kurzen vielblütigen Rispen	60—80	0,75	6,75	60,—
	spectabilis (Pursh.). Bis 2 m hoher aufrechtwachs. Strauch Blättchen dreiteilig, eiförmig, eingeschnitten gesägt, Blü- ten einzeln, karminrot an einzeln. Seitenzweigen sit- zend, Blütezeit April-Juni, Frucht groß, dunkelgelb, essbar	60—80	0,75	6,75	60,—
Salix (L.) Weide (Salicaceae)					
	adenophylla (Hook) (S. sytricola) (Fern.). Bis 2,5 m hoher Strauch, Zweige seidig behaart, Blätter ei-lanzettlich, kurz zugespitzt, beiderseits dicht grauseidig behaart	100—150	0,45	4,10	37,50
	alba argentea (Wimm) (S. alba sericea) (Gaud.) (S. alba egalis) (hort.) Silberweide, rasch wachsender Baum mit abstehenden Zweigen. Blätter lanzettlich zugespitzt, bei- derseits dichtseidig behaart und silbrig glänzend	125—175	0,45	4,10	37,50
B.	vitellina Britzensis (Spaeth). Zweige besonders im Win- ter lebhaft rot bis orange, vorzügliche Bindeweide	125—175	0,45	4,10	37,50
Tr.	vitellina pendula (Rehd.) (S. alba tristis) (Gaud.) Trauer- goldweide, Zweige hellgelb, lang und senkrecht nieder- hängend. Bekannteste Trauerweide	125—150 150—200 200—250 250—300	1,40 1,80 2,25 2,80	12,75 15,75 20,— 24,75	
	Hochstämme, Stammumfang	6—8 8—10 10—12	3,60 3,75 5,20		
R.B.	caprea (L.), Salweide. Strauch oder kleiner Baum, Zweige anfangs grau behaart, dann glänzend braun, Knospen sehr dick, Blätter breit elliptisch, kurz zugespitzt, ker- big gesägt, glänzend grün. Vorzügliche Bienenweide	80—125	0,55	5,10	45,—
R.B.	mas. (L.) Männliche Form der Salweide. Wohl die schönste aller Kätzchenweiden	10—150	1,10	10,—	94,—
	cinerera (L.) Aschweide. Bis 5 m hoher Strauch, Zweige graufilzig, Blätter elliptisch meist an ihren oberen Teilen gekerbt, oben stumpfgrün, unten dicht grau behaart	100—150	0,45	4,10	37,50
B.	daphnoides (Vill.) Reifweide. Großer Strauch oder Baum. Zweige gelblich-braun, stark bereift, Blätter verkehrt lanzettlich, fast ganzrandig, lebhaft-glänzend dunkelgrün, unten bläulich, derb. Wertvolle Kätzchenweide	125—175 8—10	0,45 2,25	4,10 20,—	37,50
	Hochst., Stammumfang				

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Salix (L.)-Weide (Salicaceae)					
B.	daphnoides praecox (hort.) Frühe Kätzchenweide, etwa 2 m hoch werdende Form der Reifweide, besonders reich- und frühblühend. Als Kätzchenweide sehr wertvoll	125—175	0,55	5,10	45,—
Tr. B.	elegantissima (K. Koch.) (S. Siboldi) (Hort) mittelhoher, breitkroniger Baum mit abstehenden Ästen und langen herabhängenden Zweigen, gelblich bis bräunlich grün	125—175	0,45	4,10	37,50
	laurifolia siehe S. pentandra.				
B.	macrolepis (Larxch.) stark wachsender Strauch, hellholzige, Blätter oberseits glänzend grün, unterseits blau-grau, Kätzchen groß, grau, eine sehr wertvolle Kätzchenweide	125—175	0,45	4,10	37,50
B.	Medemi (Boiss.) Bis 4 m hoher Strauch, Zweige filzig behaart, Blätter länglich elliptisch, grob kerbig gesägt, oben satgrün, unten bläulich-grau. Männliche Kätzchen, sehr dick bis 4 cm lang, schon im März erscheinend. Sehr wertvolle Kätzchenweide	125—175	0,55	5,10	45,—
B.	muscina (Dode), Holz sehr dunkelgrün, Blätter seidig-flaumig, bis 4½ cm breit und bis 10 cm lang werdend, Ränder stark gewellt. Kätzchen dicht zusammenstehend, mittelgroß, silbriggrau. Auffallend lange Hüllblätter. Sehr gute Kätzchenweide	100—150	0,55	5,10	45,—
	nigricans (Sm) (S. myrsinifolia) (Salisb.) Negerweide, Bindeweide. Mit langen, dünnen, zähen Ruten, Strauch sparrig, Blätter spitz, elliptisch bis 10 cm lang, oberseits dunkelgrün	100—150	0,55	5,10	45,—
B.	pentandra (L.) (S. laurifolia) (hort.) Lorbeerweide. Strauch oder Baum. Zweige glänzend bräunlich-grün. Blätter elliptisch bis 1—2 cm lang, derb, stark glänzend, tiefgrün. Kätzchen goldgelb bis 5 cm lang werdend. Schöne Zier- und Kätzchenweide	125—175	0,45	4,10	37,50
B.	pontederana (Willd) (S. purpurea x cinerera). Bis 4 m hoher Strauch. Blätter verkehrt eiförmig bis lanzettlich gesägt, oben dunkelgrün. Kätzchen anfangs rötlich, schmal zylindrisch. Gute Kätzchenweide	125—175	0,55	5,10	45,—
B.	pulchra ruberrima (Hort) Holz sehr glänzend, auf der Sonnenseite prächtig rot, Blätter oberseits glänzend grün, unterseits blau. Kätzchen früh erscheinend, sehr groß, erheblich gerötet. Eine sehr gute Kätzchenweide	125—175	0,55	5,10	45,—
	sacramentana (hort) Trauerweide, grünholzige mit tiefgrünen Blättern und weit auslagernden hängenden Zweigen	150—200 200—250	1,80 2,25	16,— 20,—	
B.	Smithiana (W. Koch) (S. viminalis x caprea). Bis 6 m hoch werdender Strauch, Zweige behaart, Blätter länglich lanzettlich, dunkelgrün, unten grau und weichhaarig, Kätzchen März-April, etwa 3 cm lang, sehr dick. Eine der besten Kätzchenweiden	150—200	0,45	4,10	37,50
	viminalis (L.) Korbweide. Aufrechter Wuchs, 5—10 m hoch werdend, Zweige schlank, grau-grün, Blätter schmal lanzettlich, oben stumpfgrün, unten seidig silbriggrau behaart. Wertvolle Nutzweide	150—200	0,45	4,10	37,50

Sambucus (L.) Holunder (Caprifoliaceae)

R.Sch.	canadensis (L.) Bis 4 m hoch werdender Strauch, Zweige grau-gelb, Blätter gelappt, scharf gesägt, oben hellgrün. Blüten gelblich-weiß, duftend, in 20—25 cm breiten schirmartig gewölbten Doldenrispen. Frucht glänzend schwarz-purpur	80—120	0,55	5,10	45,—
	lutea (hort.) (S. nigra lutea) (Hort.) Blätter goldig	60—80	0,65	5,60	52,50
	nigra (L.) bekannter heimischer Holunder. Bis 4 m hoher Strauch mit prächtig stark duftenden gelblich-weißen Blütenständen	80—100 125—175	0,45 0,55	4,10 5,10	37,50 45,—
	leichte Büsche aus halbweitem Stand		0,38	3,60	30,—
R.Sch.	racemosa (L.) Traubenholunder. Bis 4 m hoher Strauch, Zweige hellbraun, Blätter gelappt, scharf grob gesägt, Blüten gelblich-weiß in dichten eiförmigen 6 cm langen Rispen. Blütezeit April-Mai, Frucht scharlach-rot	80—120	0,75	6,75	60,—

Skimmia (Thunb.) Rutaceae

japonica (Thunb.) bis 1,5 m hoch, Blätter an den Zweigen gehäuft, elliptisch bis verkehrteiförmig, 7—12 cm lang, oben frischgrün, unten gelblich, Blüten gelblich-weiß, 8 mm breit, in 5—8 cm langen Rispen, Frucht kugelig, hochrot	30—40 40—60	2,25 3,—	20,— 27,—
---	----------------	-------------	--------------

B. **Sorbaria** (A. Br.) Ebereschenspiere (Rosaceae)

sorbifolia (A. Br.) (*Spiraea sorbifolia*) (L.) aufrechter bis 2 m hoher Strauch, stark ausläufertreibend. Blätter geschnitten, 5–10 cm lang, doppelt gesägt, beiderseits grün, Blüten in 25 cm langen fein behaarten Rispen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
80–125	0,65	5,60	52,50

Sorbus (L.) Eberesche (Rosaceae)

aria (Crantz) Mehlbeere. Bildet pyramidenförmige Kronen.

Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits weiß

Hochstämme, Stammumfang

10–12	4,70	41,—
12–14	5,60	49,50
14–16	6,85	61,50

Sch.

aucuparia (L.) Gemeine Eberesche. Bis 15 m hoher Baum mit rundlicher Krone, Blätter bis 20 cm lang mit 9–15 cm länglich-lanzettlich scharf gesägten sattgrünen Blättern. Blüten weiß, in 15 cm breiter behaarter Doldentraube. Frucht scharlachrot, im Hochsommer den Baum zierend. 2x verpflanzte Heister aus weitem Stand

125–150	0,90	8,75	75,—
150–200	1,10	10,—	94,—
200–250	1,40	12,75	112,50
250–300	1,80	15,75	142,50

Hochstämme, Stammumfang {

8–10	2,80	24,75	225,—
10–12	3,75	33,75	300,—

Alleebäume, Stammumfang

in extra weitem Stand verpflanzte {

8–10	4,10	37,50	—
10–12	5,60	49,—	—
12–14	6,75	60,—	—
14–16	8,25	75,—	—
16–18	9,40	83,—	—
18–20	11,25	100,—	—

moravica (Zengerl) (*S. edulis*) (Dieck) Eßbare Eberesche. Früchte ziemlich groß, säuerlich, zu wirtschaftl. Zwecken verwendbar

Alleebäume, Stammumfang {

8–12	3,75	33,75	300,—
10–12	4,70	41,—	375,—
12–14	5,60	49,50	450,—
14–16	7,50	67,50	600,—

suecica (Krock u. Almag.) (*S. scandica*) (Fries) (*S. intermedia*) (Pers.) (*S. minima*) (Hedl.) (*S. aria suecica*) (Koehne, schwedische Mehlbeere. Bis 10 m hoher Baum, Blätter länglich eiförmig bis 11 cm lang, fiederartig gelappt, dunkelgrün, unten weißfilzig. Blüten weiß in 10 cm breiten filzigen Doldenrispen. Frucht kurz, oval, orangescharlach. Ein ausgezeichnete Straßenbaum, besonders für rauhe windige Lage.

2x verpflanzte Heister aus weitem Stand

150–200	1,40	12,75	112,50
200–250	1,80	15,75	142,50
250–300	2,25	20,—	187,50
300–350	2,80	24,75	225,—

Alleebäume, Stammumfang {

7–8	3,—	28,50	263,—
8–10	3,75	33,75	300,—
10–12	4,70	41,—	375,—
12–14	5,60	49,50	450,—
14–16	7,50	67,50	600,—

Spiraea (L.) Spierenstrauch (Rosaceae)

H.St.

albiflora (Miq) bis 0,5 m hoher Strauch, steil aufrecht wachsend, Blätter lanzettlich, grob gesägt, dunkelgrün, Blüten weiß in feinen behaarten traubigen Blütenständen

30–50	0,55	5,10	45,—
-------	------	------	------

H.St.

arguta (Zabl) (*S. Thunbergi* x *multiflora*). Bis 2 m hoher Strauch mit dichter, feiner, überhängender Bezweigung. Blätter schmal, verkehrt eiförmig, scharf gesägt, lebhaft grün, Blüten reinweiß in vielblütigen Doldentrauben. Blütezeit Ende April-Mai. Einer der schönsten Frühjahrsblüher, unempfindlich gegen Trockenheit und wertvoll zum Treiben

40–60	0,75	6,75	60,—
-------	------	------	------

ariaefolia siehe Holodiscus.

Douglasii (Hook). Bis 2½ m hoher Strauch mit dichten weißfilzig trüben Blättern, schmal länglich, an der oberen Hälfte gesägt, Blüten purpur-rosa in schmal kegelförmiger dichter bis 20 cm langer Rispe. Blütezeit Juli-August

100–150	0,45	4,10	37,50
---------	------	------	-------

H.

fontanaysiensis (Dipp) (*Sp. canescens* x *salicifolia*). Bis 3 m hoher Strauch. Blätter länglich oval. Blüten weiß in bis 8 cm langen pyramidalen Rispen. Blütezeit Juni-Juli

80–150	0,45	4,10	37,50
--------	------	------	-------

Spirea (L.) Spierenstrauch (Rosaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.Sch.	hypericifolia (L.) . Bis 1½ m hoher Strauch. Zweige fein behaart, Blätter verkehrt ei-rundlich, oben grau-grün, unten heller bis bläulich. Blüten weiß, meist zu 5 in fast sitzenden Dolden. Blütezeit April-Mai	40—60	0,55	5,10	45,—
H.Sch.	Menziesi triumphans (hort.) Bis 3 m hoher Strauch. Blätter länglich-elliptisch, lebhaft grün, Blüten karmin-rosa in dichter schmal pyramidalen bis 20 cm langer Rispe. Verträgt Schatten und nährstoffarme Böden	80—125	0,45	4,10	37,50
	opulifolia siehe <i>Physocarpus</i> .				
	prunifolia plena (C. Schn.) . Bis 1½ m hoch werdender Strauch. Triebe schlank, rutenförmig, Blätter spitz eilänglich, fein gezähnt, lebhaft glänzend grün, Herbstfärbung leuchtend orange bis braun-rot. Blüten reinweiß, hübsch gefüllt, bis 1 cm breit, Blütezeit April-Mai	40—60	1,10	10,—	94,—
R. H.St.	pumila Anthony Waterer (Waterer) . Bis 1,25 m hoher Strauch. Blätter länglich-lanzettlich, scharf doppelt sägezählig, dunkelgrün, mitunter gelb-bunt. Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldentraube. Blütezeit Juli-September. Zu Hecken und Massenanpflanzungen sehr geeignet	30—40 40—50	0,45 0,55	4,10 5,10	37,50 45,—
	leichte Büsche aus halbweisem Stand				
H.R.	Fröebeli (S. callosa Fröebeli) (Fröeb.) Strauch niedrig, dicht wachsend. Blüten dunkelpurpur in großen Doldentrauben. Durch den schönen purpurroten Austrieb sehr zierende Farbe	50—80	0,55	5,10	45,—
	leichte Büsche aus halbweisem Stand		0,45	4,10	37,50
	sorbifolia siehe <i>Sorbaria</i> .				
H.R.	Thunbergi (Sieb.) . Bis 1 m hoher Strauch mit feiner überhängender Bezweigung. Blätter lanzettlich scharf gesägt, lebhaft grün. Blüten reinweiß in wenig blütiger sitzender Dolde. Blütezeit April-Mai, sehr widerstandsfähig gegen Dürre	40—60	0,75	6,75	60,—
H.R.Sch.	Van Houffei (Zbl) (S. cantoniensis x trilobata) . Bis 2 m hoher Strauch mit dichter überhängender Bezweigung. Blätter rhombisch-eiförmig, 3—5lappig, dunkelgrün. Blüten reinweiß in flacher, gewölbter Doldentraube. Blütezeit Mai-Juni. Einer der schönsten Frühjahrsblüher	80—100 100—150	0,45 0,55	4,10 5,10	37,50 45,—

Stephanandra (S. et Z.) Kranzspiere (Rosaceae)

incisa (Zbl.) (S. flexuosa) (S. et Z.) Bis 1,5 m hoher Strauch, Zweige schlank überhängend, lebhaft braun-rot, Blätter eiförmig, eingeschnitten, gelappt und grob gesägt mit langer, ausgezogener Spitze, lebhaft grün, im Herbst satt braun-rot. Blüten grünlich-weiß in lock. bis 6 cm langen Doldentrauben	40—60	0,75	6,75	60,—
--	-------	------	------	------

Symphoricarpus (L.) Schneebeere (Caprifoliaceae)

H.Sch.	orbiculatus (Mch) (S. vulgaris) (Mchx.) Korallenbeere. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit schlankem ausladendem Wuchs. Blätter ei-rundlich bis elliptisch, oben stumpfgrün, unten grau-grün, im Herbst rot, Blüten glockig, blaßrot in kleinen dichten Büscheln oder kurzen Ähren. Blütezeit Juli-August, Beeren purpur-rot, rundlich, sehr lange haftend	60—80	0,55	5,10	45,—
	leichte Büsche aus halbweisem Stand		0,37	3,50	30,—
	variegatus (C. Schn.) Blätter goldgelb gerandet und gedert	50—80	0,55	5,10	45,—
H.B.Sch.	racemosus (Mchx.) (S. albus var. levigatus) (Blake) gemeine Schneebeere. Bis 1,5 m hoher Strauch. Blätter ei-elliptisch bis rundlich, ganzrandig, oben dunkelgrün, Blüten glockig, rötlich-weiß in Ähren stehend. Blütezeit Juli-September. Beeren weiß, rundlich in dichten Büscheln, bis nach dem Laubabfall haftend. Sehr guter Schattenstrauch und Bienenpflanze	60—100	0,45	4,10	37,50
	leichte Büsche aus halbweisem Stand		0,35	3,—	27,—

Syringa (L.) Flieder (Oleaceae)

R.	chinensis (Willd) (S. rothomagensis) (De. Launey) (S. dubia) (Pers.) Bis 5 m hoher Strauch, Zweige schlank überhängend, Blätter ei-lanzettlich, Blüten lila-rosa in großen langen Rispen. Blütezeit Mai	60—80	2,15	20,—	180,—
----	--	-------	------	------	-------

Syringa (L.) Flieder (Oleaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Josikaea (Jacq.) bis 4 m hoher Strauch, aufrecht wachsend, Blätter breit elliptisch spitz, dunkelgrün, Blüten dunkelviolett, schwach duftend in schmalen aufrechten 10–20 cm langen Rispen. Blütezeit Mai–Juni	60–100	0,90	8,75	75,—
H.R. vulgaris (L.) bekannter, heimischer gemeiner Flieder. Bis 7 m hoher Strauch oder Baum, Blätter eiförmig zugespitzt, Blüten lila in 10–20 cm langen Rispen, stark duftend. Blütezeit Mai–Juni. Als Heckenpflanze geeignet.	60–80 80–100 100–125 60–80 65–100 80–120	0,55 0,75 0,90 2,15 3,— 3,75	5,10 6,75 8,75 20,— 27,— 33,75	45,— 60,— 75,—
vulgaris in veredelten Sorten	Büsche mit 3–5 Trieben " " 5–8 " " 8–12 "			
Büsche extra stark, auf Wunsch mit Ballen	100–125 125–150 80–100 100–120 120–140 140–160	6,— 6,75 3,75 4,50 5,25 6,—		
Halbstämme, Stammhöhe				

veredelte Sorten:

einfach blühend:

Andenken an L. Späth, dunkelrot
Charles X, lila-rot
Frau Berta Dammann, reinweiß
Marie Legraye, reinweiß
Perle von Teltow, dunkelviolett
Ruhm von Hortenstein, lila-rot
Sinai rosea, rosa

gefüllt blühend:

Anthony Buchner, bläulich-lila
Mad. Lemoine, reinweiß
Michel Buchner, hell-lila
Perle von Stuttgart, lila
President Grevy, rosa-lila

Tamarix (L.) Tamariske (Tamaricaceae)

odessana (Stev.) Bis 2 m hoch werdender Strauch, aufrecht wachsend, Blätter lanzettlich, grau-grün, Blüten klein, hellrosa, in 3 cm langen Ähren zu Rispen vereint, Blütezeit Juni–August	80–120	0,65	5,60	52,50
pentandra (Pall) (T. hispida aestivalis) (hort.) 3–4 m hoch werdender Strauch. Zweige purpur überhängend, Blätter lanzettlich, bläulich-grün. Blüten lebhaft rosa in kleinen Ähren, die zu großen Rispen vereint sind. Blütezeit Ende Juni–August	80–120	1,50	13,50	
tetandra (Pall) 3–4 m hoher Strauch mit überhängenden dunkelbraun-roten Zweigen. Blätter schuppenförmig, eilanzettlich, lebhaft grün, Blüten hellrosa in kleinen seitständigen Ähren längs der vorjähr. Zweige. Blütezeit Mai	80–125	0,65	5,60	52,50

Teucrium (L.) Gemander (Labiatae)

H.St. chamaedris (L.) kleiner immergrüner Halbstrauch, Blätter gegenständig, spitz, ei-länglich, lebhaft glänzend grün, behaart. Blüten purpur in engständigen lockeren kleinen Trauben. Blütezeit Juli–Oktober. Für niedrige Hecken bestens geeignet	15–20	0,22	1,95 3,40	18,— 26,50
			lfd. Meter	

Tilia (L.) Linde (Tiliaceae)

R. euchlora (K. Koch) (T. dasystyla) (Loud) Krimlinde. Bis 20 m hoher Baum mit rundlicher oder ovaler Krone und grüner leicht überhängender Bezweigung. Blätter glänzend dunkelgrün, unten hellgrün, außerordentlich widerstandsfähig gegen Staub und Rauch, Alleebäume , Stammumfang	8–10 10–12 125–150 150–200 200–250 250–300	4,70 5,60 1,10 1,40 1,80 2,25	41,— 49,50 10,— 12,75 15,75 20,—	— — 94,— 112,50 142,50 187,50
grandifolia (Ehrh.) (T. platyphyllos) (Scop.) Großblättrige Sommerlinde. Bis 40 m hoher Baum mit breiter eiförmiger Krone. Blätter groß, lebhaft grün	8–10 10–12 12–14 14–16 12–14 14–16 16–18 18–20	3,75 4,70 5,60 7,50 7,50 9,75 11,25 15,—	33,75 41,— 49,50 67,50 — — — —	300,— 375,— 450,— 600,—
Alleebäume, Stammumfang				
in extra weitem Stand verpflanzt				

Tilia (L.) Linde (Tiliaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
B. intermedia (D. C.) (T. vulgaris) (Hayne) (T. hollandica) (hort) (T. parvifolia x grandifolia) (Holländische Linde. Bis 40 m hoher Baum mit pyramidalen Krone und frischgrüner Be- laubung, reichblühend. Vorzügl. Bienenweide. Allgemein beliebter Straßenbaum Alleebäume , Stammumfang	8—10 10—12 12—14 12—14 14—16 16—18 18—20 20—24	5,60 7,10 9,35 11,25 13,50 16,90 22,50 30,—	49,50 61,50 82,50	
in extra weitem Stand verpflanzt				
B.H.Sch. parvifolia (Ehrh.) (T. cordata) (Mill) (T. ulmifolia) (Scop) Steinlinde. Bis 30 m hoher Baum mit ausladender Krone. Blätter verhältnismäßig klein, sattgrün. Blüten gelblich- weiß, stark duftend, in der ersten Hälfte des Juli erschein- end, außerordentlich reich blühend, sehr gute Bienen- weide	100—125 125—150 150—200 200—250	1,10 1,40 1,80 2,25	10,— 12,75 15,75 20,—	94,— 112,50 142,50 187,50
Alleebäume , Stammumfang	8—10 10—12 12—14	4,70 5,60 6,85	41,— 49,50 61,50	375,— 450,— 562,50
in extra weitem Stand verpflanzt	10—12 12—14 14—16 16—18	7,10 9,— 12,— 13,—		
R. tomentosa (Mnch.) (T. argentea) (Dest) (T. alba) (Waldst. u Kit). Ungarische Silberlinde. Bis 30 m hoher Baum mit dichter, breitpyramidalen Krone. Blätter dunkelgrün, unten schneeweiß filzig. Herbstfärbung goldgelb. Sehr beliebter Straßenbaum. Widerstandsfähig gegen Staub und Rauch Alleebäume , Stammumfang	8—10 10—12 12—14	5,60 7,10 9,40	49,50 61,50 82,50	
Alleebäume , Stammumfang	12—14 14—16 16—18	11,25 13,50 16,80		
in extra weitem Stand verpflanzt				

Ulex (L.) Stechginster (Leguminosae)

R. J. St. europaeus (L.) niedriger, sehr stacheliger und sparrig ver- zweigter Strauch, kaum 1 m hoch. Blätter zu lanzettlichen, langen Stacheln umgewandelt. Blüten goldgelb. Blütezeit Mai-Juni. Geeignet für trockenen und sandigen Boden. Gegen große Kälte empfindlich.....	20—30 30—50	0,45 0,55	4,10 5,10	37,50 45,—
1jähr. Sämlinge mit Topfballen				
1jähr. Sämlinge mit Topfballen				

Ulmus (L.) Ulme, Rüster-Ulmaceae

campestris (L.) (foliacea) (Gilib) (nitens) Mnch.) (glabra) (Mill.). Feldrüster, starkwüchsiger Baum, Borke grau und tiefriessig, Blätter eiliptisch, sehr schief, zugespitzt, 6—8 cm lang, doppelt gesägt	125—150 150—200 200—250	0,90 1,10 1,40	8,75 10,— 12,75	75,— 94,— 112,50
--	-------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Viburnum (L.) Schneeball (Caprifoliaceae)

Burkwoodii (Burkw.) Carlesii x utile. Wuchs sparrig, Blät- ter eiliptisch bis eiförmig, 4—7 cm lang, oben glänzend tiefgrün, unten graugrün filzig. Blüten duftend in dichten 5—7 cm breiten Scheindolden, zuerst rosa, später reinweiß	30—40 40—60 60—80	2,60 3,75 4,85	22,50 30,— 39,75	
R.St. Carlesii (Hemsl.) Bis 1,5 m hoher breiter rundlicher Strauch. Blätter breit eiförmig, trüb grün, unten heller. Blüten sehr wohlriechend, weißlich-rosa in dichter halbkugelförmiger Scheindolde, Blütezeit Ende April-Mai, mit Ballen	30—40 40—60	3,40 4,50	30,— 37,50	
R.Sch. lantana (L.) Bis 5 m hoher, aufrechter Strauch mit filzigen Trieben. Blätter länglich eiförmig, dicht gezähnt, oben dunkelgrün, unten dicht graufilzig, Blüten weiß in bis 10 cm breiten Doldenrispen. Blütezeit Mai-Juni. Frucht zuerst rot, dann glänzend schwarz.....	60—100	0,75	6,75	60,—

Viburnum (L.) Schneeball (Caprifoliaceae)

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.Sch.	opulus (L.) bis 4 m hoher, hellgrau rindiger Strauch. Blätter 3—5lappig, unregelmäßig gezähnt, lichtgrün. Blüten rahmweiß in bis 10 cm breiten Scheindolden mit vergrößerten unfruchtbaren Randblüten. Frucht rund-oval, rot.....	60—100	0,75	6,75	60,—
	sterile (D. C.) Gemeiner Schreeball. Bekannter Zierstrauch, der sich im Mai-Juni mit weißen bis rötlich überlaufenen Blütenballen bedeckt	3-5 Triebe 5-8 Triebe	0,75 0,90	6,75 8,75	60,— 75,—
	Halbstamm, Stammhöhe	100—120 120—140 140—160	2,60 3,40 4,10	24,— 30,— 37,50	
J.St.	rythidophyllum (Hemsl.) , immergrüner bis 4 m hoher Strauch. Blätter länglich eiförmig bis 25 cm lang, glänzend dunkelgrün, stark runzelig. Unterseits dicht grau- oder gelbfilzig. Blüten rahmweiß in 15—20 cm breiten Doldenrispen. Blütezeit Mai-Juni. Frucht kurz oval, zuerst rot, dann glänzend schwarz, mit Ballen	30—40 40—50 60—80	2,60 3,40 4,85	22,50 30,— 40,—	
	tomentosum (Tbg.) (V. plicatum) (Miq.) . Bis 3 m hoher breit-rundlicher Strauch, Blätter länglich-oval bis 12 cm lang, dunkelgrün, unten grauhaarig, Herbstfärb. dunkelviolettblau. Blüten weiß in bis 10 cm breiten Doldenrispen, mit breiten, langgestielten sterilen Randblättern. Frucht ei-oval, zuerst korallenrot, dann blau-schwarz, mit Ballen	40—60 60—80	1,50 2,40		
	sterile (K. Koch) (V. tom. plicatum) (Maxim) , japanischer Schneeball, schneeweiße, sterile Blüten in gegen 8 cm breiten kugeligen Bällen sitzend, mit Ballen	40—60 60—80	3,60 4,50		
	Vinca (L.) Immergrün (Apocynaceae)				
J.Sch.St.	minor (L.) bekannter kleiner Immergrün mit lila-blauen Blüt.	20—30	0,30	2,40	22,50
	Weigelia siehe Diervillea				

Schlingpflanzen

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Actinidia (Ldl.) Strahlengriffel (Dilleniaceae)				
<i>arguta</i> (Miq.), hochschlingend, Blätter eiförmig, 8—12 cm lang, zugespitzt, scharf gesägt, dunkelgrün, Blüten zu 3 und mehr, weiß, im Grunde bräunlich, 2 cm breit, duftend, mit Ballen	60—80	1,10	10,—	
Ampelopsis siehe unter Parthenocissus				
Aristolochia (L.) Osterluzei, Pfeifenwinde (Aristolochiaceae)				
<i>durior</i> (A. siphon) (L. Hérin) (A. macrophylla) (Lam), mehrere Meter hochschlingend mit großen, herzförmigen Blättern und pfeifenähnlichen Blüten	100—150	3,—	27,—	
Campsis (Lour.) Trompetenblume (Bignoniaceae)				
<i>chinensis</i> (Voss.) (Bignonia chin.) (Lam.) (Tecoma chin.) (K. Koch) (Tecoma grandifl.) (Loisel.). Blättchen eilanzettlich, gesägt. Blüten scharlachrot in größeren lockeren, endständigen Rispen		3,—	27,—	
Celastrus (L.) Baumwürger (Celastraceae)				
<i>orbiculata</i> (Thbg.) (C. articulata) (Thbg.), bis 12 m windend. Blätter eiförmig, 5—10 cm lang, plötzlich zugespitzt, kerbig gesägt, beiderseits hellgrün, Blüten blaßgrün in kurzen beiderseitigen Trugdolden. Juni. Frucht tief gelb, Samen scharlachrot		1,20	11,—	100,—
Clematis (L.) Waldrebe (Ranunculaceae)				
großblumige Sorten. Die Blüten haben einen Durchmesser 10—14 cm. Blütezeit Juni—Oktober. Sie lieben sonnige Lage, aber beschattete Baumscheibe.				
Sorten:				
<i>Jaquemanni</i> , dunkelviolet				
<i>Mad. Le Coultre</i> , weiß				
<i>Ville de Lyon</i> , rot				
<i>Jeanne d'Arc</i> , silberweiß				
<i>Nelly Moser</i> , rosa-weiß				
und andere Sorten				
1jähr. Veredelung mit Topfbällen und 2jähr. Veredelung		2,—	18,75	165,—
R.Sch. <i>vitalba</i> (L.) gemeine Waldrebe, weißblühend, federartige Fruchtstände		0,55	5,10	45,—
R. <i>viticella</i> (L.) Blaue Waldrebe, über 3 m hoch schlingend, lila-blaue, breitlockige Blüten, Juni bis Herbst		2,—	18,75	165,—
Glycine siehe unter Wistaria				
Hedera (L.) Efeu Araliaceae)				
<i>helix</i> (L.) Gemeiner Efeu, mit Ballen	40—60 60—80 80—100	0,85 1,10 1,50	7,50 10,50 13,50	64,— 94,— 116,—
<i>hibernica</i> (Kirchn) großblättr. Efeu, laub hellgrün, m. Ballen	40—60 60—80 80—100	0,85 1,10 1,50	7,50 10,50 13,50	64,— 94,— 116,—
Kletterrosen siehe unter Rosen				
Lonicera (L.) Geißblatt, Heckenkirsche (Caprifoliaceae)				
<i>brachypoda</i> siehe unter L. japonica				
<i>Brownii fuchsoides</i> (Rehd) (L. fuchsoides) (K. Koch) mit granatroten Blüten		3,—	27,—	
<i>punicea</i> (Rehd) (L. punicea) (K. Koch) Blüte korallenrot		3,—	27,—	
<i>caprifolium floridum</i> (hort.) starkwüchsige, winterharte Sorte mit gelb-roten Blüten in reicher Fülle		2,25	20,—	
<i>heckerotii</i> (Rehd) sehr reich blühend, Knospen purpur, beim Öffnen der Blüten in violett übergehend. Innenseite der Blüten weiß, später hellgelb, duft., Beeren purpurrot		3,—	27,—	
<i>flexuosa</i> (Thbg) (L. brachypoda) (D. C.) (Caprifolium flexuosum) (Hort) mittelhoher Schlinger mit duftenden, weißen, im Verblühen hellgelben Blüten		1,10	10,—	90,—
Sch. <i>periclymenum</i> (L.) bekanntes Waldgeißblatt, Blüte gelblich-weiß, wohlriechend		1,10	10,—	90,—
<i>Tellmanniana</i> (Spaeth) mit großen goldgelben Blüten		2,25	20,—	

Parthenocissus Jungfernrebe, wilder Wein

(Vitaceae)

Engelmanni (Koehe u. Gräbn) (Ampelopsis Engelmanni) (hort) Selbstklimmer. Aufgebundene Pflanzen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
	0,85	7,50	64,—

heterophylla, hochrankend, Blätter meist dreilappig gekerbt

	0,75	6,75	60,—
--	------	------	------

quinquefolia (Planch) (Ampelopsis quinquefolia) (Michx).

Wilder Wein, hochrankend, leuchtende Herbstfärbung, extra starke, aufgebundene Pflanzen

3—5 Triebe	0,55	4,90	45,—
5—8 Triebe	0,85	7,50	64,—
8—12 Triebe	1,20	10,50	94,—

Veitchii (Koehe u. Gräbn) (Ampelopsis Veitchii) (hort) (A. inconstans) (Miq), echter Selbstklimmer, schönste Art mit wunderbarer Herbstfärbung, Freilandware

1jähr. Veredlungen	60—80	0,55	4,90	45,—
2jähr. Veredlungen	80—100	0,75	6,75	60,—
1jähr. Veredelung mit Topfbällen	60—80	0,75	6,75	60,—
2jähr. Veredelung mit Topfbällen	80—100	0,90	8,75	75,—

Polygonum (L.) Knöterich (Polygonaceae)**Auberti** (Henry) raschwachs. Schlinger mit weißen Blüten, l. Gr.

	1,35	11,50	112,50
--	------	-------	--------

balschuanicum (Regel) stark wachsend, Blüten rötlich-weiß, l. Gr.

	1,35	11,50	112,50
--	------	-------	--------

Vitis (L.) Rebe (Vitaceae)**odoratissima** (Don.) Duftrebe, üppiger Schlinger, beliebter Zierwein

	1,35	11,50	
--	------	-------	--

Wistaria (Nutt) Wistarie, Glycine (Leguminosae)**chinensis** (D. C.) (Glycine sinensis) (Sm) (Glycine multijuga, (Clem) (W. polystachia) (K. Koch) wüchsiger Schlinger mit schönen hellblauen Blütentrauben

	3,40		
--	------	--	--

Topffichten usw.**Picea excelsa** für Töpfe, dunkelgrüne, dichtverzweigte Pflanzen, ohne Ballen

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
20—30	0,30	2,70	22,50
30—40	0,38	3,40	30,—
40—60	0,45	4,10	37,50
60—80	0,60	5,60	48,75

Balkonfichten mit Fehlern zum Dichtpflanzen von Balkonkästen, ohne Ballen 50 % billiger.

Pinus montana, für Töpfe, ohne Ballen

20—30	0,75	6,75	60,—
30—40	0,90	8,75	75,—
40—60	1,10	10,—	90,—

Koniferen**Zur besonderen Beachtung!**

1. Die weitmäschigen Ballentücher, mit welchen Koniferen bis zur Höhe von etwa 3 m geliefert werden, dürfen beim Pflanzen nicht abgenommen werden. Bei stärkeren Ballentüchern ist nur ein Lösen des Knotens erforderlich.
2. Immergrüne Pflanzen entziehen dem Ballen während des Transportes viel Feuchtigkeit, und so ist es leicht erforderlich, daß der Ballen trocken wird. Deshalb ist ein durchdringendes Gießen der ankommenden Pflanzen erforderlich.

Abies (Mill) Tanne (Pinaceae)**alba** (Mill) (A. pectinata) (D. C.) Edel- oder Weißtanne, bis über 60 m hoch, Benadelung hellgrün

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
40—60	1,70	13,50	120,—
60—80	2,30	18,75	165,—
80—100	2,90	23,—	210,—
100—125	3,75	30,—	270,—
30—40	2,90		
40—60	3,75		
60—80	4,70		
80—100	6,15		
100—125	8,25		

R.

arizonica (Merriam). Korktanne, gegen 15 m hoher Baum mit korkiger, rahmweißer Rinde und glänzendgrünen, unten silberweißen Nadeln.....

Abies (Mill) Tanne (Pinaceae)

	Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
balsamea (Mill) Balsamtanne, 20—25 m hoch, glatte aschgrau Rinde, Nadeln dunkelgrün, mit weißen Spaltöffnungslinien	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,70 2,30 2,90 3,75 4,70		
brachyphylla (Maxim) (<i>Abies homolepis</i>) (S. et Z.) Nikkotanne, breite, kegelförmige Tanne, bis 40 m Höhe, widerstandsfähig	40—60 60—80 80—100 100—125	3,75 4,70 6,15 8,25	30,— 37,50 49,50 67,50	
R. concolor (Ldl et Gord.) Koloradotanne, blau-grüne, lange Nadeln, bis 40 m hoch werdend, vollständig winterhart	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,75 4,70 6,15 8,25 10,50	30,— 37,50 49,50 67,50 82,50	
Nordmanniana (Spach) Nordmanns Tanne, Wuchs kräftig pyramidal, Nadeln unterseits weiß, Höhe bis 50 m	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	2,90 3,75 4,70 6,15 8,25	23,25 30,— 37,50 49,50 67,50	210,— 270,— 338,— 450,—
pectinata siehe <i>alba</i>				
Veitchii (Ldl.) (<i>A. nephrolepis</i>) (Maxim) bis 25 m hoch, schöne, regelmäßige Wuchsform, Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits kreideweiß	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,75 4,70 6,15 8,25 10,50	30,— 37,50 49,50 67,50 82,50	270,— 338,—

Biota orientalis siehe unter *Thuja orientalis***Cedrus (Link) Zeder (Pinaceae)**

atlantica glauca (Carr) Blau-grüne Form der nordamerikanischen Atlas-Zeder, braucht geschützten Standort	40—60 60—80 80—100 100—125	2,90 3,75 4,70 6,15		
---	-------------------------------------	------------------------------	--	--

Chamaecyparis (Spach) Scheinzypresse (Pinaceae)

H.R. Lawsoniana (Parl.) sehr hoch werdender Baum, Zweige und Spitzentrieb leicht überhängend, grün	40—60 60—80 80—100	1,40 1,70 2,30	10,— 13,50 18,75	90,— 120,— 165,—
H. Alumii (Beiß) schlanke Säule von stahlblauer bis stahlgrauer Farbe	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,70 2,30 2,90 3,75 4,70	13,50 18,75 23,25 30,— 37,50	120,— 165,— 210,— 270,— 338,—
erecta viridis (hort.) schlanker, aufstrebender Wuchs, frischsaftig grün	40—60 60—80 80—100	1,70 2,30 2,90	13,50 18,75 23,25	120,— 165,— 210,—
Fletcheri (Fletcher & Sons) langsamwachsende bläulichgrüne Säulenform, mit aufstrebenden Zweigen	30—40 40—60 60—80 80—100	2,30 2,90 3,75 4,70	18,75 23,25 30,— 37,50	165,— 210,— 270,—
St. forsteckensis (Beiß) flachrunde, grau-grüne Zwergform	15—20 20—25 25—30 30—40 40—50	2,50 3,40 3,75 4,20 5,20	20,— 27,— 30,— 33,75 41,—	
St. minima glauca (Hort), zwergig wachsende, dicht verzweigte Kugeln, mit dunkelgrüner Färbung	15—20 20—25 25—30 30—40	2,50 3,40 3,75 4,20	20,— 27,— 30,— 33,75	
Silver Queen (hort.) locker wachsende Pyramiden mit silberweißer Benadelung	60—80 80—100 100—125	3,75 4,70 6,15		

Chamaecyparis (Spach) Scheinzypresse (Pinaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
	Stewartii (hort.) im Austrieb goldgelb, nachher Bezweigung goldgelb durchsetzt	60—80	3,75		
		80—100	4,70		
		100—125	6,15		
	Triumph von Boskoop (hort.) lockere Pyramiden mit absteigender, blau-grüner Bezweigung	40—60	1,70	13,50	
		60—80	2,30	18,75	
		80—100	2,90	23,25	
		100—125	3,75	30,—	
	nutkaensis (Spach) schlank aufstrebender Wuchs, glänzend-grün, unterseits bläulich, leicht überhängend	60—80	2,90		
		60—80	3,75		
		80—100	4,70		
		100—125	6,15		
		125—150	8,25		
	pendula (Hort) sehr schöne Hängeform, die im Einzelstand sehr schön wirkt	60—80	6,15		
		80—100	8,25		
		100—125	11,25		
		125—150	13,50		
St.	obtusa nana aurea (hort.) zwergartig wachsend mit goldgelber Benadelung	20—25	3,40	27,—	240,—
		25—30	3,75	30,—	270,—
		30—40	4,20	33,75	300,—
		40—50	5,15	49,50	
St.	nana gracillis (hort.) außerordentlich schwachwüchsige Zwergkonifere, sehrzierend	20—25	3,40	27,—	240,—
		25—30	3,75	30,—	270,—
		30—50	4,20	33,75	
		40—50	5,15		
St.	pygmaea (Carr.) zwergartig. Wächst mit zurückgebogenen Zweigen und hellgrüner Belaubung	20—25	3,40	27,—	240,—
		25—30	3,75	30,—	270,—
		30—35	4,20		
		35—40	5,15		
H.R.	pisifera (Sieb u. Zucc) schöne, locker aufgebaute Konifere mit leicht hängenden, weiß gezeichneten Zweigen	40—60	1,40	10,—	90,—
		60—80	1,70	13,50	120,—
		80—100	2,30	18,75	165,—
		100—125	2,90	23,75	210,—
		125—150	3,75	30,—	270,—
	aurea (Carr.) sehr schöne, goldgelbe Varietät	40—60	1,70	13,50	120,—
		60—80	2,30	18,75	165,—
		80—100	2,90	23,25	210,—
R.	filifera (Beiß) Form mit langen fadenförm. überhängenden Trieben	30—40	2,30	18,75	
		40—60	2,90	23,25	
		60—80	3,75	30,—	
		80—100	4,70	37,50	
		100—125	6,15	49,50	
H.R.	plumosa (Beiß) zierliche, federartige, krause, dunkelgrüne Bezweigung, für Binderei viel gebraucht	40—60	1,70	13,50	120,—
		60—80	2,30	18,75	165,—
		80—100	2,90	23,25	210,—
		100—125	3,75	30,—	270,—
		125—150	4,70	37,50	
H.	aurea (Beiß) goldgelbe Form der obigen Sorte, sehr wertvoll für Binderei	40—60	1,70	13,50	120,—
		60—80	2,30	18,75	165,—
		80—100	2,90	23,25	210,—
		100—125	3,75	30,—	270,—
		125—150	4,70	37,50	
	squarrosa (Beißn. et Hochst.) durch Steckling ficierte Jugendform der normalen Pflanze mit silbergrauer Benadelung, beliebte Sorte für Binderei	40—60	1,70	13,50	120,—
		60—80	2,30	18,75	165,—
		80—100	2,90	23,25	210,—
		100—125	3,75	30,—	
		125—150	4,70	37,50	
Ginkgo (L.) Ginkgobaum (Gingkoceae)					
	biloba (L.) (<i>Salisburia adiantifolia</i>) (Sm) laubabwerfende Konifere	60—80	3,75		
		80—100	4,70		
		100—125	6,15		
		125—150	8,25		
		150—175	11,25		

Juniperus (L.) Wacholder (Pinaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
R.Sch.St.	chinensis Pfitzeriana (Späth), als Einzelpflanze von schönster Schmuckwirkung, aufgebundene, ungeschnittene br. Pflanz.	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	2,30 2,90 3,75 4,70 6,15 10,50 12,75	18,75 23,25 30,— 37,50 49,50 82,50 100,—	165,— 210,— 270,— 338,— 450,— 750,— 900,—
St.	natürlich gewachsene liegende Pflanzen..... Breite	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	2,90 3,75 4,70 6,15 8,25 13,50	23,25 30,— 37,50 49,50 67,50	210,— 270,— 338,— 450,—
R.Sch.St	chinensis Pfitzeriana aurea , gelb-bunte Form der J. chin. Pfitzeriana	30—40 40—60 60—80	2,90 3,75 4,70	23,25 30,— 37,50	
	communis (L.) gemeiner Wacholder, buschiger Wuchs, bildet auch Bäume von größerer Höhe	40—60 60—80 80—100	1,70 2,30 2,90	13,50 18,75 23,25	120,— 165,— 210,—
St.	hibernica (Gord) Irischer Wacholder, schlanke Säulen von blau-grüner Farbe	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,70 2,30 2,90 3,75 4,70 6,15	13,50 18,75 23,25 30,— 37,50 49,50	120,— 165,— 210,— 270,— 338,—
St.	suecica (Loud) grüne Form der hibernica, vollkommen winterhart.....	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,70 2,30 2,90 3,75 4,70 6,15	13,50 18,75 23,25 30,— 37,50 49,50	120,— 165,— 210,— 270,— 338,—
St.	horizontalis (Mnch) (J. sab. prostrata) (Loud) (J. prostrata) (Pers) (J. repens) (Nutt) kriechender Wacholder, Breite	20—30 30—40 40—50	2,50 3,40 4,20	20,— 27,— 33,75	
R.St.	sabina femina (Hort) Sadebaum, dunkelgrüner, kriechender Wacholder, geeignet für Steingärten, ... Höhe od. Breite	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80	1,70 2,50 3,40 4,20 5,15	13,50 20,— 27,— 33,75 41,—	120,— 180,— 240,— 300,— 375,—
St.R.	mas. (Hort.) Belaubung nadelförmig, im Wuchs wie femina Breite	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80	1,70 2,50 3,40 4,20 5,15	13,50 20,— 27,— 33,75 41,—	120,— 180,— 240,— 300,— 375,—
St.	procumbens aurea (Beiß) (J. japonica aurea) (Carr) unregelmäßig im Wuchs, Zweige goldgelb	30—40 40—50 50—60 60—70	3,40 4,20 5,15 6,75		
	prostrata siehe unter J. horizontalis				
St	tamariscifolia (Ait.) ein niedriger, sich am Boden ausbreitender Strauch, Bezweigung hellgrün Breite	20—30 30—40 40—50 50—60	2,50 3,40 4,20 5,15	20,— 27,— 33,75 41,—	180,— 240,—
St.	squamata Meyeri (Rehd.), niedriger, aufrechter Strauch mit weißblauer Benadelung	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80 80—100 100—125	1,70 2,50 3,40 4,20 5,15 6,75 8,25	13,50 20,— 27,— 33,75 41,— 54,— 67,50	120,— 180,— 240,— 300,— 375,—
R.	virginiana (L.) breit pyramidal-kroniger Baum mit brauner abblätternder Borke	40—60 60—80 80—100	1,40 1,70 2,30	10,— 13,50 18,75	90,— 120,— 165,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Juniperus (L.) Wacholder (Pinaceae)					
	<i>virginiana glauca</i> (Carr.) kräftig pyramidal im Wuchs, satt blaugrüne Färbung	60—80 80—100 100—125	4,70 6,15 8,25		
St.	<i>horizontalis glauca</i> (Hort) (reptans), eine kriechende, für Steingarten geeignete Art	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80	1,70 2,50 3,40 4,20 5,15		
	<i>tripartita</i> (Beißner) niedrigbleibende Form mit ausgebrei- teten Ästen und feiner, dichter Bezweigung	30—40 40—60 60—80 80—100	2,30 2,90 3,75 4,70	18,75 23,25 30,— 37,50	
Larix (Mill) Lärche (Pinaceae)					
H.R.	<i>europaea</i> (DC) (L. decidua) (Mill) gemeine Lärche, schöner Baum mit geradem Stamm.....	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	1,70 2,30 2,90 3,75 5,10	13,50 18,75 23,25 30,— 40,50	120,— 165,— 210,— 270,—
H.R.	<i>leptolepis</i> (Murr.) (L. Kaempferi) (Sarg) japanische Lärche, schöne blau-grüne Färb., längere Nadeln als L. europaea	100—125 125—150 150—200 200—250 250—300	1,70 2,30 2,90 3,75 5,10	13,50 18,75 23,25 30,— 40,50	120,— 165,— 210,— 270,—
Picea (A. Dict.) Fichte (Pinaceae)					
	<i>albertiana conica</i> (Hort.) (P. glauca conica) (Rehd.) (P. canad. conica) (Fitch), zwergige Form von schmal- kegelförmigem dichten Wuchs mit feinen dichtbenadelten Zweigen	20—30 30—40 40—50 50—60 60—70 70—80	1,70 2,50 3,40 4,20 5,15 6,75	13,50 20,— 27,— 33,75 41,— 54,—	120,— 180,— 240,— 300,—
H.R.	<i>Canadensis</i> (Koehe) (P. alba) (Link) Weißfichte, 15—20 m hoher Baum mit blau-grüner Benadelung	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	0,85 1,40 1,70 2,30 2,90 3,75	6,75 10,— 13,50 18,75 23,25 30,—	60,— 90,— 120,— 165,—
H.R.	<i>excelsa</i> (Link) Fichte, Rottanne, der deutsche Weihnachts- baum	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250	0,85 1,40 1,70 2,30 2,90 3,75 4,70 6,15 8,25	6,75 10,— 13,50 18,75 23,25 30,— 37,50 49,50 67,50	60,— 90,— 120,— 165,— 210,— 270,— 338,— 450,— 600,—
St.	<i>Clambrasiliana</i> (Carr.) kugelig wachsende Zwergform mit ganz kurzer, dichter Bezweigung und glänzend grünen Nadeln	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80	2,50 3,40 4,20 5,15 6,75	20,— 27,— 33,75 41,— 54,—	180,— 240,— 300,—
St.	<i>Marxvelli</i> (Beißn.) Flachkugelig, dichtzweigig, mit hell- grüner Benadelung	20—30 30—40 40—50	2,50 3,40 4,20	20,— 27,— 33,75	180,— 240,— 300,—
St.	<i>pumila glauca</i> (Beißn.) regelmäßig flachrunde Polster bil- dend, bläuliche Benadelung	20—30 30—40 40—50 50—60	2,50 3,40 4,20 5,15	20,— 27,— 33,75 41,—	180,— 240,— 300,—
St.	<i>pygmaea</i> (Carr) dichtbuschig, etwas unregelmäßig wach- sende Zwergform	20—30 30—40 40—50 50—60 60—80	2,50 3,40 4,20 5,15 6,75	20,— 27,— 33,75 41,— 54,—	180,— 240,— 300,—

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
Picea (A. Dict.) Fichte (Pinaceae)					
St.	Remontii (Carr) dichtbuschig, etwas unregelmäßig wachsend	20—30 30—40 40—50 50—60	2,50 3,40 4,20 5,15	20,— 27,— 33,75 11,—	180,— 240,—
H.R.	omorika (Bolle) Serbische Fichte, bis 35 m hoher, schmal pyramidalen Baum mit kurzen, dichten Ästen	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 225—250 250—275 275—300	1,40 1,70 2,30 2,90 3,75 6,15 8,25 10,50 12,75 17,— 21,—	10,— 13,50 18,75 23,25 30,— 49,50 67,50 82,50 100,— 135,— 165,—	90,— 120,— 165,— 210,— 270,— 450,— 600,— 750,— 900,— 1200,— 1500,—
Sch.	orientalis (Carr) Kaukasus- oder Sapindusfichte, 40 m hoher Baum, verträgt sehr gut Schatten, dunkelgrüne Benadelung	40—60 60—80 80—100	2,30 2,90 3,75	18,75 23,25 30,—	
R.	pungens (Engelm.) Stechfichte, steif abstehende Äste, schöne grau-grüne Färbung, vollständig winterhart	60—80 80—100 100—125	2,30 2,90 3,75	18,75 23,25 30,—	165,— 210,— 270,—
	glauca (Beiß) Blaufichte, aus Samen gezogen.....	40—60 60—80 80—100 100—125	3,75 4,70 6,15 8,25	30,— 37,50 49,50 67,50	270,— 338,— 450,— 600,—
	pungens Kosteri (Koster) charakteristisch der streng etagenmäßige Aufbau der Äste, tiefblaue Benadelung	60—80 80—100	8,25 11,25	64,— 90,—	
	Pflanzen für Gruppen geeignet, mit kleinen Fehlern, 40 % billiger	100—125	13,50	110,—	
	Vuyki (hort.), bildet regelmäßig gewachsene Pyramiden mit tiefblauer Färbung	60—80 80—100	8,25 11,25	64,— 90,—	
	sitchensis (Carr) <i>P. sitkaensis</i> (Carr) Sitka-Fichte, anspruchsloser, steil pyramidalen Baum mit harter, stechender Benadelung von bläulicher Farbe	60—80 80—100 100—125 125—150	1,20 1,70 2,30 2,90	10,— 13,50 18,75 23,25	90,— 120,— 165,—
Pinus (L.) Kiefer (Pinaceae)					
R.	cembra (L) Zübelkiefer von schmalem Wuchs, bis 20 m hoch, auch für rauhe Lagen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	2,90 3,75 4,70 6,15 8,25	23,25 30,— 37,50 49,50 67,50	210,— 270,— 338,— 450,—
	excelsa (Wall) (<i>P. nepalensis</i>) (Chambs) Tränenkiefer mit hängenden Nadeln, hoher Baum.....	40—60 60—80 80—100 100—125	2,30 2,90 3,75 4,70	18,75 23,25 30,— 37,50	165,— 210,—
H.R.	montana (Mill) Krummholzkiefer mit niederliegenden Ästen, sehr anspruchslos	30—40 40—60 60—80 80—100	1,70 2,30 3,75 4,70	13,50 18,75 30,— 37,50	120,— 165,— 270,— 338,—
H.R.	mughus (Willk) niedriger als die Stammart, mehr breit als hoch	20—30 30—40 40—50 50—60	1,70 2,50 3,40 4,20	13,50 20,— 27,— 33,75	120,— 180,— 240,— 300,—
St.	pumilio (Willk.) zwergartiger Wuchs, dicht verzweigt mit dichter Benadelung	20—30 30—40	2,50 3,40	20,— 27,—	180,— 240,—
	nigra austriaca (Am. G.) (<i>P. laricio austriaca</i>) (Endl) (<i>P. austriaca</i>) (Höss). Österreichische Schwarzkiefer, bis 30 m hoch, breit, schirmf. Krone, dunkelgrüne Benadelung	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	4,70 6,15 11,25 13,50 21,—	37,50 49,50	
	silvestris (L.) unsere heimische Waldkiefer	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1,70 2,30 2,90 3,75 4,70	13,50 18,75 23,25 30,— 37,50	120,— 165,— 210,— 270,— 338,—
	Wateriana (Hort) dichte, rundlich-kugelförmige Zwergform von stahlblauer Färbung	30—40 40—50 50—60	3,40 4,20 5,15		

		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM	
Pseudotsuga (Carr.) Douglastanne (Pinaceae)						
R.	<i>taxifolia caesia</i> (Brit) (P. Douglasi caesia) (Schwer) graue Form der Stammart, völlig winterhart	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250 250—275	2,90 3,75 4,70 6,15 8,25 10,50 12,75 17,—	23,25 30,— 37,50 49,50 67,50 82,50 100,— 135,—	210,— 270,— 337,50 450,—	
Taxus (L.) Eibe (Taxaceae)						
H	<i>baccata</i> (L.) Für Hecke bestens geeignet, erstklassige Ware, sämtliche Bestände jährlich geschnitten, daher dicht und voll garniert	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,70 2,30 3,75 4,70 6,15 8,25	13,50 18,75 30,— 37,50 49,50 67,50	120,— 165,— 270,— 338,— 450,— 600,—	
	Pyramidenförmig geschnittene Solitärpflanzen 20 % teurer. Breite Büsche, natürlich gewachsen, oft breiter als hoch	40—50 50—60 60—80 80—100 100—125	2,90 3,75 4,70 6,15 12,35	23,25 30,— 37,50 49,50 105,—	210,— 270,— 338,— 450,—	
	<i>aur. variegata</i> (hort.) beständige, goldbunte Form, Höhe oder Breite	30—40 40—60 60—80 80—100	3,75 4,70 6,15 8,25	30,— 37,50 49,50		
	<i>dovastoni</i> (Laws.) flach niederliegend	20—30 30—40 40—50 50—60	2,50 3,40 4,20 5,15			
H.R.	<i>erecta</i> Overeynderl (hort) geschlossener, pyramidenförmiger Wuchs, völlig winterhart, als Heckenpflanze besonders zu empfehlen	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	2,90 3,75 4,70 6,15 8,25	23,25 30,— 37,50 49,50 67,50	210,— 270,— 338,— 450,— 600,—	
	<i>fastigiata</i> (Pilger) (hibernica) (hort) Irische Eibe, wunder bar schlanke Säulenform mit tief dunkelgrünen Nadeln, veredelte Pflanzen	40—60 60—80 80—100 100—125	4,70 6,15 8,25 11,25	37,50 49,50 67,50 90,—	338,— 450,— 600,—	
	<i>aur. var.</i> (hort) sehr wertvolle gelbbunte Säulenform	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	3,75 4,70 6,15 8,25 11,25 13,50	30,— 37,50 49,50 67,50 90,— 110,—	270,— 338,— 450,— 600,—	
	<i>repandens</i> (Pers.), flachwachsende Zwergform	20—30 30—40 40—50 50—60	2,50 3,40 4,20 5,15			
R.St.	<i>cuspidata nana</i> (Rehd) (T. brevifolia) (Nutt) Niedrig blei- bender Busch mit kurzen, dicken Nadeln, vollkommen winterhart	15—20 20—30 30—40 40—50	2,30 2,90 3,75 4,70			
Thuja (L.) Lebensbaum (Pinaceae)						
H.R.	<i>gigantea aurescens</i> (hort) (rig. var. aurea variegata) gold- bunte, völlig harte Form von üppigem Wachstum	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,40 1,70 2,30 2,90 3,75	10,— 13,50 18,75 23,25 30,—	90,— 120,— 165,— 210,— 270,—	
H.R.	<i>occidentalis</i> (L.) Abendländischer Lebensbaum für Hecken und Schutzpflanzung sehr geeignete Konifere, die keine Ansprüche an den Boden stellt, mehrmals verpflanzt, ohne Ballen	30—40 40—60 60—80	0,37 0,40 0,45	3,— 3,40 3,75	22,50 27,— 30,—	195,— 240,— 270,—
	mehrmais geschnittene Pflanzen, voll garniert, Qualitäts- ware, mit Ballen	in cm Höhe 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225	DM 1 St. 0,90 1,10 1,70 2,30 2,90 4,70 6,15 8,25	DM 10 St. 6,75 10,— 13,50 18,75 23,25 37,50 49,50 67,50	DM 100 St. 60,— 90,— 120,— 165,— 210,— 338,— 450,— 600,—	

Thuja (L.) Lebensbaum (Pinaceae)		Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
H.	atrovirens (hort) beste Form für Hecken, glänzend dunkelgrün, sich auch im Winter nicht verfärbend, pyramidale Wuchs	60—80 80—100 100—125	1,70 2,30 2,90	13,50 18,75 23,25	120,— 165,— 210,—
H.	columna (Späth) Säulenlebensbaum, entstanden aus einem Sämling der für alle Zwecke sehr wertvollen Th. fastigiata.	40—60 60—80 80—100 100—125	1,40 1,70 2,30 2,90	10,— 13,50 18,75 23,25	90,— 120,— 165,— 210,—
Unsere Panzen sind aus Stecklingen gezogen, also im Habitus vollkommen gleichmäßig und deshalb bedeutend wertvoller als die oftmals angebotene Sämlingsware					
H.	Ellwangeriana (Beiß) mit moosartiger Bezweigung, dichte Pyramiden bildend	40—60 60—80 80—100	1,40 1,70 2,30	10,— 13,50 18,75	90,— 120,— 165,—
H.	gracilis (hort) Bezweigung wie bei der Stammart, für niedrige Hecken	40—60 60—80 80—100	1,40 1,70 2,30	10,— 13,50 18,75	90,— 120,— 165,—
St.	Rheingold (Vollert) hellgoldgelbe Form, mit moosartiger Belaubung, langsam wachsend	15—20 20—30 30—40	2,50 3,40 4,20	20,— 27,— 33,75	180,— 240,— 300,—
H.R.	fastigiata (Beissn.) (Th. occ. stricta), bildet ohne Schnitt dicht verzweigte Säulen mit schöner, hellgrüner Färbung, die auch im Winter unverändert bleibt. Setzt nur wenig oder keine Saat an. Vollkommen unempfindlich gegen Rauch und Tropfenfall, ohne Frage eine der wertvollsten Thuja-Arten, auch für Hecken sehr zu empfehlen.....	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1,40 1,70 2,30 2,90 3,75 6,15	10,— 13,50 18,75 23,25 30,— 49,50	90,— 120,— 165,— 210,— 270,—
St.	globosa (Beissn.) (Spihlmanni), kugelförmig wachsende Form mit frischgrüner Belaubung	20—30 30—40 40—50 50—60	1,70 2,50 3,40 4,20	13,50 20,25 27,— 33,75	120,— 180,— 240,— 300,—
St	compacta (hort.) regelmäßige Kugeln bildend, auch ohne jeglichen Schnitt, mit dunkelgrüner Belaubung	30—40 40—50	2,50 3,40	20,25 27,—	180,— 240,—
St.	Hoveyi (Veitch), gedrungener, rundlich eiförmiger Wuchs, lichtgrüne Bezweigung	30—40 40—60 60—80	2,30 2,90 3,75	18,75 23,25 30,—	165,— 210,— 270,—
H.St.	recurva nana (hort.), bildet rundliche Kugeln mit übergebogenen oder gedrehten Zweigenspitzen Breite	20—30 30—40 40—50	2,50 3,40 4,20	20,25 27,— 33,75	160,— 240,—
H.	Rosenthalii (Ohlendorf), schmale dichte Säulenform mit dunkelgrüner, gekräuselter Bezweigung, die auch im Winter sich nicht verfärbt, für Grabbeepflanzung vielfach angewandt, außerordentlich unempfindlich. Eine sehr wertvolle Thuja-Art	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	1,40 1,70 2,30 2,90 3,75	10,— 13,50 18,75 23,25 30,—	90,— 120,— 165,— 210,— 270,—
	Vervaeana (Henk u. Hochst) breit pyramidal wachsend, mit lockerer, gelblicher, im Winter goldbronzefarbene Bezweigung	60—80 80—100 100—125	1,70 2,30 2,90	13,50 18,75 23,25	
H.	Wagneriana (Beißn.) (Versmanii) (hort) schmal oval mit dichter, sattgrüner Bezweigung	40—60 60—80 80—100 100—125	1,40 1,70 2,30 2,90	10,— 13,50 18,75 23,25	
	Wareana (Beißn.) von dichtem, gedrungem Wuchs mit grau-grüner Belaubung	60—80 80—100	1,70 2,30	13,50 18,75	
	orientalis nana (Carr) (Biota orient. compacta) (Beißn.), dicht verzweigte Zwergform mit zierlicher, frischgrüner Bezweigung	20—30 30—40 40—50	2,50 3,40 4,20	20,— 27,— 33,75	

Thujaopsis (S. ef Z.) Hibalebensbaum (Pinaceae)

dolabrata (S. et. Z.) bis 15 m hoher Baum mit waagrecht
abstehenden, an den Spitzen überhängenden Zweigen,
breite Pyramiden bildend

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
30—40	2,90	23,25	210,—
40—60	3,75	30,—	270,—
60—80	4,70	37,50	338,—
100—125	6,15	49,50	

Tsuga (Carr.) Hemslocktanne (Pinaceae)

H. **canadensis** (Carr) leicht überhängende Zweige, zierliche
Benadelung

Höhe in cm	1 St. DM	10 St. DM	100 St. DM
30—40	2,30	18,75	
40—60	2,90	23,25	
60—80	3,75	30,—	
80—100	4,70	37,50	
100—125	6,15	49,50	

Junggehölze zur Weiterkultur

Sind bei einer Bestellung die gewünschten Jahrgänge vergriffen, so werden die Pflanzen von anderen Jahrgängen gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist. Höhenmaße sind ungefähr angegeben. Kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht zu vermeiden.

Bei Abnahme unter 50 Stück einer Sorte erhöht sich der Preis um 25 %, jedoch um mindestens DM. 1,— je 100 Stück. Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Die mit einem F bezeichneten Pflanzenarten und Größen sind Forstpflanzen. Für diese gelten die Verkaufs- und Versandbedingungen gemäß § 23 unserer Lieferungsbedingungen.

a) Beerenobst

		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
Brombeeren				
fruticosus	1 jähr. bew. Ausl.	60—100	7,50	60,—
Himbeeren				
Preußen, Deutschland, Lloyd George ...	1 „ Abrisse	50—80	9,—	75,—
Johannisbeeren				
Boskoop, Giant, Goliath, Lee's schwarze Rosenthals Langtraubige, weiße Holländische, weiße Perle, weiße Versailler, rote Holländer, rote Kirsch, Erstling v.				
Vierlanden	1 „ bew. Steckl.	15—40	7,50	60,—
Heros, Fays Prolific	1 „ bew. Steckl.	15—40	9,—	75,—
Ribes arboreum				
Stambildner für Beerenobsthochstämme, 2jähr. Steckl. und 1jähr. bew. Abrisse		120—140 140 cm u. h.	16,50 20,—	150,— 187,50

b) Junge Schlingpflanzen

Ampelopsis

siehe Parthenocissus

Celastrus

orbiculatus	2 „ v. Säml.	30—50 50—80	11,25 13,50	97,50 112,50
-------------------	--------------	----------------	----------------	-----------------

Clematis

vitalba	1 „ „	30—60	3,40	22,50
	2 „ „	60—100	5,25	41,25
	2 „ v. „	60—100	8,60	75,—
Clematis zu Unterlagen	1 „ Säml. ø mm	4—6	7,10	60,—
	1 „ Säml. ø mm	3—4	4,90	37,50
viticella	1 „ „	10—20	7,90	67,50
	2 „ v. „	15—30	10,50	94,—

Lonicera

caprifolia florida	2 „ v. Steckl.	30—60	18,—	
--------------------------	----------------	-------	------	--

Menispermum

canadense	2 „ v. Säm.	15—30 30—50	13,50 18,75	
-----------------	-------------	----------------	----------------	--

Parthenocissus

Engelmanni	1 jähr. bew. Steckl.	30—60	11,60	105,—
quinquefolia	1 „ „	40—70	9,35	82,50
radicantissima	1 „ „	30—60	11,60	105,—

c) Junge Laubgehölze

Wir liefern junge Laubgehölze in Sorten unserer Wahl

1000 Stück in 20—30 Sorten
30—40 SortenHöhe
in cm100 Stück
DM1000 Stück
DM100,—
120,—

Acer

campestre	1	jähr. Sämlinge	10—20	2,60	18,75
	1	" "	20—40	3,40	26,25
	1	" "	40—60	5,60	45,—
	2	" "	60—100	7,10	60,—
	2	" v.	40—65	10,—	90,—
	3	" v.	65—100	12,40	112,50
	3	" v.	100—140	16,50	150,—
dasycarpum siehe saccharum					
ginnala	1	" "	15—30	3,75	26,25
	1	" "	30—60	4,85	37,50
	2	" v.	40—65	8,60	75,—
	3	" v.	65—100	10,—	90,—
negundo	1	" "	20—40	2,90	18,—
	1	" "	40—60	3,40	22,50
	1	" "	60—100	4,85	37,50
	2	" v.	40—65	4,85	37,50
	2	" v.	65—100	6,75	56,25
	2	" v.	100—140	7,90	67,50
palmatum	1	" "	10—20	5,60	45,—
	2	" v.	20—40	9,35	82,50
platanoides	F 1	" "	20—40	3,—	21,—
	F 2	" "	40—60	5,—	40,—
	F 2	" v.	40—65	8,50	75,—
	F 3	" v.	65—100	13,—	110,—
	F 3	" v.	100—140	16,—	140,—
	4	" v.	140—180	25,—	235,—
pseudoplatanus	F 1	" "	20—40	3,—	21,—
	F 2	" "	40—60	5,—	40,—
	F 2	" v.	40—65	8,50	75,—
	F 3	" v.	65—100	13,—	110,—
	F 3	" v.	100—140	16,—	140,—
	4	" v.	140—180	26,—	235,—
saccharinum	1	" "	20—40	4,10	30,—
	1	" "	40—60	5,60	45,—
	2	" v.	40—65	8,60	75,—
	3	" v.	65—100	10,—	90,—
	3	" v.	100—140	13,10	120,—

Aesculus

hippocastanum	1	" "	10—20	4,10	30,—
	2	" "	20—40	5,60	45,—
	2	" "	40—60	7,10	60,—
	3	" v.	20—40	7,10	60,—
	4	" v.	40—65	10,—	90,—
	4	" v.	65—100	16,50	150,—

Ailanthus

glandulosa	1	" "	20—40	3,40	22,50
	1	" "	40—60	4,50	34,—
	2	" v.	50—80	7,50	63,75
	2	" "	80—100	9,40	82,50

Alnus

glutinosa	F 1	" "	15—25	2,50	17,—
	F 2	" v.	40—65	7,—	59,—
	F 3	" v.	65—100	10,—	85,—
	F 3	" v.	100—140	12,—	100,—
	F 3	" v.	140—180	20,—	180,—
incana	F 1	" "	15—25	3,—	20,—
	F 2	" v.	40—65	7,50	65,—
	F 3	" v.	65—100	10,—	90,—
	F 3	" v.	100—140	14,—	110,—
	F 3	" v.	140—180	22,—	200,—

Amelanchier

botryapium	1	" "	8—15	5,25	41,—
	1	" "	15—25	7,10	60,—
	3	" v.	30—50	12,—	100,—
	3	" "	50—80	13,10	120,—

Amorpha

		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
<i>fruticosa</i>	1 jähr. Sämlinge	25—50	3,40	22,50
	2 " v. "	40—65	6,—	49,—
	3 " v. "	65—100	7,—	64,—
	3 " " "	100—140	9,35	82,50

Azalea

<i>mollis</i>	2 jähr. Sämlinge		8,25	71,—
	3 " v. "	10—15	16,50	150,—
	4 " v. "	15—25	22,75	225,—
<i>pontica</i>	2 " v. "		8,25	71,—
	3 " v. "	10—15	16,50	150,—
	4 " v. "	15—25	22,75	225,—

Berberis

<i>buxifolia nana</i>	2 " v. Steckl.	8—15	9,35	82,50
<i>candidula</i>	2 " v. " m. Tb.		60,—	
<i>Hookeri</i>	2 " v. " m. Tb.		60,—	
<i>stenophylla</i>	2 " v. " m. Tb.	10—20	60,—	
<i>Thunbergii</i>	1 " Sämlinge	8—15	4,10	30,—
	2 " v. "	15—30	5,60	45,—
	3 " v. "	15—30	9,35	82,50
	3 " v. "	30—50	13,10	120,—
" <i>atropurpurea</i>	1 " v. "	8—12	4,10	30,—
	2 " v. "	15—30	5,60	45,—
	3 " v. "	15—30	9,35	82,50
	3 " v. "	30—50	13,10	120,—
<i>verruculosa</i>	2 " v. Steckl. m. Tb.	8—12	60,—	
<i>Wilsoni</i>	2 " v. Säml.	10—20	13,50	120,—
	2 " v. " m. Tb.		22,50	200,—
	3 " v. "	20—40	19,—	170,—

Betula

<i>pubescens</i> u. <i>verrucosa</i>	F 1 " Sämlinge	7—15	2,50	15,—
	F 1 " "	15—25	3,—	22,—
	F 2 " "	25—50	4,50	35,—
	F 2 " "	50—80	6,50	55,—
	F 2 " v. "	40—65	8,—	70,—
	F 2 " v. "	65—100	12,—	100,—
	F 3 " v. "	100—140	14,—	125,—

Buddleja

<i>Davidii</i>	1 " v. "	30—50	4,10	30,—
	1 " v. "	30—50	7,85	64,—
	1 " v. "	50—80	10,50	94,—
" <i>Ile de France</i>	2 " v. Steckl.	20—40	49,—	

Buxus

<i>sempervirens arborescens</i>	2 " v. Steckl.	5—10	7,10	60,—
	3 " v. "	10—15	10,—	90,—
	4 " v. "	12—20	13,50	120,—

Calluna

<i>vulgaris alba</i>	2 " v. Steckl.			
" <i>Alporti</i>	2 " v. "		15,—	135,—
" <i>aurea</i>	2 " v. "			
" <i>fl. pl.</i>	2 " v. "			
" <i>Hammondi</i>	2 " v. "			

Caragana

<i>arborescens</i>	1 jähr. Sämlinge	10—20	3,75	24,75
	1 " v. "	20—40	4,50	33,75
	2 " v. "	40—65	5,60	45,—
	2 " v. "	65—100	8,60	75,—
	3 " v. "	100—140	11,25	100,—

Carpinus

<i>betulus</i>	F 1 " Sämlinge	10—20	2,50	16,—
	F 1 " "	20—40	3,50	23,—
	F 2 " "	20—40	3,70	25,—
	F 2 " "	40—60	5,—	40,—
" <i>buschige Pflanzen aus halbweitem Stand verpfl.</i>		40—60	11,25	97,50
		60—80	16,50	150,—
		80—100	20,50	187,50
		100—125	27,—	250,—

		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
Chaenomeles				
japonica	1 jähr. Sämlinge	15—30	3,75	24,75
	2 " v. "	25—50	9,35	82,50
	3 " v. "	40—70	10,50	94,—
Colutea				
arborescens	1 jähr. Sämlinge	30—50	5,60	45,—
	1 " "	50—100	7,10	60,—
Cornus				
alba	1 " "	20—40	4,10	30,—
	1 " "	40—60	6,—	48,75
	2 " v. "	40—65	7,50	63,75
	3 " v. "	65—100	9,35	82,50
" elegans	2 " v. Steckl.	25—50	22,50	
" flaviramea	2 " v. "	20—40	13,50	
" sibirica (C. lat. sibirica)	2 " v. "	25—50	22,50	
" Späthi	2 " v. "	25—50	22,50	
amomum	1 " Sämlinge	15—30	4,50	33,75
	2 " v. "	30—50	7,10	60,—
Kesselringii	1 " bew. Ableger	30—60	20,—	
mas.	1 " Sämlinge	10—20	11,60	105,—
	1 " "	20—40	14,25	131,—
	2 " v. "	15—30	23,25	210,—
	3 " v. "	30—50	26,25	225,—
	3 " v. "	50—80	33,75	300,—
" buschige Pflanzen aus halbweitem Stand		40—60	33,75	300,—
		60—80	41,25	375,—
sanguinea	1 " "	20—40	4,10	30,—
	2 " v. "	40—65	7,50	63,75
Corylus				
avellana in besten großfr. Sorten	2 " Ableger	60—120	67,50	
"	1 " Sämlinge	10—20	8,25	71,25
	1 " "	20—40	10,—	90,—
	1 " "	40—60	12,35	112,50
	2 " v. "	40—65	15,—	135,—
	3 " v. "	65—100	18,—	165,—
" atropurpurea	2 " v. Ableger	40—60	82,50	
Cotoneaster				
acutifolia	1 " Sämlinge	10—20	5,60	45,—
	2 " v. "	30—50	7,10	60,—
adpressa	2 " v. Steckl.		30,—	
	2 " v. " m. Tb.		41,25	
bullata	1 " Sämlinge	10—20	5,60	45,—
	2 " v. "	30—50	11,60	105,—
Dammeri	2 " v. Steckl.	8—15	30,—	
	2 " v. " m. Tb.		41,25	
Dielsiana (C. applanata)	1 " Sämlinge	10—20	5,60	45,—
	1 " "	20—40	7,10	60,—
	2 " v. "	30—50	11,60	105,—
divaricata	1 " "	10—20	5,60	45,—
	1 " "	20—40	7,10	60,—
	2 " v. "	30—50	11,60	105,—
Franchetti	1 " Sämlinge	10—20	13,50	120,—
	2 " v. Steckl.	20—40	23,85	180,—
horizontalis	1 jähr. Sämlinge		5,60	45,—
	2 " v. St. u. Säml.	10—15	8,60	75,—
	3 " v. St. u. Säml.	15—25	16,50	150,—
	2 " v. " m. Tb.		22,75	225,—
humifusa siehe C. Dammeri				
microphylla	2 " v. Säml. m. Tb.		37,50	
moupinensis	1 " Sämlinge	10—20	5,60	45,—
	2 " v. "	30—50	11,60	105,—
	3 " v. "	50—80	18,35	161,—
praecox	1 " "	5—10	5,60	45,—
	2 " v. Steckl.	10—15	8,60	75,—
	3 " v. " m. Tb.		22,75	225,—
prostata	2 " v. "	15—30	16,50	150,—
	3 " v. "	10—15	8,60	75,—
salicifolia floccosa	2 " v. "	15—25	16,50	150,—
	3 " v. "	8—15	22,50	200,—
Simonsii	2 " v. " m. Tb.		37,50	
	1 " Sämlinge	8—15	5,60	45,—
	2 " v. "	15—30	9,35	82,50
	3 " v. "	30—50	11,60	105,—

			Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
Crataegus					
monogyna	1	jähr. Sämlinge	15—30	2,30	14,—
	1	" "	30—60	3,—	21,—
	2	" "	40—60	5,—	40,—
	2	" "	60—90	7,50	55,—
	2	" v. "	40—60	7,50	55,—
	3	" v. "	60—90	9,50	80,—
	4	" v. "	60—100	12,—	110,—
Veredelungsunterlagen	2	" v. " ø mm	7—8	13,50	120,—
	2	" v. " ø mm	8—10	14,50	127,—
pyracantha siehe Pyracantha coccinea					
Cydonia					
siehe Chaenomeles					
Cytisus					
praecox	2	" v. Steckl.	15—30	22,50	200,—
	2	" v. " m. Tb.		45,—	
scoparius	1	" Sämlinge	30—60	3,40	
Daphne					
Mezereum	1	" "	8—15	15,—	
	2	" v. "	10—20	22,50	
Deutzia					
scabra plena, Fortunei, hybrida, Watereri, magnifica, Pride of Rochester, rosea plena, Welsi und andere.....	1—2	jähr. bew. Steckl.	30—60	11,25	100,—
gracilis	2	" v. "	10—25		
" multiflora	2	" v. "	10—25		
" rosea	2	" v. "	10—25		
venusta	2	" v. "	10—25		
Limonei	2	" v. "	10—25		
" Avalanche	2	" v. "	10—25		
" Boule de Neige	2	" v. "	10—25		
" Compacta	2	" v. "	10—25		
Diervillea					
amabilis, candidissima, Verschaffelti usw.	2	" v. Steckl.	20—40	15,—	135,—
Eva Rathke	2	" v. "	15—30	19,85	180,—
Elsholtzia					
Stauntonii	1	" v. Sämlinge	20—40	6,—	52,50
Erica					
carnea	2	" v. Steckl.	}	13,—	120,—
herbacea Vivelli	2	" v. "			
" rubra	2	" v. "			
" Winter Beauty.....	2	" v. "			
mediterranea	2	" v. "			
vulgaris siehe Calluna vulgaris					
Evonymus					
europaea	1	" Sämlinge	8—15	5,25	41,25
	1	" "	15—30	6,75	56,25
	1	" "	30—60	7,50	63,75
	2	" v. "	30—50	10,50	94,—
	2	" v. "	50—80	14,25	131,—
nana Koopmanna	2	" v. Steckl. m. Tb.	20—40	16,50	
radicans	2	" v. " "	10—20	16,50	
" fol. arg. var.	2	" v. " "	8—15	16,50	
" minima	2	" v. " "		19,—	
" vegeta	2	" v. " "	8—15	26,—	
Fagus					
sylvatica	F 1	" Sämlinge	7—15	2,50	16,50
	F 1	" "	15—30	4,—	28,50
für Heckenpflanzen gezogen	3	" v. "	40—60	11,60	105,—
	3	" v. "	60—80	18,75	165,—
	4	" v. "	80—120	22,50	200,—

			Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
Forsythia					
intermedia	2	" v. Steckl.	20—40	11,25	100,—
spectabilis	2	" v. "	20—40	11,25	100,—
" vitellina	2	" v. "	20—40	11,25	100,—
suspensa	2	" v. "	25—50	19,85	180,—
" Fortunei	2	" v. "	25—50	19,85	180,—
viridissima	2	" v. "	25—50	11,25	100,—
Fraxinus					
excelsior	F 1	" Sämlinge	10—20	2,50	16,50
	F 2	" "	40—60	4,50	33,—
	F 3	" v. "	40—65	8,50	72,—
	F 3	" v. "	65—100	13,—	108,—
	4	" v. "	100—140	15,—	130,—
	4	" v. "	140—180	17,—	150,—
ornus	2	" v. "	20—40	7,50	67,50
	3	" v. "	40—65	10,—	82,50
Genista					
scoparia siehe Cytisus scoparia					
tinctoria	1	" "	25—50	4,10	30,—
	1	" "	50—80	5,60	45,—
Hippophae					
ramnoides	1	" "	10—20	4,10	30,—
	1	" "	20—40	5,60	45,—
Holodiscus					
discolor ariaefolius (Spirea ariaefolia)	1	" "	20—40	6,—	48,75
	2	" v. "	30—50	11,25	100,—
Hydrangea					
paniculata grdf.	2	" v. Steckl.	15—30	13,—	120,—
arborescens grdf.	2	" v. "	15—30	11,25	
Ilex					
aquifolia	1	" Sämlinge		7,50	63,75
	2	" "		11,25	100,—
	2	" v. " m. Tb.		18,75	169,—
	3	" v. "	12—30	19,85	180,—
Jasminum nudiflorum					
	2	" v. Steckl.	20—40	22,50	
Kerria					
japonica	2	" v. "	20—40	14,25	131,25
" flore pleno	2	" v. "	20—40	20,—	
Laburnum					
alpinum	1	" Sämlinge	15—30	6,—	48,75
	1	" "	30—60	8,60	75,—
	2	" v. "	40—65	13,50	120,—
	2	" v. "	65—100	16,50	150,—
vulgare	1	" "	15—30	4,50	33,75
	1	" "	30—60	6,—	48,75
	2	" v. "	40—65	9,75	86,25
	3	" v. "	65—100	11,25	100,—
	3	" v. "	100—140	13,50	120,—
Lavendula					
officinalis	2	" v. "	10—15	13,50	120,—
Ligustrum					
Lodense	1	" bew. Steckl.	10—25	5,60	45,—
ovalifolium	1	" "	30—50	3,60	22,50
	2	" "	15—30	5,60	45,—
	2	" "	50—80	7,10	60,—
vulgare	1	" "	15—30	3,60	22,50
	2	" "	30—50	5,60	45,—
	2	" "	50—80	7,10	60,—
" atrovirens	1	" "	10—20	4,10	30,—
	2	" "	30—50	7,10	60,—
	2	" "	50—80	8,60	75,—

Lonicera

			Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
alpigena	3	" v. Säml.	12—20	14,25	131,25
amoena alba	1	" bew. Steckl.	30—70	11,25	100,—
coerulea	2	" Sämlinge	15—30	6,75	56,25
	2	" "	25—50	7,50	63,75
	3	" "	30—50	10,50	94,—
Morowii	1	" bew. Steckl.	30—70	11,25	100,—
tatarica	1	" "	30—70	11,25	100,—
" alba	1	" "	30—70	11,25	100,—
xylosteum	2	" v. Sämlinge	25—50	6,—	48,75
	3	" v. Säml.	30—50	11,25	100,—
	3	" "	50—80	14,25	131,25
yunnanensis	2	" v. Steckl.	10—20	11,25	100,—

Lycium

europaeum	1	" "	65—100	13,50	120,—
-----------------	---	-----	--------	-------	-------

Mahonia

aquifolium	1	" Sämlinge		2,60	15,—
	2	" v. "	12—25	8,25	71,25
	3	" v. "	15—30	10,—	90,—
	4	" v. "	20—40	16,85	150,—
	4	" v. "	25—50	20,50	187,50

Malus

Arnoldiana, Eleyi, Fairy Hogg, floribunda, florib. atrosanguinea, florib. purpurea, fructu maximo, Gelber Kirsch, Hyslop, Kaido, John Downing, Niedzwetziana, Ringo, fastigiata, Scheideckeri, spectabilis, fl. pl., Transcendent

1	" Veredl.	40—80	45,—	
---	-----------	-------	------	--

Morus

alba	1	" Sämlinge	15—30	3,—	20,—
	1	" "	30—50	3,75	26,—
	2	" v. "	20—40	4,10	30,—
	2	" v. "	40—60	5,25	45,—
	2	" v. "	60—80	7,10	60,—

Phellodendron amurense

2	" v. "	10—20	13,50	120,—
---	--------	-------	-------	-------

Philadelphus

a) hochwachsende Sorten:

coronarius	1	" bew. Steckl.	40—70	11,25	100,—
inodorus grandiflorus	1	" "	40—70	11,25	100,—
pubescens	1	" "	40—70	11,25	100,—

b) mittelhohe Sorten:

Lemoinei Virginal	2	" v. "	15—40	15,—	135,—
-------------------------	---	--------	-------	------	-------

c) niedrigbleibende Sorten:

coronarius aureus	2	" v. "	15—30	11,25	100,—
Lemoinei Avalanche	2	" v. "	15—30	11,25	100,—
" Bouquet blanc	2	" v. "	15—30	11,25	100,—
" erectus	2	" v. "	20—40	11,25	100,—
" Dame blanche	2	" v. "	25—50	11,25	100,—
" Girandole	2	" v. "	15—30	15,—	135,—
" Manteau d'Hermine	2	" v. "	15—30	11,25	100,—

Physocarpus

opulifolius (Spirea opulifolia)	1	" Sämlinge	15—30	3,75	26,25
" lutea (Sp. op. lutea)	1	" bew. Steckl.	40—60	10,—	90,—
	1	" "	40—60	11,25	100,—

Populus

alba nivea	1	" "	40—65	9,—	75,—
	1	" "	65—100	12,—	105,—
	1	" "	100—140	15,—	135,—
balsamifera	1	" "	65—100	12,—	105,—
	1	" "	100—140	15,—	135,—

Populus

			Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
berolinensis	1	jähr. bew. Steckl.	65—100	9,—	82,50
	1	" "	100—140	12,—	105,—
canadensis	F 2	" "	40—65	7,50	60,—
	F 2	" "	65—100	10,—	80,—
	F 2	" "	100—140	14,—	120,—
nigra	F 2	" "	40—65	7,50	60,—
	F 2	" "	65—100	10,—	80,—
	F 2	" "	100—140	14,—	120,—
" pyramidalis (P. nigra fastigiata) ..	1	" "	40—65	7,10	60,—
	1	" "	65—100	9,—	82,50
Simonii	1	" "	65—100	9,—	82,50
	1	" "	100—140	12,—	105,—
" fastigiata	1	" "	65—100	9,—	82,50
	1	" "	100—140	12,—	105,—

Potentilla

Farreri	2	" v. Steckl.	10—20	10,—	90,—
Friedrichseni	1	" Sämlinge	15—30	4,50	36,—
	2	" v. "	25—40	6,—	45,—
fruticosa	1	" "	15—30	4,50	33,75
	2	" v. "	25—40	5,60	45,—
parvifolia	2	" v. Steckl.	15—30	10,—	90,—
Purdomii	2	" v. "	15—30	10,—	90,—

Prunus

cerasifera (Pr. myrobalana)					
laurocerasus caucasia	2	" v. "	10—20	20,—	
	3	" v. "	20—40	30,—	
" Schipkaensis	2	" v. "	12—20	20,—	
mahaleb	2	" v. Säml.	60—100	6,—	48,75
Padus	1	" Sämlinge	15—30	5,25	41,25
	1	" "	30—60	7,10	60,—
	2	" v. "	40—65	9,35	82,50
	3	" v. "	65—100	11,60	105,—
	3	" v. "	100—140	17,60	200,—
serotina	F 1	" "	20—40	3,50	24,—
	F 1	" "	40—60	4,50	35,—
	F 2	" v. "	40—65	7,50	64,—
	F 2	" v. "	65—100	10,—	88,—
	F 3	" v. "	100—140	14,—	126,—
serrulata Hisakura	1	" Veredl.	30—50	49,—	
" Shidare Sakura	1	" "	30—50	49,—	
spinosa	1	" Sämlinge	15—30	4,50	33,75
	1	" "	30—50	5,60	45,—
	1	" "	50—80	8,60	75,—
	2	" v. "	40—65	8,60	75,—
	2	" v. "	65—100	10,85	90,—
virginiana	1	" "	20—40	4,50	33,75
	1	" "	40—60	5,60	45,—
	2	" v. "	40—65	9,35	82,50
	2	" v. "	65—100	11,20	100,—

Ptelea trifoliata

	1	" "	20—40	4,50	33,75
	2	" v. "	40—65	7,10	60,—

Pyracantha

coccinea	1	" "	8—16	7,10	60,—
	1	" "	15—30	9,35	82,50
	2	" v. "	20—40	14,—	130,—
Lalandi	2	" v. " m. Tb.	10—25	33,75	

Quercus

palustris	1	" "	10—20	6,—	
	3	" v. "	30—50	9,50	
	3	" v. "	50—80	11,25	
	4	" v. "	80—120	14,—	
pedunculata (Qu. robur)	F 1	" "	7—15	1,60	11,—
	F 2	" "	15—30	3,75	28,—
	F 3	" v. "	30—50	11,—	95,—
	F 3	" v. "	50—80	15,—	135,—
	F 4	" v. "	80—100	19,—	170,—

		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
Quercus				
rubra	F 1 jähr. Sämlinge	15—30	4,50	38,—
	F 3 " v. "	30—50	14,—	115,—
	F 3 " v. "	50—80	19,—	165,—
sessilis	F 2 " "	15—30	7,—	60,—
	F 3 " v. "	30—50	15,—	135,—
	F 3 " v. "	50—80	20,—	180,—
	F 4 " v. "	80—100	25,—	225,—
Rhamnus				
cathartica	1 " "	15—30	6,—	48,75
	2 " v. "	40—65	8,25	71,25
	3 " v. "	65—100	10,50	94,—
	3 " v. "	100—140	12,75	116,25
frangula	1 " "	15—30	6,—	48,75
	2 " v. "	65—100	8,25	71,25
	2 " v. "	100—140	10,50	94,—
	3 " v. "	10—20	12,75	116,25
Rhododendron				
Hybriden aus Samen gezogen	2 " "		7,10	60,—
	3 " v. "		19,85	180,—
	4 " v. "	15—25	30,—	270,—
Rhodotypus				
Kerrioides	1 " "	20—40	6,75	56,25
	3 " v. "	40—70	15,25	131,25
Ribes				
alpinum	2 " v. Abrisse	15—30	18,—	165,—
aureum	1 " bew. Steckl.	50—80	7,10	60,—
divaricatum (R. arboreum)	1 " "	50—70	7,90	67,50
floridum	1 " "	30—60	11,25	100,—
Gordonianum	1 " "	30—60	11,25	100,—
sanguineum	1 " "	30—60	11,25	100,—
" atrorubens	1 " "	30—60	11,25	100,—
Robinia				
pseudoacacia	F 1 " Sämlinge	30—50	4,50	30,—
	F 1 " "	50—80	6,—	45,—
	F 2 " v. "	65—100	10,—	85,—
	F 2 " v. "	100—140	15,—	125,—
	F 3 " v. "	140—180	18,—	155,—
Rosa				
canina	1 " "	25—50	6,—	45,—
	1 " "	40—60	7,10	60,—
	2 " v. "	25—50	9,—	75,—
lucida (virginiana)	2 " v. "	40—60	10,—	90,—
	3 " v. "	60—100	12,75	116,25
multiflora	1 " "	25—50	7,10	60,—
rubiginosa	1 " "	25—50	6,—	48,75
	2 " v. "	30—50	7,50	60,—
	2 " v. "	50—80	9,—	75,—
rubrifolia	2 " v. "	25—50	9,—	75,—
rugosa	1 " "	7—15	3,35	22,50
	1 " "	15—30	4,10	30,—
	2 " v. "	20—40	5,40	52,50
	2 " v. "	40—65	10,50	94,—
" hollandica	1 " bew. Steckl.	40—70	7,50	60,—
Rubus				
fruticosus	1 " Sämlinge	15—30	7,50	63,75
	1 " v. "		9,35	82,50
	2 " v. "	30—60	11,60	105,—
odoratus	2 " v. Säml.	30—60	10,50	
phoeniculus	2 " v. "	30—60	22,50	

Salix

		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
Britzensis, elegantissima, latifolia glabra, nigricans, pontederana, repens argentea, rotundifolia, Scharfenbergensis,				
„ viminalis	1 jähr. bew. Steckl.	65—100	7,10	60,—
alba argentea	1 „ „	65—100	7,10	60,—
„ vitellina pendula nova	1 „ „	65—100	11,25	100,—
caprea	1 „ „	60—120	22,50	
„ mas.	1 „ Veredl.	60—120	45,—	
Pulchra ruberima	1 „ bew. Steckl.	65—100	7,10	60,—
Smithiana ..	1 „ „	65—100	7,10	60,—

Sambucus

nigra	1 „ Sämlinge	15—30	4,10	30,—
	1 „ „	30—50	6,—	48,75
	1 „ „	50—80	8,60	75,—
	1 „ bew. Steckl.	40—80	11,25	100,—
	2 „ v. Säml.	40—65	11,25	100,—
	2 „ v. „	65—100	13,50	120,—
racemosa	1 „ „	30—50	6,—	48,75
	1 „ „	50—80	8,60	75,—
	2 „ v. „	40—65	11,25	100,—
	2 „ v. „	65—100	13,50	120,—

Sorbia

sorbifolia (Spirea sorbifolia)	1 „ Sämlinge	10—20	4,50	34,—
	2 „ v. „	40—60	9,75	81,—
	3 „ v. „	60—100	11,25	100,—

Sorbus

aucuparia	F 1 „ „	10—20	3,—	19,—
	F 1 „ „	20—40	4,—	29,—
	F 2 „ v. „	40—65	7,—	55,—
	F 3 „ v. „	65—100	10,—	79,—
	F 3 „ v. „	100—140	13,—	110,—
	4 „ v. „	140—180	30,—	270,—
suecica (S. scandica)	F 1 „ „	5—10	3,50	21,—
	F 1 „ „	10—20	4,50	30,—
	F 2 „ v. „	20—40	8,—	60,—
	F 3 „ v. „	40—65	10,—	82,—
	F 3 „ v. „	65—100	15,—	119,—
	F 4 „ v. „	100—140	18,—	165,—

Spiraea

albiflora	2 „ v. Steckl.	15—25	12,40	112,50
arguta	2 „ v. „	15—30	16,50	150,—
arifolia siehe Holodiscus discolor				
bullata	2 „ v. „	15—25	12,40	112,50
Douglasii	1 „ bew. Steckl.	30—50	9,35	82,50
fontanaisy alba	1 „ „	40—70	9,35	82,50
Fröebeli siehe Sp. pumila Fröebeli				
hypericifolia thalictroides	2 „ v. „	20—40	10,50	94,—
Menziesi triumphans	1 „ bew. Steckl.	30—50	9,35	82,50
opulifolia siehe Physocarpus				
pumila Bumalda Anthony Waterer	2 „ v. „	15—25	12,40	112,50
„ Fröebeli	2 „ v. „	20—40	10,50	94,—
sorbifolia siehe Sorbaria sorbifolia				
Thunbergii	2 „ v. „	15—30	16,50	150,—
Van Houttei	2 „ v. „	25—50	12,40	112,50
	3 „ v. „	40—70	14,25	131,25

Symphoricarpus

orbiculatus	1 „ bew. Steckl.	30—60	11,25	100,—
„ aurei variegatus	1 „ „	20—40	13,50	
racemosus	1 „ Sämlinge	15—30	4,50	33,75
		30—50	6,75	56,25
	2 „ v. „	30—50	10,—	90,—
	2 „ v. „	50—80	14,25	131,25

Syringa

			Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
chinensis (S. rothomagensis)	1	Veredl.	20—40	49,—	
vulgaris	2	v. Säml.	20—40	5,60	45,—
	2	v. "	40—60	7,10	60,—
	3	v. "	60—100	13,50	120,—
Veredlungsunterlagen	3	v. " ø mm	7—8	9,—	78,25
	3	v. " ø mm	8—10	12,40	112,50
	3	v. " ø mm	10—12	15,—	139,—

Tamarix

Odessanum	1	bew. Steckl.	30—50	8,60	75,—
tetrandra - purpurea	1	"	30—50	8,60	75,—

Teucrium

chamaedris	2	v. Steckl.		10,50	93,75
------------------	---	------------	--	-------	-------

Tilia

grandifolia	1	Sämlinge	10—20	6,—	52,—
	3	v. "	30—50	14,25	114,—
	3	v. "	50—80	18,—	150,—
	3	v. "	80—100	22,50	210,—
parvifolia	F 1	"	5—10	4,50	31,—
	F 1	"	10—20	6,—	50,—
	F 2	v. "	30—50	14,—	125,—
	F 3	v. "	50—80	19,—	170,—
	4	v. "	80—125	22,50	210,—

Ulmus

campestris	F 1	"	10—20	3,50	21,—
	F 2	v. "	40—65	10,—	85,—
	F 2	v. "	65—100	14,—	114,—
	3	v. "	100—140	15,—	135,—
scabra (U. montana)	F 1	"	10—20	3,50	21,—
	F 2	v. "	40—65	10,—	85,—
	F 2	v. "	65—100	14,—	114,—
	3	v. "	100—140	15,—	135,—

Viburnum

lantana	1	"	5—10	5,25	41,25
	2	"	15—30	7,10	60,—
	2	"	30—50	8,60	75,—
	3	v. "	30—50	10,50	94,—
	3	v. "	50—80	13,50	120,—
opulus	1	"	5—10	5,25	41,25
	2	"	20—40	8,60	75,—
	3	v. "	30—50	11,60	115,—
opulus sterile	2	v. Ableger	15—30	16,50	150,—
	3	"	30—50	18,75	168,75

Weigelia

siehe Diervillea

d) Junge Nadelhölzer (Koniferen)**Abies**

alba (A. pectinata)	F 2	jähr. Sämlinge		3,50	22,—
	F 3	" v. "	8—15	5,50	45,—
	F 4	" v. "	12—25	7,50	65,—
concolor	2	v. "	6—10	11,25	
	3	v. "	10—15	18,75	
grandis	2	"	7—15	11,25	
	3	v. "	15—25	18,75	
Nordmanniana	2	"	6—10	11,25	
	3	v. "	8—15	18,75	
pectinata siehe A. alba					
Veitchii	2	"		11,25	
	3	v. "		18,75	

Cedrus

atlantica	1	"		12,—	
deodara	1	"		12,—	
Libanii	1	"		12,—	

Chamaecyparis

		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
<i>Lawsoniana</i>	2 jähr. Sämlinge		3,40	22,50
	3 " v. "	15—30	7,10	60,—
	4 " v. "	30—60	8,60	75,—
Veredelungsunterlagen, 4-6 mm ø 6-8 mm ø	3 " v.		15,—	135,—
	3 " v.		18,—	148,—
" <i>Alumii</i>	2 " v. Steckl.	12—25	19,85	180,—
	3 " v. "	20—30	24,75	225,—
	4 " v. "	30—40	33,75	300,—
" <i>Fletcheri</i>	2 " v. "	10—20	19,85	180,—
	3 " v. "	15—30	24,75	225,—
<i>pisifera</i>	2 " v. "	12—20	19,85	180,—
	3 " v. "	15—25	24,75	225,—
" <i>aurea</i>	2 " v. "	15—30	19,85	180,—
	3 " v. "	20—40	24,75	225,—
" <i>filifera</i>	2 " v. "	12—20	22,50	200,—
	3 " v. "	20—30	30,—	270,—
" <i>plumosa</i>	2 " v. "	12—20	19,85	180,—
	3 " v. "	15—30	24,75	225,—
	4 " v. "	20—40	33,75	300,—
	2 x verpflanz	20—30	45,—	
" " <i>aurea</i>	2 " v. "	12—20	19,85	180,—
	3 " v. "	15—25	24,75	225,—
	2 x verpflanz	20—30	45,—	
" " <i>squarrosa</i>	2 " v. "	12—20	19,85	180,—
	3 " v. "	15—30	24,75	225,—
	2 x verpflanz	20—30	45,—	

Juniperus

<i>chinensis</i> Pfitzeriana	2 " v. "	10—20	24,75	225,—
	3 " v. "	15—25	33,75	300,—
mit Topfballen	2 " v. "	10—20	41,25	375,—
mit Topfballen	3 " v. "	15—25	49,50	450,—
<i>communis</i>	1 " Sämlinge		5,25	41,25
	2 " v. "	8—15	9,40	82,50
	3 " v. "	20—40	14,25	131,25
" <i>hibernica</i>	2 " v. Steckl.	10—20	19,85	180,—
	3 " v. "	15—30	24,75	225,—
mit Topfballen	2 " v. "		37,50	
mit Topfballen	3 " v. "	12—25	60,—	
<i>communis hibernica suecica</i>	2 " v. "	10—20	19,85	180,—
	3 " v. "	15—30	24,75	225,—
mit Topfballen	2 " v. "	10—20	37,50	
mit Topfballen	3 " v. "	15—30	45,—	
<i>horizontalis</i> (J. <i>prostrata</i>)	2 " v. "	8—15	19,85	180,—
	3 " v. "	10—20	24,75	225,—
mit Topfballen	3 " v. "	12—20	41,25	
mit Topfballen	4 " v. "	15—30	48,75	
<i>sabina femina</i>	2 " v. "	8—15	24,75	225,—
	3 " v. "	15—25	33,75	300,—
mit Topfballen	2 " v. "	8—12	41,25	
mit Topfballen	3 " v. "	15—20	49,50	
" <i>mas.</i>	2 " v. "	8—15	24,75	225,—
	3 " v. "	15—30	33,75	300,—
mit Topfballen	2 " v. "	8—15	41,25	
mit Topfballen	3 " v. "	15—20	49,50	
" <i>tamariscifolia</i> echt	2 " v. "	5—10	33,75	300,—
	3 " v. "	8—15	49,50	450,—
<i>squamata</i> Meyeri	2 " v. "	8—12	24,75	225,—
	3 " v. "	10—15	33,75	300,—
mit Topfballen	2 " v. "	8—12	41,25	
mit Topfballen	3 " v. "	12—20	49,50	
<i>virginiana</i>	2 " Sämlinge	15—30	6,—	48,75
	2 " v. "	15—30	9,40	82,50
	3 " v. "	20—40	14,25	131,25

Larix			Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
europaea	F 1	jähr. Sämlinge	10—25	4,—	26,—
	F 2	" "	20—40	5,—	40,—
	F 2	" v. "	20—40	8,50	70,—
	F 3	" v. "	30—50	11,—	95,—
	F 3	" v. "	50—80	14,—	125,—
leptolepis	F 1	" "	10—25	3,—	18,—
	F 2	" "	20—40	4,50	34,—
	F 2	" v. "	20—40	6,50	55,—
	F 3	" v. "	30—50	8,50	74,—
	F 3	" v. "	50—80	11,—	90,—
Picea					
canadensis (P. alba)	F 2	" "	7—20	1,50	8,—
	F 3	" v. "	15—35	4,—	26,—
	F 4	" v. "	20—40	5,50	42,—
conica (P. Albertiana conica)	2	" v. Steckl.		37,50	
	3	" v. "		52,50	
mit Topfballen	2	" v. "		67,50	
mit Topfballen	3	" v. "		83,—	
excelsa	F 2	" Sämlinge	10—20	2,50	14,—
	F 3	" v. "	15—35	5,—	40,—
	F 4	" v. "	20—40	6,50	54,—
	F 4	" v. "	30—60	7,50	60,—
excelsa Veredlungsunterlag. 6-8 mm ø				9,40	83,—
excelsa Veredlungsunterlag. 8-10 mm ø				11,25	100,—
" Maxvelli	2	" v. Steckl.		37,50	
	3	" v. "	8—12	52,50	
mit Topfballen	2	" v. "		67,50	
mit Topfballen	3	" v. "		83,—	
" pygmaea	2	" v. "		37,50	
	3	" v. "	8—12	52,50	
mit Topfballen	2	" v. "		67,50	
mit Topfballen	3	" v. "		83,—	
" pumila glauca	2	" v. "		37,50	
	3	" v. "	8—12	52,50	
mit Topfballen	2	" v. "		67,50	
mit Topfballen	3	" v. "		83,—	
omorika	2	" Sämlinge		4,90	37,50
	3	" v. "	1—20	8,60	75,—
	4	" v. "	20—40	16,50	150,—
orientalis	2	" v. "		9,—	
	3	" v. "	7—10	12,—	
	4	" v. "	10—20	15,—	
pungens	2	" v. "		12,—	
	3	" v. "	10—20	15,—	
	4	" v. "	15—30	22,50	
" glauca	2	" v. "		13,50	
	3	" v. "	10—20	18,75	
	4	" v. "	15—30	26,—	
" Kosteri	1	" Veredl.	10—15	100,—	
	2	" "	15—25	150,—	
sitchensis	F 2	" Sämlinge	10—25	3,50	21,—
	F 3	" v. "	15—35	6,50	55,—
	F 4	" v. "	25—50	9,—	80,—

Pinus		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
cembra	2 jähr. Sämlinge		8,60	75,—
	3 " v. "	8—12	15,—	135,—
	4 " v. "	10—18	22,50	
laricio austriaca siehe P. nigra austriaca				
montana	2 " "		1,80	11,25
	3 " v. "		4,20	30,—
	4 " v. "	12—30	6,—	49,—
	2 mal verpfl.	20—30	25,—	225,—
	2 mal verpfl.	30—40	40,—	360,—
" mughus	2 jähr. Sämlinge		3,—	22,50
	3 " v. "	8—15	7,10	60,—
	4 " v. "	12—25	11,25	100,—
	2 mal verpfl.	20—30	33,—	300,—
	2 mal verpfl.	30—40	52,50	472,50
" pumilio	2 jähr. Sämlinge		4,10	30,—
	3 " v. "	8—12	9,40	82,50
	4 " v. "	10—15	13,50	124,—
nigra austriaca	F 1 " "		1,50	8,—
	F 2 " "		3,50	20,—
	F 2 " v. "			
	F 3 " v. "	12—25	6,—	45,—
	4 " v. "	15—30	9,—	72,—
sylvestris aus anerk. Saatgut, 1. Wahl	F 1 " "		1,50	7,—
	F 2 " v. "	7—15	4,—	28,—
	F 3 " v. "	15—30	6,—	45,—
strobis	F 2 " "		2,60	15,—
	F 3 " v. "		3,40	24,—
	F 4 " v. "	20—40	6,—	45,—
Pseudotsuga				
Douglasi viridis	F 2 " "		7,50	67,50
	F 2 " v. "	15—30	13,50	117,—
	F 4 " v. "	25—30	16,—	139,—
Taxus				
baccata	1 " "		8,60	75,—
	2 " "		11,25	100,—
	3 " v. "	8—12	17,60	160,—
	4 " v. "	12—20	24,—	217,—
	4 " v. "	15—25	30,—	270,—
Thuja				
gigantea aurescens	2 " v. Steckl.	10—20	18,75	169,—
	3 " v. "	20—35	22,50	200,—
	2 × verpflanzt	25—40	45,—	400,—
occidentalis	2 " Sämlinge		2,60	15,—
	3 " v. "	15—30	6,75	56,25
	4 " v. "	20—45	7,50	63,75
	4 " v. "	25—50	7,90	67,50
	4 " v. "	30—60	8,60	75,—
	2 mal v. "	30—40	22,50	195,—
	2 " v. "	40—60	27,—	240,—
	2 " v. "	60—80	33,75	285,—
occidentalis Veredlungs-Unterlagen 4—6 mm ø			11,25	100,—
occidentalis Veredlungs-Unterlagen 6—8 mm ø			13,50	120,—
" atrovirens	2 jähr. v. Steckl.	8—15	22,50	200,—
	3 " v. "	12—25	30,—	270,—
" Columna	2 " v. "	8—15	22,50	200,—
	3 " v. "	12—25	30,—	270,—
" Ellwangeriana	2 " v. "	12—20	18,75	169,—
	3 " v. "	20—35	22,50	200,—
" " elegantissima	2 " v. "	12—20	18,75	169,—
	3 " v. "	20—35	22,50	200,—

Thuja occidentalis

		Höhe in cm	100 Stück DM	1000 Stück DM
Ellwangeriana gracilis	2 jähr. v. Steckl.	12—20	18,75	169,—
	3 " v. "	20—35	22,50	200,—
" " Rheingold	2 " v. "	8—15	22,50	200,—
	3 " v. "	10—15	30,—	270,—
	3 " v. " m. Tb.		41,—	
	3 " v. " m. Tb.		41,—	
" fastigiata	2 " v. "		22,50	200,—
	3 " v. "		30,—	270,—
" globosa (Spihlm.)	2 " v. "		22,50	200,—
	3 " v. "		30,—	270,—
" " compacta	2 " v. "		22,50	200,—
	3 " v. "		30,—	270,—
" recurva nana	2 " v. "		22,50	200,—
	3 " v. "		30,—	270,—
" Rosenthali	2 " v. "		22,50	200,—
	3 " v. "		30,—	270,—

Thujaopsis

dolabrata	2 " v. "	19,85	180,—
	3 " v. "	24,75	225,—

Tsuga

canadensis	2 " Sämlinge	13,50	120,—
	3 " v. "	22,50	200,—

UNSERE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

(unter Zugrundelegung der Lieferungsbedingungen der Fachgruppe Bund Deutscher Baumschulen). Die Bedingungen gelten zwischen uns und dem Auftraggeber als rechtlich bindend.

1. Die Preise gelten ab unserer Baumschule in Deutscher Mark ohne Skonto- und Portoabzüge. Eingehende Aufträge auch unserer Vertreter gelten erst dann als von uns angenommen, wenn sie innerhalb einer Woche nach Eingang der Aufträge von uns bestätigt sind. Mündliche Abreden zwischen unseren Vertretern und dem Auftraggeber werden von uns nur dann anerkannt, wenn sie ebenfalls von uns schriftlich bestätigt worden sind.
2. Erfüllungsort ist Rellingen, ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen uns ist Pinneberg, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Pinneberg oder der Geschäftssitz des Kunden.
3. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Unsere Vertreter sind nicht berechtigt, Zahlungen irgendwelcher Art zu fordern oder anzunehmen. Etwaige an unsere Vertreter geleisteten Zahlungen werden deshalb von uns nicht anerkannt.
4. Wir sind berechtigt, die Lieferung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern, wenn sich nach erfolgter Auftragsbestätigung herausstellt, daß infolge schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufwertes gefährdet ist. Kommt der Käufer dem Verlangen nach Sicherheitsstellung bzw. Vorauszahlung nicht nach, so sind wir berechtigt, nach Ablauf einer dem Käufer zu setzenden Frist von mindestens 8 Tagen vom Verkauf zurückzutreten. Wir sind ferner berechtigt, einen bereits abgeschlossenen Verkauf einseitig zu lösen, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen aus früheren Lieferungen im Zeitpunkt der Ausführung des neuen Auftrages noch nicht nachgekommen ist. Ist der Auftrag bereits ausgeführt, so steht uns frei, eingeräumte Zahlungstermine abzukürzen und sonstige zugesagte Vergünstigungen zu widerrufen.
5. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für Schäden, welche durch Frost oder andere Weise während des Transportes hervorgerufen sind, sind wir nicht haftbar. Um den Auftraggeber vor Transportschäden möglichst zu schützen, werden alle Sendungen von uns für den Transport versichert zu Lasten des Auftraggebers. Der Käufer ist verpflichtet, die genauen Versandvorschriften, insbesondere bezüglich der Bestimmungstation usw. zu erteilen. Geschieht dieses nicht, so sind wir berechtigt, den Versand nach bestem eigenem Gutdünken auf dem uns am günstigsten erscheinenden Weg vorzunehmen, ohne damit eine Verantwortung zu übernehmen. Bei Verkäufen auf Abruf haben wir das Recht, Herbstlieferungen nach dem 15. November, Frühjahrslieferungen nach dem 15. April ohne weiteres auszuführen. Für alle im Auftrag des Bestellers ausgeführten Sammeladungen lehnen wir jede Verantwortung ab, und zwar sowohl für die eigene als auch für fremde Ware.
6. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.
7. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt, wenn nicht anders ausdrücklich vereinbart ist, der Besteller. Die Berechnung erfolgt nach den ortsüblichen Sätzen. Rollgeld, Kosten der Verpackung und der Transportversicherung werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.
8. Gewähr für das Anwachsen wird nicht übernommen.
9. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfall besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind. Bei derartigen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen läuft bis zum Ablauf des 5. Jahres vom Tage der Lieferung, bei allen übrigen Pflanzen bis zum Ablauf des 2. Jahres vom Tage der Lieferung. Für die Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

10. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens 5 Tage nach Empfang der Ware an uns direkt und nicht an unsere Vertreter zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
11. Ersatz in einzelnen gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrag nicht ausdrücklich verboten ist. Der Sortenersatz indessen ist nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt. Als Ersatz für Pflanzen der I. Wahl können Pflanzen der mittleren Wahl zu den hierfür gültigen Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der II. Wahl für I. Wahl oder von anderen Baumformen als den in Auftrag gegebenen erfordern jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Bestellers.
12. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
13. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbestimmungen und Normalsätze des Bundes deutscher Baumschulen maßgebend.
14. Bei Lieferung von Forstpflanzen gelten die Lieferungsbedingungen gemäß Verordnung zur Regelung des Absatzes und der Preise für Forstsaamen und Forstpflanzen vom 17. September 1938, die wir als bekannt voraussetzen. Auf Verlangen senden wir dem Käufer diese Bedingungen zu.

Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen

50 — 1000 kg und 50 — 1000 km

km	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	km
50	1.40	2.20	3.20	4.10	5.—	5.70	6.90	7.60	8.50	8.80	50
100	2.10	3.50	5.—	6.60	8.30	9.50	11.30	12.60	14.40	14.80	100
150	2.50	4.50	6.40	8.40	10.50	12.—	14.40	16.—	18.30	18.60	150
200	3.10	5.70	8.30	10.90	13.70	15.80	18.90	21.—	24.10	24.50	200
250	3.50	6.40	9.40	12.30	15.70	18.10	21.60	23.90	27.60	28.—	250
300	4.10	7.60	11.10	14.60	18.50	21.30	25.60	28.40	32.60	33.—	300
350	4.30	8.30	12.—	16.—	20.20	23.20	28.—	31.10	35.70	36.10	350
400	4.90	9.20	13.60	17.90	22.70	26.20	31.40	34.90	40.—	40.50	400
450	5.20	9.80	14.40	19.—	24.10	27.90	33.50	37.10	42.50	43.10	450
500	5.60	10.60	15.70	20.70	26.30	30.40	36.50	40.60	46.60	47.20	500
550	5.90	11.20	16.70	22.—	27.90	32.20	38.60	43.—	49.40	49.20	550
600	6.20	11.80	17.50	23.10	29.30	33.90	40.60	45.10	51.90	52.50	600
650	6.40	12.30	18.20	24.10	30.50	35.30	42.30	47.—	54.—	54.60	650
700	6.70	12.90	18.90	25.10	31.90	36.80	44.20	49.10	56.60	57.—	700
750	6.90	13.20	19.50	25.80	32.80	37.80	45.50	50.50	58.10	58.70	750
800	7.—	13.40	20.—	26.50	33.60	38.80	46.50	51.70	59.50	60.10	800
850	7.10	13.70	20.30	26.90	34.20	39.50	47.30	52.60	60.60	61.20	850
900	7.30	14.—	20.70	27.40	34.70	40.20	48.20	53.60	61.60	62.20	900
950	7.30	14.10	21.—	27.90	35.40	40.90	49.—	54.60	62.70	63.30	950
1000	7.60	14.60	21.60	28.60	36.30	41.90	50.30	55.90	64.40	65.—	1000

km	550 kg	600 kg	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg	850 kg	900 kg	950 kg	1000 kg	km
50	9.50	10.20	11.20	11.80	12.70	13.40	14.40	15.—	15.—	15.—	50
100	15.80	16.90	18.60	19.70	21.40	22.50	24.20	25.20	25.20	25.20	100
150	20.—	21.60	23.70	25.10	27.20	28.60	30.70	31.90	31.90	31.90	150
200	26.30	28.10	30.90	32.80	35.60	37.50	40.20	42.—	42.—	42.—	200
250	30.10	32.20	35.40	37.50	40.70	42.80	46.10	47.90	47.90	47.90	250
300	35.60	38.20	42.—	44.50	48.30	50.80	54.60	56.70	56.70	56.70	300
350	38.90	41.70	45.80	48.60	52.80	55.40	59.60	62.—	62.—	62.—	350
400	43.70	46.80	51.40	54.50	59.20	62.30	66.90	69.70	69.70	69.70	400
450	46.50	49.80	54.70	58.10	63.10	66.40	71.40	74.20	74.20	74.20	450
500	50.80	54.50	59.80	63.40	68.90	72.50	78.—	81.20	81.20	81.20	500
550	53.80	57.50	63.30	67.20	72.90	76.70	82.50	85.80	85.80	85.80	550
600	56.50	60.60	66.60	70.70	76.70	80.80	86.80	90.30	90.30	90.30	600
650	58.80	63.—	69.40	73.60	79.90	84.10	90.40	94.10	94.10	94.10	650
700	61.50	65.80	72.40	76.70	83.40	87.80	94.40	98.30	98.30	98.30	700
750	63.10	67.80	74.50	79.—	85.80	90.30	97.20	101.10	101.10	101.10	750
800	64.70	69.30	76.30	80.90	87.80	92.40	99.40	103.50	103.50	103.50	800
850	65.80	70.60	77.60	82.30	89.50	94.10	101.20	105.30	105.30	105.30	850
900	67.10	71.80	79.—	83.90	91.—	95.80	102.90	107.20	107.20	107.20	900
950	68.20	73.10	80.40	85.30	92.50	97.40	104.70	109.10	109.10	109.10	950
1000	69.90	74.90	82.50	87.40	94.90	100.—	107.40	111.70	111.70	111.70	1000

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)



HAUPTVERZEICHNIS 1950/51
für Wiederverkäufer